

Berichte über die wissenschaftliche Biologie.

Band, Heft 11/12

S. 609—720

Methodik.

Methoden der vergl. Morphologie, Mikrotechnik, Methoden der vergl. Physiologie, Halten und Züchten biologischer Objekte, wissenschaftliche Photographie.)

Teissler, V.: Über eine Einrichtung zweifarbigter Beobachtung ungefärbter Präparate. (I. Mitt.) Z. Mikrosk. 51, 251—253 (1934).

Verf. geht von dem Zeiss-Mikropolychromar aus, der einen Zusatz zum aplanatischen Sensor von Zeiss darstellt und ein Blendenmechanismus ist, der eine Hell-Dunkelfeldbeleuchtung herzustellen gestattet. — Hierbei wird das Licht der Hellfeld- und der Dunkelfeldstrahlen durch verschiedene Filter geschickt, so daß die Objekte in der Farbe der Hellfeldstrahlen auf dem durch das Hellfeld bedingten Hintergrund erscheinen. Für manche Objekte hat diese Art der Beleuchtung den Vorteil, daß die rein physiologische höhere Kontrastempfindlichkeit des menschlichen Auges ausgenutzt wird, was beim normalen Hellfeldbild des Dunkelfeldes nicht der Fall ist. Das Wesentliche des Mikropolychromars liegt allerdings nicht in der Farbfilteranordnung, sondern in der Blendenanordnung, die eine Förderung der Abstufen der Helligkeiten von Hell- und Dunkelfeld zueinander gestattet. Die Farbränder sind bereits von J. Rheinberg 1896 und dann von J. Salkind 1916 empfohlen worden.

— Verf. hat nun versucht, dieselbe Wirkung mit einem Leitz-bizentrischen Wechsel-Sensor zu erreichen, indem er die ausklappbare Zentralblende durch eine Planglasplatte am gekitteten Prisma ersetzte. Das Prisma, dessen Hypotenusenfläche versilbert ist, lenkt zentrisch und lenkt das von einer seitlich stehenden Lichtquelle kommende Licht in den Dunkelfeldstrahlengang des Kondensors. Durch die freie Randzone der Planglasplatte, die das Prisma trägt, wird das Licht einer zweiten Lichtquelle über den Spiegel des Mikroskops in den Hellfeldstrahlengang des Kondensors eingelassen, setzt man nun vor jede Lampe ein anderes Filter, so erhält man ähnlich wie beim Polychromar eine Kontrastfarbenbeleuchtung. Guido G. Reinert (Jena).

Schmidt, W. J.: Ein Dehnungsapparat zum Gebrauch auf dem Mikroskop, hergestellt von E. Leitz in Wetzlar. (Zool. Inst., Univ. Gießen.) Z. Mikrosk. 51, 54—65 (1934).

Die Konstruktion vereinigt die Angaben von H. Ambronn (Anleitung zum Gebrauch des Polarisationsmikroskops. Leipzig 1892) und von M. Wächtler [Kolloidchem.-Beih. 20, 165 (1924); Fortschr. Mineral. 12, 146 (1927)] und gestattet, den Gang der Doppelbrechung bei mechanischer Beanspruchung organischer Gewebe oder künstlicher Gallerten unter dem Mikroskop zu verfolgen und genau zu messen. Der Apparat, der einen drehbaren Kreutzisch (und damit eine Polarisationsoptik) voraussetzt, besteht im wesentlichen aus 2 Backen zum Halten des Objektes, die durch 2 horizontale Schraubenspindeln geführt und parallel verschoben werden können. Die Größe dieser Verschiebung, also der Dehnung des eingespannten Präparates, wird an einer Trommel in hundertstel Millimeter abgelesen. Unter den Präparatbacken befindet sich ein Glastrog aus optisch spannungsfreiem Glas zur Untersuchung der Objekte in bestimmten Flüssigkeiten. Die mikroskopische Untersuchung geschieht im polarisierten Licht zwischen zwei Nicol's. Die Drehung des Kreutzisches gestattet leicht die Diagonallage des Objektes zu den Nicol's herzustellen. Zur Untersuchung werden schwache Objektive (Leitz 1—3) und stärkere Okulare verwendet. Bei isotropen Gelen tritt positiver photoelastischer Effekt (Dehnungsdoppelbrechung) auf, ähnlich dem bei gedehnten Gläsern. Bei erheblicher Verformung des gedehnten Gels tritt sogenannte Orientierungsdoppelbrechung auf, d. h. die ungeordneten Teilchen werden derart ausgerichtet, daß ihre längere Achse parallel der Dehnungsrichtung liegt. Bei dieser Art der Brechung sind 2 Komponenten zu unterscheiden: die Eigendoppelbrechung und die Formdoppelbrechung, welche letztere durch die Biegunis des Objektes in Flüssigkeiten derselben Brechzahl beseitigt werden kann. Es lassen sich Ergebnisse solcher Untersuchungen an Celloidin, an gequollenen Gelen, an kollagenen Geweben aus dem Mäuseschwanz und elastischen Fasern (Nackenband) sowie am Kautschuk erhalten. Der Apparat kann auch für Pressungsuntersuchungen (in horizontaler Richtung) am Mikroskop verwendet werden. Der Arbeit ist ein Photogramm des Apparates beigegeben. Eichler (Dresden).

Swift, Homer F., Johannes K. Moen and Ernst Vaubel: A comparison of ocular micrometer and projectoscopy methods of estimating growths in tissue cultures. (Ein Vergleich der Okularmikrometer- und der Projektionsmethode zur Beurteilung des

Wachstums von Gewebekulturen.) (*Hosp., Rockefeller Inst. f. Med. Research, New York.*) J. of exper. Med. **60**, 419—425 (1934).

Die Messung zweier Kulturachsen mit dem Okularmikrometer und eine sinnigere Berechnung gibt für bestimmte (vor allem kreisförmig wachsende) Kulturen annähernd gleiche Resultate wie die Arealmessung mit Hilfe von Projektion und Planimeter. Die Autoren empfehlen die Okularmikrometermethode, weil sie weniger zeitraubend ist und einen geringeren Apparat erfordert. Sie stellen fest, daß diese Methode in einschlägigen Handbüchern keine Erwähnung findet. (Wie bekannt, war jedoch vor der Projektionsmethode das Messen mit Hilfe des Okularmikrometers gebräuchlich; siehe Ebeling. Ref.) *Knake* (Berlin).

Dudgeon, Leonard S., and N. R. Barrett: The examination of fresh tissues by wet-film method. (Die Untersuchung frischer Gewebe mit der Methode des feuchten Ausstriches.) (*St. Thomas's Hosp., London.*) Brit. J. Surg. **22**, 4—22 (1934).

Der frische feuchte Ausstrich spielt nach Erfahrungen der Verf. eine sehr große Rolle bei der Schnelldiagnose entzündlicher und bösartiger Erkrankungen, ja diese Methode wird der Schnitterfertigung gegenüber sogar recht erhebliche Vorteile. Das Gewebe wird mit einem scharfen Messer abgekratzt und wie ein Blutpräparat ausgestrichen. Fixation mit Sublimatalkohol, Jodieren mit Jodmethylalkohol, Färben in Mayers Hämalaun und schwacher Eosinlösung. Die Bedeutung der Technik für die einzelnen Gewebe wird erörtert. Ungenaue Diagnosen lassen sich auf ein Minimum beschränken. Auch die Diagnose einer Tuberkulose und einer Lymphogranulomatose soll auf diesem Wege leicht und eindeutig gelingen. *Kraus*.

Chodjakoff, N. D.: Über die Entkalkung der vitalgefärbten Objekte. (*Path.-Anat. Abt., Inst. f. Exp. Med., Leningrad.*) Zbl. Path. **61**, 51—52 (1934).

Verf. gibt folgende Methode für die Entkalkung an: 1. Fixierung der vitalgefärbten Objekte in 20proz. Formalin im Laufe von 2—4 Tagen. 2. Übertragen derselben in 50proz. Trichloressigsäure bzw. 50proz. Ameisensäure auf 10—12 Tage (je nach Größe der Objekte). 3. Spülen im Leitungswasser 5—6 Stunden oder direkt. 4. Übertragen in 70proz. Alkohol (mehrmals Wechseln) auf 3—4 Tage. 5. Einbettung in Celloidin nach der üblichen Vorschrift. *Barth* (Berlin).

Gray, G. F.: New type razor holder for rotary microtome. (Ein neuer Messerhalter für Kurbelmikrotome.) Science (N. Y.) **1934 II**, 249—250.

Da Verf. mit den gewöhnlichen großen Mikrotommessern, ebenso mit den verschiedenen Haltern für Rasierkliegen nicht zufrieden ist, benutzte er am Mikrotom gewöhnliche Rasiermesser, die sich ihm durch lange Zeit hindurch schon ausgezeichnet bewährten und vor allem den Vorteil haben, daß sie leicht und rasch wieder in tadellos geschärften Zustand gebracht werden können. Zu ihrer Benutzung am Mikrotom ist ein eigener Halter notwendig, den Verf. gebaut hat und näher beschreibt. *J. Kisser* (Wien).

Wallart, J.: Coupes séries à la celloïdine. (Celloidinschnittserien.) Bull. Hist. appl. **11**, 334—336 (1934).

Verf. empfiehlt zur Herstellung von Celloidinschnittserien eine Modifikation der alten Methode Darkschewitsch. Er fängt die alkoholfuchten Schnitte vom Messer mit nummerierten Fließpapierschleichen auf, die übereinander geschichtet werden, und zwischen die nach jeder oder jeder zweiten Dekade eine mit chinesischer Tusche schwarz gefärbte Kartonscheibe legt. Um die Basis und die Seiten des so entstehenden Zylinders kommt ein schmaler Streifen von Pergamentpapier, mittels dessen man den Zylinder in ein entsprechendes, mit 70proz. Alkohol beschicktes, passendes Gefäß einbringen und wieder herausnehmen kann. Das Ausschneiden der zu färbenden Schnitte wird durch die Einschaltung der geschwärzten Kartonblätter sehr erleichtert. *W. Berg* (Königsberg i. Pr.).

McLean, R. C.: Substitution staining with free dye acids and dye bases. (Ersatzfärbung mit freien Farbsäuren und Farbbasen.) New Phytologist **33**, 316—317 (1934).

Das Verhalten freier Farbsäuren oder Farbbasen kann zu einem raschen und einfachen Färbungsvorgange benutzt werden. Während die sauren Farbstoffe Eosin und Erythrosin in Wasser leicht, in den meisten organischen Solventien aber nur schwer oder nicht löslich sind, lösen sich die entsprechenden Farbsäuren leicht in Äther oder Xylol. Zur Darstellung der freien Farbsäuren wird eine 1proz. Lösung von Erythrosin pro 1 g Farbstoff mit 2,5 ccm einer 10proz. HCl-Lösung vom spez. Gew. 1,16 versetzt, bei Eosin werden pro 1 g 3,5 ccm zugefügt, wodurch die Farbsäure ausgefällt wird. Der Niederschlag wird absetzen gelassen, durch Asbest filtriert, getrocknet und mit Xylol durchgeschüttelt und gelöst. Die farblose Lösung färbt sich sofort durch Zusatz von Alkali oder durch ein elektronegatives Adsorbens, wie etwa Cellulose, man sofort durch Eintauchen eines Stückes Filtrierpapier in die Lösung sehen kann. Dieses Verhalten wird nun in folgender Weise zur Anfärbung der Cellulose benutzt. Pflanzenschnitte werden zunächst mit Methylviolett oder Methylenblau gefärbt, zur Entfärbung der Cellulosewände mit Alkohol gewaschen und hierauf in Xylol übertragen. Aus diesem kommen sie, die Lösungen der freien Farbsäuren von Eosin oder Erythrosin in Xylol, bis die rote Färbung

erschienen ist und dann in Xylol-Balsam. Jede Differenzierung fällt weg, die Gegenfärbung ist eine rein mechanische Angelegenheit geworden. Eosin gibt eine mehr orangegelbe Färbung als Erythrosin. In ähnlicher Weise kann auch die freie Farbbase des Methylblau (Nilblau ist besser) verwendet werden. Es werden zu einer wässrigen Lösung pro 1 g gelösten Farbstoff 2,5 ccm einer 10proz. wässrigen Lösung von Natronlauge zugefügt. Die Lösung der Farbbase in Xylol ist eine schwach purpurrote Farbe. Bei Anfärbung von Pflanzenschnitten färben sich verholzte Membranen augenblicklich dunkelblau. Eine gleichzeitige Färbung mit Eosin und Methylblau ist nicht möglich, doch können die Färbungen hintereinander vorgenommen werden, wobei zuerst mit Methylblau, dann mit Eosin gefärbt wird. J. Kisser.

Kay, W. W., and Raymond Whitehead: The preparation of efficient fat stains from insoluble residues of weakly-staining solutions of commercial „Sudan III“. (Die Herstellung von wirksamen Fettfarbstoffen aus unlöslichen Rückständen von schwach färbenden Lösungen des im Handel erhältlichen Sudan III.) (*Dep. of Path., Univ., Manchester.*) *J. of Path.* 39, 449—455 (1934).

Die Färbekraft der gewöhnlichen Sudan III-Lösungen in 70proz. Alkohol nimmt mit der Zeit schnell ab. Behandelt man die unlöslichen Rückstände in den verdorbenen Lösungen mit Schwefelsäure („Regeneration“), so erhält man Farblösungen, die in ihrem Färbevermögen den frisch bereiteten Lösungen des im Handel erhältlichen Sudan II gleichwertig oder gar überlegen sind. Lösungen von solcherart „regenerierten“ Farbstoffen in 70proz. Alkohol nehmen in ihrer Wirksamkeit ebenso schnell ab wie die Lösungen des gewöhnlichen Sudan III. Die Lösungen von Sudan III und von „regeneriertem“ Sudan III in Alkohol absolutus hingegen bewahren ihre Färbekraft durch Monate. — Die einfachen chemischen Reaktionen und Färbeeigenschaften der drei Bestandteile von Sudan III vor und nach der „Regeneration“ werden beschrieben; die chemische Natur der „Regeneration“, die Verschiedenheit des gewöhnlichen Sudan III und die Notwendigkeit der Herstellung eines standardisierten reinen Farbstoffs werden im weiteren noch besprochen. Max Clara (Blumau b. Bozen).

Danilowa, K. M.: Eine einfache Methode zur elektiven Darstellung der v. Kupffer'schen Sternzellen der Leber am Leichenmaterial. (*Path.-Anat. Abt., Metschnikoff-Krankenhh., Leningrad.*) *Zbl. Path.* 61, 52—54 (1934).

Härtung nicht über 24 Stunden in 10% Formol. Gefrierschnitte kommen in eine Lösung von 1 g Goldchlorid und 1 ccm HCl in 10 l Wasser, in der sie bei Tageslichteinwirkung so lange bleiben, bis sie violett gefärbt erscheinen (24—48 Stunden); Alauncarmin. Die Kupffer'schen Sternzellen, auch die feinen Fortsätze sind tiefgrau bis schwarz dargestellt. Auch 24 Stunden p. m. wurden gute Ergebnisse erzielt. — Mit dieser Methode ließen sich jedoch nicht die Reticuloendothelien der Milz darstellen. Jürg Mathis (Innsbruck).

Vavra, R.: Méthode de mesure des cellules. (Methode zur Messung von Zellen.) *Inst. de Path. Exp., Univ., Brno.* C. r. Soc. Biol. Paris 117, 168—170 (1934).

Um die Größe tierischer Zellen unter dem Einflusse verschieden variierter Milieubedingungen genau messen zu können, beschreibt Verf. eine Methode, die im Wesen darauf beruht, daß die Zellen in dünner Schicht in einer mikroskopischen Kapsel, bestehend aus einem Glasplättchen und einem dünnen Kollodiumhäutchen in ihrer Lage fixiert und in diesem Zustande ohne Lageveränderung verschiedenen Einwirkungen unterworfen werden können. Das Verfahren wird im Detail beschrieben. Die isolierten Zellen gewinnt man durch Abschaben des betreffenden Gewebes in einer physiologischen Lösung und Reinigung und Anreicherung der Suspension. J. Kisser (Wien).

Jaffe, J.: Vergleichende Untersuchungen über verschiedene Zählkammern unter besonderer Berücksichtigung der Zeisskammer Brandt. *Fol. haemat. (Lpz.)* 52, 64 bis 67 (1934).

Owen, Seward E.: Small animal metabolism cage. (Stoffwechselkäfig für kleine Tiere.) (*Cancer Research Unit, Veterans' Administration Facility, Hines, Ill.*) *J. Labor. u. clin. Med.* 19, 1135—1137 (1934).

Der billige und sehr brauchbare Stoffwechselkäfig für Ratten, hergestellt aus galvanisiertem Drahtgeflecht, hat zylindrische Form, 25 cm Höhe, 20 cm Durchmesser, ruht auf einem Stützenuntersatz und ist mit einem Topfdeckel verschlossen. In 6 cm Höhe ist ein Boden aus Drahtnetz angebracht. Ein außen angebrachter 10 cm langer Tunnel aus Weißblech führt zum Futternapf. Um Kot und Harn getrennt zu sammeln, wird der Käfig auf einen entsprechend großen Trichter gestellt, in dem ein Drahtnetz den Kot zurückhält. Lintzel (Berlin).

Kapur, S. N., and D. Narayanamurti: A simple air-conditioning chamber for laboratory experiments. (Ein einfacher Versuchsraum mit konstanten Luftbedingungen.) (*Seasoning Sect., Forest Research Inst., Dehra Dun.*) *Current Sci.* 2, 483—484 (1934).

Der besonders gedichtete Raum, der durch Fenster von außen übersehen werden kann,

ist durch einen Doppelboden unterteilt. Unterhalb des nicht den ganzen Raum durchziehenden Bodens sind Wannen zur Aufnahme verschiedener gesättigter Salzlösungen (Rezepte angegeben!), durch die verschiedene Feuchtigkeitsgrade erzielt werden können. Elektrische Heizspiralen unter Kontrolle von Kontaktthermometern sorgen für konstante Temperatur. Ein Propeller, der von einem außerhalb des Raumes stehenden Motor angetrieben wird und in einer zwischen Decke, Seitenwänden und Doppelboden gelegenen Zwischenwand läuft, sorgt für gleiche Verteilung der Luft im Raume.

Kleinknecht (Leipzig).

Hruszek, H.: La culture en miniature (méthode permettant à la fois l'étude microscopique et macroscopique de champignons parasites des teignes). (Die Miniatur-Kultur [Methode, die gleichzeitig das Studium des mikroskopischen und makroskopischen Wachstums der pathogenen Hautpilze gestattet].) *Ann de Dermat.* 5, 775—779 (1934).

Hruszek, H.: Über ein Miniatur-Kulturverfahren zum Studium des makro- und mikroskopischen Wachstums der pathogenen Hautpilze. (*Univ.-Hautklin., Kiel.*) *Zbl. Bakt.* I Orig. 132, 378—380 (1934).

Gut gereinigte Objektträger nach Maximow mit tiefem Ausschliff („extra-stark“) werden in Petri- oder Kolleschalen gebracht. Der Grund der Schalen ist mit einer Zellstofflage zu versehen. Das ganze wird sterilisiert. Im Anschluß an die Sterilisation bringt man mit einer sterilen, auf $\frac{1}{10}$ ccm graduierten Pipette eine kleine Nährbodenmenge. (Die maximale Fassungsvermögen des Ausschliffes beträgt etwa 0,5 ccm.) Der Zellstoff wird am besten bei dieser Gelegenheit mit etwas Wasser angefeuchtet, womit eine feuchte Kammer hergestellt ist. Die kleine Nährbodenfläche wird nach dem Erstarren mit einer Nadel, die mit einem minimalen Kulturteilchen des zu prüfenden Pilzstammes beladen ist, beimpft. Ein Deckgläschen wird nicht über die Kultur gelegt. Das Wachstum des Pilzes kann man beliebig oft makroskopisch und mikroskopisch prüfen. Die Feinheiten im mikroskopischen Bilde lassen sich sehr leicht auf dem verschiebbaren Objektisch des Mikroskopes einstellen oder bei späterer Gelegenheit wiederfinden bzw. photographisch festhalten. Die Kulturen werden in der Zwischenzeit in den feuchten Kammern aufbewahrt. Hier und da kann man zum Zellstoff einige Tropfen Wasser neu hinzufügen, um die nötige Feuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Nach einigen Tagen liefert diese Methode auch noch eine makroskopisch verwertbare Pilzkultur. Diese kleine Kultur ist nichts anderes als eine Reproduktion der Wachstumsform in kleineren Dimensionen in einer Miniaturform. Daher die Benennung der Kulturmethode als „Pilz-Miniatur-Kultur“. Diese neue Methode eignet sich zu einer Reihe von Untersuchungen, auf die in der Arbeit näher hingewiesen wird.

Autoreferat.

Kellermann, J. H.: A well-balanced ration for stock rats. (Ein gut zusammengesetztes Futter für Zuchtratten.) (*Sect. of Biochem., Onderstepoort.*) *Onderstepoort J. vet. Sci.* 2, 649—653 (1934).

Das von dem Verf. mit gutem Erfolg angewandte Futter für Zuchtratten ist eine Modifikation der Waddell- und Steenbockschen Diät; es wurden Teile des gelben Korns und Leinölmehls durch getrocknete Ochsenleber, Bierhefe und Calciumcarbonat ersetzt. Es ist ein pulvriges Futter mit folgender Zusammensetzung: Gemahlenes gelbes Korn 68%, Leinölmehl 10%, unbearbeitetes Casein 5%, Trockenbierhefe 5%, Alfalfamehl 3%, Butterfett 5%, Ochsenleber (getrocknet bei 70°) 2%, Bohnenasche 1%, Calciumcarbonat 0,5% und Natriumchlorid 0,5%. Frische Vollmilch und Wasser wurden täglich ad libitum getrennt verabreicht. Das Futter enthält 68,2 Kohlenstoffhydrate, 15,0 Fett und 16,8 Eiweiß. Diese Werte bezeichnen den Prozentgehalt der Gesamtkalorien der verfütterten Nahrung. Ihr Aschengehalt sowie der von Calcium und Phosphor betrugen 3,72, 0,61 und 0,44%, hinsichtlich des Calcium-Phosphorverhältnisses 1:39. 98% der jungen Ratten wogen bereits im Alter von 23 Tagen 40—60 g; es wurden von jedem Wurf nur 6 Junge zur Aufzucht behalten.

Trarutmann.

Pax, Ferdinand: Die Untersuchung von Korallenskeleten im infraroten Licht. *Zool. Anz.* 106, 15—17 (1934).

Mit gutem Erfolg benutzte der Verf. Röntgenstrahlen zur Untersuchung der Achsen-skelete oder deren Nachweis bei Korallen, ohne daß bei diesen der Weichkörper verletzt zu werden brauchte. Die Methode hatte den Vorteil, daß sie relativ schnell und ohne Beschädigung des Materials anzuwenden war. Feinstrukturen konnten jedoch nicht mit ihr studiert werden. Es war daher notwendig, solche Untersuchungen an vorpräpariertem Material vorzunehmen und wechselweise Auf- und Durchlicht anzuwenden. Besonders schwierig gestalteten sich solche Untersuchungen bei den Skeleten der Antipathrien, die aus dunkelbraunem oder schwarzem Gorgonin bestehen. Hier leistet die Ultrarotmikrophotographie im durchfallenden Licht gute Dienste und gestattet nicht nur die Messung und das vergleichende Studium an ein und demselben Stück durchzuführen, sondern macht auch den feineren Bau deutlich sichtbar. Verf. gibt als Beispiel zwei Aufnahmen von dem Teil eines Achsenskelets von Stichopathes eustropha Pax bei einer Vergrößerung von 15:1 wieder, von denen die eine mit einem Gelbfilter auf orthochromatischer Platte und die andere mit dem Zeiss-Infrarotfilter auf Aufga-

frarotplatte hergestellt ist. Auch für das Studium von Schliffen durch das Skelet der Steinkorallen soll nach Angaben des Verf. das Ultrarot Vorteile bieten. *Guido G. Reinert* (Jena).

Drüner, L.: Über die wissenschaftliche Photographie, besonders die stereoskopische Photographie. *Klin. Wschr.* 1934 II, 1304—1306.

Für stereoskopische Aufnahmen von bewegten Gegenständen mit sichtbarem Licht braucht man 2 Kameras. Bei unbewegten Gegenständen kann man die Aufnahmen mit einer Kamera machen, indem man sie vor der 2. Aufnahme geeignet verschiebt. Es werden die Bedingungen für verkleinerte und vergrößerte Stereobilder erörtert, die bei der Aufnahme und der Betrachtung eingehalten werden müssen, damit eine raumrichtige Wiedergabe zustande kommt. Es wird ferner über Stereophotographie in natürlichen Farben berichtet. Wer Stereoaufnahmen bei sichtbarem Licht macht, kann aus dem Aufsätze viele nützliche Kenntnisse gewinnen.

H. Chantraine (Betzdorf a. d. Sieg).^{oo}

Loth, E.: Sur l'importance des recherches cinématographiques pour l'anatomie microscopique. (Über die Bedeutung kinematographischer Untersuchungen für die mikroskopische Anatomie.) *Bull. internat. Acad. polon. Sci., Cl. Sci. math. et natur.*, B II Nr 1/2, 85—87 (1934).

Verf. beschäftigt sich mit der Herstellung von Filmen, die am lebenden Menschen beobachtbare Muskelvariationen darstellen. Mit dieser Methode läßt sich eine ganze Anzahl solcher Variationen feststellen und selbst in bezug auf anatomische Details aufklären, die man andersartig nicht fixieren kann. Es handelt sich dabei oft um Bewegungen, bei denen die treffenden Muskeln nur während eines sehr kurzen Augenblickes spielen. Derart kann man Einzelheiten des menschlichen Körpers studieren, die bisher wenig bekannt oder ganz unbekannt waren. Als Beispiele werden gezeigt charakteristische Einzelbilder aus den Aufnahmen, die einen doppelten Arcus axillaris, die Funktion des M. transversus menti, eine Variation des M. orbicularis oculi und des Sphincter profundus colli betreffen. Überdies werden 2 Bilder aus Aufnahmen gezeigt, die die Verwendung des Fußes zu „Handarbeiten“ betreffen (Einwickeln, Schreiben). Verf. ist überzeugt, daß dergleichen Aufnahmen auch große Bedeutung für die Eugenik besitzen.

O. Storch (Graz).

Marshall, G. S., and J. G. Howard: An inexpensive coarse adjustment remote control for photomicrography. (Eine billige Grobferneinstellung zur Mikrophotographie.) *Anat. Dep., Univ., Otago.* *Anat. Rec.* 60, 19—21 (1934).

Bei Benutzung der sog. Horizontal-Vertikal-Mikrokameras ist es oft umständlich, die Einstellvorrichtungen am Mikroskop zu bedienen. Verf. ersetzen daher eine Triebrolle des Vortriebs durch ein großes Kegelszahnrad, wie es normalerweise in den Maschinenbaukästen von Meccano oder Stabil geliefert wird. Am Triebkasten wird ein Winkel mit einem Achsengetriebe so angebracht, daß ein kleines Kegelszahnrad (in dem gleichen Baukasten zu finden) in das Getriebe der Triebachse befestigte große eingreift. Mit dem kleinen Kegelszahnrad wird eine biegsame Welle verbunden, die zur Mattscheibe der Camera führt und von dort aus bedient werden kann. Die Anordnung hat nur den Nachteil, daß das Mikroskopstativ ein für allemal zu diesem Zweck umgebaut werden muß und dann für andere Arbeiten schlecht brauchbar ist; sie wird aber in viel vollkommenerer, leicht ansetzbarer Form von den verschiedenen optischen Firmen geliefert. D. Ref.

Guido G. Reinert (Jena).

Reinert, G. G.: Die Verwendung von Farbfiltren in der Mikrophotographie und ein neuer praktischer Filterhalter. *Z. Mikrosk.* 51, 253—257 (1934).

Nach kurzer Diskussion der Verwendung von Filtren für die Mikrophotographie und entsprechende der gebräuchlichsten Anwendungsformen — Flüssigkeitsfilter, Gelatinefilter und Quarzglasfilter — werden die Vorzüge der letzteren hervorgehoben und ein Filterhalter für ein aus zwei einzelnen Glasfiltren bestehenden Kombinationsfilter von Zeiss beschrieben. Das Trichromfilter besteht aus einem rotarmen Blaufilter und einem Gelbfilter, die bei der Kombination ein gutes Grünfilter ergeben. Bei dem Ultrarotfilter nach Kraft wird ein strenges Rotfilter (das noch sichtbares Rot durchläßt und zur Scharfeinstellung allein verwandt wird) in der Aufnahme selbst mit einem Violettglasfilter kombiniert, das den Rest sichtbaren Lichtes absorbiert. Der erwähnte Filterhalter gestattet die unabhängige Verwendung der Teilfilter.

P. Metzner (Greifswald).

Courtney, Wilbur D., and Ralph Schopp: A new source of illumination adapted for photomicrography and low-power microscopy. (Eine neue dem Gebrauch der Photomikroskopie oder Mikroskopie bei schwachen Vergrößerungen angepaßte Lichtquelle.) *U. S. Dep. of Agricult., Sumner, Wash.* *Science* (N. Y.) 1934 II, 189.

Die sog. Neon-Leuchtröhren geben bei geeigneter Formgebung eine recht geeignete Lichtquelle zur Auflichtbeleuchtung bei der Photographie und beim Gebrauch des Präpariermikroskops ab. Die Neon-Leuchtröhren müssen zu diesem Zweck in mehreren Windungen um das Objektiv oder Objektivpaar herumgeführt werden und geben dann eine genügend

intensive und gleichmäßige Beleuchtung. Die dem Objektiv zugewandte Rückseite der Leuchtröhren soll durch einen Reflektor abgedeckt sein. Um auch die Oberflächenstruktur des Objekts deutlich durch Schlagschatten sichtbar zu machen und die nötigen Kontraste hereinzubringen, ist die Lichtquelle durch entsprechende verstellbare Sektorenblenden abzudecken.

Guido G. Reinert (Jena).

Wilkinson, H. J.: A low-power micro-projection apparatus. (Ein billiger Mikroprojektionapparat.) *J. microsc. Soc.*, III. s. 54, 97—98 (1934).

Empfohlen wird, eine alte Photocamera mit einer Lampe für Mikrophotographie (6 V 4 A) zu einer Projektionseinrichtung zusammenzustellen. Durch eine Auswahl einfacher Zusatzlinsen von 0,5—4 Dioptrien können die verschiedensten Vergrößerungen erzielt werden.

Kleinknecht (Leipzig).

Physikalische und chemische Grundlagen der Lebensvorgänge.

(Ionenwirkungen, Osmose, Permeabilität, Kolloidchemie, Biochemie, experimentelle Pharmakologie, Strahlenwirkung.)

Sastri, B. N., and M. Sreenivasaya: The study of plant tissue fluids. A critical review. (Untersuchungen von Pflanzensäften. Kritisches Sammelreferat.) (*Ind. Inst. of Science, Bangalore.*) *Current Sci.* 3, 52—58 (1934).

Dieses Sammelreferat, das hauptsächlich für die angewandte Botanik bestimmt ist, bringt in kurzer Form eine Reihe von Untersuchungsmethoden und Ergebnissen der pflanzlichen Säfteforschung. In einleitenden Abschnitten werden die für jegliche Untersuchungen wesentlichen Sterilisationsmethoden erwähnt. Dann folgen nacheinander Besprechungen von physikalisch-chemischen, von chemischen und von biochemischen Untersuchungen. Unter anderem sind erwähnt: spezifische Gewichtsbestimmungen, Gefrierpunktserniedrigungen, elektrisches Leitvermögen, Koagulationstemperaturen, Eiweiß-, Zucker-, CO_2 - und andere Bestimmungen, ferner finden sich Angaben über die Haltbarkeit von Virus in Pflanzensäften.

Schnee (Köln).

Pfeiffer, H.: Über die Plasmorrhhyse nackter Protoplasten. III. *Cytologia (Tokyo)* 308—316 (1934).

Verf. bestimmt nach den etwas modifizierten Abwaschverfahren von W. Barikun und W. O. Fenn die Haftzahl nackter Protoplasten und findet dabei für *Solanum migrum* „außer einer Abnahme des Adhärenzens mit dem Plasmorrhhysegrade lyotrope Beziehungen zu der Natur des Anions und Kations des benutzten Salzes“. In einem zweiten Abschnitt wird nach einem etwas abgeänderten Strömungsverfahren von Abramson der Abgleitwiderstand der Protoplasten von Vitis-Beeren bestimmt. Obwohl damit, wie Verf. schon früher gezeigt hat, nicht das ganze Phänomen der Adhäsion erfaßt wird, zeigt doch der angeführte Versuch, daß die ermittelten Werte „von dem Adhäsionsvermögen der Objekte abhängig sind und diesem ziemlich symmetrisch gehen“. (II. vgl. diese Ber. 25, 472.)

C. Hoffmann (Kiel).

Barnes, R. Bowling, and S. Silverman: Brownian motion as a natural limit to measuring processes. *Rev. Modern Physics* 6, 162—192 (1934).

Okada, Yōnosuke: Sur le poids des spores chez quelques fougères japonaises (Über das Sporengewicht bei einigen japanischen Pteridophyten.) (*Inst. Biol., Univ. Sendai.*) *Sci. Rep. Tôhoku Univ.* IV, 9, 249—251 (1934).

Verf. wählte 5 Arten, deren Sporen eine leichte Berechnung des Volumens ermöglichen. Das spezifische Gewicht der gereinigten Sporen wurde in flüssigem Paraffin bestimmt. Die Ergebnisse waren: *Equisetum arvense* = $19 \cdot 10^{-5}$ mg; *Osmunda japonica* = $35 \cdot 10^{-5}$ mg; *Osmunda cinnamomea* = $27 \cdot 10^{-5}$ mg; *Woodwardia orientalis* = $68 \cdot 10^{-5}$ mg; *Dryopteris viridescens* = $15 \cdot 10^{-5}$.

B. Sommer (Danzig).

Luyet, Basile J.: Death of a yeast culture, as registered by the electric resistance (Die Feststellung des Absterbens von Hefekulturen durch Bestimmung des elektrischen Widerstandes.) (*Dep. of Biol., St. Louis Univ., St. Louis.*) *Proc. Soc. exper. Biol. Med.* 31, 800—801 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. 81, 335.

Denier, André: Sur la tension électrique du corps humain. (Über die elektrische Spannung am menschlichen Körper.) Bull. Acad. Méd. Paris, III. s. **111**, 46—47 (1934). Vgl. Ber. Physiol. **81**, 229.

Leiri, F.: Über die elektrische Doppelschicht der Haut und über die Erregungswelle der peripheren Nerven. Skand. Arch. Physiol. (Berl. u. Lpz.) **67**, 226—253 (1934). Vgl. Ber. Physiol. **81**, 230.

McNair, James B.: The evolutionary status of plant families in relation to some chemical properties. (Die entwicklungsgeschichtliche Stellung der Pflanzenfamilien und die Zusammensetzung ihrer Inhaltsstoffe.) Amer. J. Bot. **21**, 427—452 (1934). „Aufgabe dieser Arbeit ist es, zu zeigen, daß sich nach Ordnung der Pflanzenfamilien nach Klimaten, in denen sie vorkommen, ergibt, daß bei Pflanzen, die Fette, ätherische Öle und Alkaloide enthalten, einige chemische und physikalische Eigenschaften dieser Stoffe der entwicklungsgeschichtlichen Stellung der betreffenden Pflanze Veränderungen zeigen, es wahrscheinlich machen, daß höher organisierte Pflanzen auch komplizierter gebaute Stoffe enthalten.“ — Es wurden untersucht 318 Fette aus 83 Familien, 232 Wachse aus 83 Familien, 934 ätherische Öle aus 87 Familien und 299 Alkaloide aus 57 Familien. Insgesamt ergaben sich also 1313 Stoffe. Die Numerierung der Familien und Arten erfolgte nach De Dalla Torre und Harms. Aus diesen Nummern und dem Molekulargewicht der Stoffe in den betreffenden Pflanzen gefundenen Alkaloide wird nun eine Gleichung berechnet, den Zusammenhang zwischen Systemnummer (x) und Molekulargewicht (y) der Alkaloide stellt. Diese Gleichung lautet: $y = 215,96 + 0,011544 x$, ergibt also eine schwach steigende Kurve. Für die Jodzahl der Fette lautet die berechnete Gleichung: $y = 78,98834 + 0,00013287 x$; das spezifische Gewicht der ätherischen Öle: $y = 0,90588 + 0,000002278 x$. Für den Vernetzungsindex der Öle ergibt sich: $y = 0,485705 - 0,000000028998 x$. Auch die Veresterungswärme der in den Pflanzen enthaltenen Fettsäuren und Alkohole wird als mit zunehmender Ordnungsnummer zunehmend berechnet. — Auf den mehr als problematischen Wert derartiger Berechnungen braucht wohl, besonders bei Berücksichtigung der großen Streuung aller Werte, die die Ergebnisse mehr als Zufallstreffer denn als Ausdruck einer vorhandenen Gesetzmäßigkeit erscheinen lassen, nicht besonders hingewiesen werden. Zeller.

Rubinstein, D. L., und Helene Burlakowa: Über die Speicherung von Natrium und Calcium in der Hefezelle. (Physikal.-Chem. Abt., Bach-Inst. f. Biochem., Moskau.) Biochem. Z. **271**, 324—331 (1934).

Harper, Horace J., and Harley A. Daniel: Chemical composition of certain aquatic plants. (Über die chemische Zusammensetzung einiger Wasserpflanzen.) Bot. Gaz. **57**, 186—189 (1934).

Angaben über den Gehalt von Wasserpflanzen (Eleocharis, Helodea, Jussiaea, Myriophyllum, Nymphaea, Potamogeton, Sagittaria, Typha, Spirogyra, Nodularia) an Phosphor, Stickstoff und Calcium. Zeller (Wien).

Kaiser, Philipp: Über die Inhaltsstoffe des Rhizoms von Curcuma domestica. Pharmazeut. Inst., Univ. Frankfurt a. M. Frankfurt a. M.: Diss. 1933. 35 S.

Das Rhizom von Curcuma domestica ist als Temoe-Lawak in Niederländisch-Indien als Heilmittel gegen Gallen- und Leberleiden in Gebrauch. In letzter Zeit fand die Droge auch in Europa Eingang. Aus der Droge ließ sich durch Wasserdampfdestillation ein ätherisches Öl gewinnen, das klar, leicht beweglich und schwach gelblich-grün ist, gewinnen. Um das wirksame Prinzip der Droge kennenzulernen, wurde zunächst das ätherische Öl analysiert, wobei sich herausstellte, daß es etwa 3,8% der Droge ausmacht. Es besteht aus 85% l-Cycloisoprenmyrcen, 10% p-Tolylmethylcarbinol und 3% d-Campher. Da auch ölfreie Auszüge wirksam sind, wurde nach einem wasserlöslichen Wirkstoff gesucht. Er konnte in Form eines Glykosids festgestellt werden. Das Aglykon ist ein Sesquiterpenalkohol $C_{15}H_{24}O$. Der Zucker konnte in Form von Phenylglykosazon isoliert werden. Auch der Farbstoff von Curcuma domestica konnte in seiner Zusammensetzung erkannt werden. Es ist derselbe Farbstoff, der sich in Curcuma longa findet, das Curcumin (Diferuloylmethan). Zeller (Wien).

Tanret, G.: Sur le glucoside des graines de coronille. (Über das Glykosid der Coronille-Samen.) Bull. Soc. Chim. biol. Paris **16**, 941—956 (1934). Vgl. Ber. Physiol. **81**, 593.

Negodi, Giorgio: Sul pigmento bruno delle brattee di Asphodelus albus e centaurea. (Über das braune Pigment der Brakteen von Asphodelus albus und centaurea.) (Istit. Bot., Univ., Modena.) Riv. Biol. **17**, 1—8 (1934).

In seinen Untersuchungen über die Brakteenfärbung von Asphodelus und Centaurea

taurea konnte Negodi feststellen, daß der Prozeß der Braunfärbung bei Centaurea auf Grund ähnlicher oder gleicher Stoffe sich vollzieht wie bei Asphodelus. Ein Unterschied besteht darin, daß sich bei Asphodelus der Farbstoff frühzeitig in kleinen oder größeren Tropfen in den Zellen sammelt, während er bei Centaurea im Zellsafte gelöst bleibt. Bei Centaurea geht der Farbstoff an bestimmten Stellen vor der Braunfärbung in Anthocyan über, was bei Asphodelus nicht zutrifft. *P. Justus Kalkschmid.*

Stammler, Hans: Über den Gehalt an Vitamin C bei Gräsern, Grünfüttermitteln sowie Obst- und Gemüsearten in verschiedenen Reifestadien. Die Reindarstellung des reduzierenden Stoffes aus gelben Lupinen. Frankfurt a. M.: Diss. 1933. 47 S.

Zunächst untersuchte Verf., mit welcher Vorbehandlung sich aus verschiedenen Gräsern und Futtermitteln die größte Menge von Stoffen, die 2, 6-Dichlorindophenol reduzieren herauslösen läßt. Am besten bewährte sich ein Auszug mit kochendem Wasser aus einem Material, das mit einem Hornmesser zerkleinert worden war. In 27 verschiedenen Gräsern wurde dann der Gehalt an reduzierenden Stoffen festgestellt. Kulturversuche zeigten, daß bis zur Blüte das Alter der Pflanze für den Gehalt an reduzierenden Stoffen ziemlich gleichgültig ist, daß vielmehr der Standort Einfluß auf den Gehalt an reduzierenden Stoffen hat. Auch 8 Grünfüttermittel wurden untersucht und der besonders hohe Gehalt der Lupine an reduzierenden Substanzen festgestellt. Trockene Produkte ergaben immer niedrigere Werte als frische. Ein anderer Abschnitt der Arbeit gibt ausführliche Tabellen über den Gehalt von Obst- und Gemüsearten verschiedener Reifestadien an reduzierenden Substanzen. Die Angaben umfassen 14 Arten Beerenobst, 8 Arten Kernobst, 7 Arten Steinobst, 6 Arten Blattgemüse, 6 Arten Wurzel- und Knollengemüse, 2 Arten Fruchtgemüse. — Eine Anzahl Substanzen wurde ohne Erfolg auf ihre Fähigkeit geprüft, die Autooxydation der reduzierenden Stoffe zu verhindern. Aus gelben Lupinen gelang schließlich die Reindarstellung des reduzierenden Stoffes und seine Identifizierung mit Ascorbinsäure. *Zeller (Wien).*

Berdnikoff, A., et Ch. Champy: Essais de comparaison chimique entre les crêtes de coqs et de chapons. (Versuch zur chemischen Vergleichung des Hahnen- und Kapaunenkammes.) (*Laborat. d'Histol., Univ., Paris.*) C. r. Soc. Biol. Paris **116**, 515—520 (1934).

Der Hahnenkamm ist bedeutend wasser- und phosphorlipoidreicher als der Kapaunenkamm. Auch die Glykoproteiden findet man beim Hahn in einer höheren Konzentration. Die Substanzen, die das spezifische Gewebe des Hahnenkammes (muco-elastisches Gewebe nach Champy und Kritch) charakterisieren, sind also die Glykoproteiden und die Phosphorlipiden. *P. de Fremery (Oss, Holland).*

Bureau, V.: Est-il possible de mettre le manganèse en évidence par des procédés histochemiques? (Ist es möglich, durch histochemische Methoden das Mangan nachzuweisen?) (*Laborat. de Biol. Gén., Univ., Liege.*) Archives de Biol. **45**, 391—396 (1933).

Behrens (Mikrochemische Analyse organischer Verbindungen 1897) und Gössl (Bot. Zbl. **18**) haben eine Methode zum histologischen Nachweis des Mangans in Geweben angegeben. Sie beruht auf der Bildung eines hellbraunen Niederschlages mit Natrium-Arseniumphosphat. Zum Unterschied des ebenfalls braunen Komplexes von FeNH_4PO_4 und des weißen, krystallinischen Niederschlages von MgNH_4PO_4 ist er in Wasser sehr wenig löslich und färbt sich mit Kaliumpermanganat dunkelbraun. In Anbetracht der biologischen Bedeutung des Mangans hat Verf. versucht, diese Methode zur Lokalisation des Mn in den Zellen zu verwenden. Dabei wurden zuerst die Konditionen der Fällungen in vitro ausprobiert, dann die entsprechenden Erfahrungen für den Nachweis in Blättern von Aucuba und in Gewebsschnitten der Süßwassermollusque Anodonta cygnea zu übertragen. Beide biologische Substrate sind als manganreich bekannt. Es zeigte sich, daß die Methode Behrens-Gössl unbrauchbar ist. Im Falle der Anodonta wird allerdings ein brauner Niederschlag im nicht fixierten Gewebe erhalten, aber erst nach 24—48 Stunden. Dabei treten bereits Gewebeveränderungen ein, die eine cytologische Lokalisierung des Mangans nicht mehr erlauben. *Karl Bernhart.*

Eekelen, M. van: About lipochrome and lyochrome pigments in the skin of the frog and the cod. (Über lipochrome und lyochrome Pigmente in der Haut des Frosches und des Kabeljaus.) (*Laborat. of Hyg., Univ. Utrecht.*) Acta brev. neerl. Physiol. et Med. **4**, 65—66 (1934).

Durch ein Extraktionsverfahren, dessen Einzelheiten im Original nachgelesen werden müssen, wird der Nachweis erbracht, daß das fettlösliche gelbe Pigment der Froschhaut aus Carotin und Xanthophyll besteht. Nach der Extraktion der Haut mit fettlösenden Mitteln bleibt noch ein wasserlösliches grüngelbes Pigment zurück. Dieses Pigment ist wahrscheinlich verwandt mit der Farbkomponente der gelben Oxydationsenzyme Warburgs. Dieselben Pigmente finden sich auch in der Haut des Kabeljaus. *Jores (Rostock).*

Machlis, Samuel, and David E. Green: Intracellular oxidation-reduction studies. VII. Mechanism of reduction potentials in starfish sperm. (Studien über intracelluläre Oxydationreduktion. VII. Mechanismus der Reduktion in Seesternsperma.) (*Eli Lilly Research Div., Marine Biol. Laborat., Woods Hole, Mass.*) *J. cellul. a. comp. Physiol.* **4**, 61—78 (1933).

Untersucht wurden mit Hilfe der Clarkschen Indicatoren Spermata-Suspensionen von *Asterias forbesii*. In einer besonderen Versuchsreihe wurde festgestellt, ob die verwendeten Farbstoffe auch in die Zelle eindringen. Die Redoxpotentiale wurden gefunden: aerob zwischen +0,077 und +0,151 V und anaerob zwischen —0,228 und —0,197 V. KCN, H_2S und CO verschieben das Potential zur negativen Seite (—0,019 bis —0,046 V). Diese Reagenzien beeinflussen die anaerobe Reduktion nicht; ihre Wirkung ist reversibel. Das Dehydrogenasengift Äthylurethan verschiebt das Potential zur positiven Seite (+0,203 bis +0,211 V). Das anaerobe Potential dagegen wird von Urethan nicht beeinflusst; die Reduktion ist mit Urethan verzögert. Auch der Urethaneffekt ist reversibel. Monojodessigsäure hat weder einen Einfluß auf das aerobe noch auf das anaerobe Potential. Kochen verändert den Wert des aeroben Redoxpotentials der Sperma nicht. Weder KCN, H_2S noch Äthylurethan beeinflussen das aerobe Potential gekochter Sperma im Gegensatz zur Wirkung dieser Stoffe auf normale Sperma. Dem aeroben Potential kommt nach Verf. keine reelle Bedeutung zu. Die wirklichen Potentiale in der Zelle werden gebildet von dem negativen Dehydrogenase- und dem positiven Oxydasesystem der Zelle. In Übereinstimmung mit Michaelis wird das anaerobe Potential als das in der Zelle realisierte angesprochen. (VI. Beck, vgl. diese Ber. **28**, 678.) *H. Süllmann* (Basel).^o

Metalnikov fils, S. S.: Action des rayons solaires sur les spores de bactéries pathogènes pour les insectes. *Ann. Inst. Pasteur* **53**, 93—99 (1934).

Marčuk, P.: Über die Pigmentkorrelation im Organismus und die Blutveränderungen unter dem Einfluß des Sonnenlichtes und ihre Bedeutung für den Organismus. *Ž. med. Ciklu* **3**, 527—531 u. franz. Zusammenfassung 531 (1933) [Ukrainisch].

Bei der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen der äußeren Pigmentation (der Haare, Augen und Haut) und dem Hämoglobingehalt des Blutes (der inneren Pigmentation) nach Besonnungen fand Verf. folgende Abhängigkeiten, die vor den Besonnungen weniger ausgesprochen waren als nach dem Sonnenbad. Der Hämoglobingehalt bei Blonden und Brünetten schwankte vor der Besonnung nicht über 5%, nach der Bestrahlung über 13%. Die mittlere Schwankungsbreite bei den Blonden war 11,2% (62—73,2%) und bei den Dunklen 20,4% (66—86,9%). Die morphologische Blutuntersuchung ergab mitunter eine gewisse Vermehrung der segmentkernigen Neutrophilen, der Lymphocyten dagegen eine Verminderung der Eosinophilen und Monocyten. Die Blonden zeigten zugleich eine Verminderung der Lymphocyten sowie der Eosinophilen und Monocyten. Die Veränderungen sollen auf ein Anwachsen der Schutzkräfte im Organismus hindeuten. Die Sonnenbestrahlungen erfordern demnach die Beachtung der biologischen Eigenschaften des Körpers, hauptsächlich der Pigmentbildung. Verf. ist der Meinung, daß die Sonnenstrahlen auch die allgemeine Immunität des Körpers erhöhen sowie den Stoffwechsel anregen. Die Heliotherapie sei somit ein hervorragender prophylaktischer Faktor. *R. Gassul* (Kasan).^o

Lumière, Auguste, et S. Sonnery: La nocivité de l'insolation chez les rongeurs et la mort par „coup de chaleur“. (Die Schädlichkeit des Sonnenstiches bei Nagetieren und der Tod durch Hitzschlag.) *J. Physiol. et Path. gén.* **32**, 44—58 (1934).
Vgl. Ber. *Physiol.* **81**, 228. ^{oo}

Dognon, A., et J. Audiat: Étude spectrographique des nerfs soumis à l'irradiation ultra-violette. (Spektrographische Studie an mit UV.-Strahlen bestrahlten Nerven.) (*Laborat. de Physique, Fac. de Méd., Paris.*) *C. r. Soc. Biol. Paris* **116**, 323—325 (1934).

Sutro, Charles J., and Michael S. Burman: Examination of tubular organs and arterial systems of rabbits by filtered ultraviolet radiation. (Zur Prüfung drüsiger Organe und arterieller Systeme der Kaninchen mit Hilfe gefilterter ultravioletter Strahlung.) (*Laborat. Div., Hosp. f. Joint Dis., New York.*) *Arch. Surg.* **28**, 867—873 (1934).

Beobachtet wurde, daß nach einer direkten Injektion einer 2proz. wässrigen Eosin- bzw. Mercurochromlösung in die drüsigen Organe bzw. die Aorta des Kaninchens

diese bei einer nachfolgenden Bestrahlung mit ultravioletttem Licht von der Wellenlänge 366 m μ stark fluorescieren. Langendorff (Stuttgart).

Rücker, Franz: Über die Ultrarot-Reflexion tierischer Körperoberflächen. (*Physikal.-Meteorol. Observat., Davos.*) Z. vergl. Physiol. **21**, 275—280 (1934).

Bei allen untersuchten Objekten wurde eine selektive Reflexion beobachtet. Käferlytren und Schmetterlingsflügel haben ein Maximum bei 1 μ und ein Minimum bei 1,9—2,2 μ bzw. 2,6—3 μ . Bei Schneckenschalen verläuft die Reflexion ähnlich; bei Frosch- und Eidechsenhäuten (trocken) steigt die Reflexionskurve gleichmäßig von den kurzen zu den langen Wellen an. Franz Duspiva (Wien).

Ponthus, P., et A. Husson: Sur la détection de divers produits organiques, et en particulier du sperme humain, par la spectrographie de leur fluorescence en lumière de Wood. (Über den Nachweis verschiedener organischer Stoffe, im besonderen des menschlichen Spermas, durch die Fluoreszenzspektrographie im Woodschen Licht.) (*Laborat. de Physique Biol., Univ., Lyon.*) C. r. Soc. Biol. Paris **116**, 538—541 (1934).

In dem durch ein Nickeloxydglas gefilterten Licht einer Quecksilberlampe (3906—2967 Å) fluorescieren trockene Spermaflecken scharf abgegrenzt intensiv bläulich um so mehr, je älter sie sind. Das Fluoreszenzspektrum erstreckt sich kontinuierlich von 4900—4000 mit einem Maximum bei 4200 Å. Die Zunahme der Intensität bei alten Proben (6 Monate) bezieht sich auf längere Wellen. (Diese Erscheinung ist vielleicht auf Oxydation des Spermins zurückzuführen, wobei 1-, 3-Diaminopropan entsteht, das nur CH₂- und NH₂-Gruppen, sog. „auxoflore“ und „bathoflore“, enthält.) Die Unterlage, verschiedene Wäschestoffe oder Papier, ist ohne Einfluß. Das Fluoreszenzspektrum des Spermas im Ultraviolett ist spezifisch und kann in der gerichtlichen Medizin zur Unterscheidung von Harn, Speichel, Nasen-, Vaginalschleim, Eiter, Zahnpasta, Seife usw. dienen. Halle (Leipzig).

Baeq, Z. M.: Recherches sur la physiologie du système nerveux autonome. V. Reactions du ventricule médian, des chromatophores et de divers organes isolés d'un mollusque céphalopode („*Loligo pealii*“) à l'adrénaline, l'acétylcholine, l'ergotamine, l'atropine et aux ions K, Ca et Mg. (Untersuchungen zur Physiologie des autonomen Nervensystems. V. Reaktionen der Hauptkammer, der Chromatophoren und einzelner isolierter Organe eines Tintenfisches, L. p., auf Adrenalin, Acetylcholin, Ergotamin, Atropin und auf K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺.) (*Marine Biol. Laborat., Woods Hole, Mass.*) Arch. internat. Physiol. **38**, 138—159 (1934).

Reaktionen (+ erregend, — hemmend) auf chemische Reagenzien:

Organ	Adrenalin	Acetylcholin	Ergotamin	K ⁺	Ca ⁺⁺
Herz	+++	---	+++	+++	---
Magen	++	—	+	++	—
Rectum	++	+ (Tonus)	++	++	—
Penis	++	+	+	++	—
Eileiter	++	+	?	++	?
Chromatophoren von der dorsalen Mantelfläche	+	+	+	+++	+

Adrenalin wirkt auf die Chromatophoren nur in einer sehr starken Konzentration (etwa 1%); K⁺ rufen eine Expansion hervor, Mg⁺⁺ wirken antagonistisch. Die Verkleinerung des Quotienten Ca/K durch Vermehrung der K⁺ hat den gleichen Erfolg wie Adrenalin, Vermehrung der Ca⁺⁺ hemmt, aber nicht immer im Sinne des Acetylcholins. Das Gesetz von Zondek (Berlin 1927) gilt nicht für die Cephalopoden. Ca⁺⁺ ist notwendig für die Herztätigkeit (stark hemmend); es wirkt wenig auf die anderen Organe; auch bei Abwesenheit von Ca⁺⁺ erscheint die Kontraktion der Muskeln des Genital- und Verdauungstractus normal. Auch die Wirkung des Adrenalins tritt in Abwesenheit von Ca⁺⁺ ein. Andere Organe, außer dem Herz, wurden nur schwach von Ca⁺⁺ gehemmt; die Chromatophorenmuskeln werden nur in reinen Lösungen erregt (Unterschied zu der Wirkung der Ca⁺⁺ bei den Wirbeltieren). Der Grund liegt wahrscheinlich darin, daß die Menge der hemmenden Ionen (Ca, Mg; Mg 3mal mehr als Ca, hemmt die Muskulatur besonders der Chromatophoren) im Blut der Meeres-

mollusken viel größer ist als im Säugerblut, so daß diese Ionen nur ein schwaches Hemmungsvermögen besitzen, verglichen mit der erregenden Wirkung der K⁺. Ein weiterer Unterschied zu den Wirbeltieren ist die große Breite der Empfindlichkeit verschiedener Organe auf Adrenalin: Herz $1 \cdot 10^{-9}$, Chromatophoren $1 \cdot 10^{-3}$; bei den Säugern findet man für die verschiedensten Organe den gleichen Wert $1 \cdot 10^{-8}$. Der Grund hierfür ist unbekannt. (Vgl. diese Ber. 26, 760.) P. Krüger (Wien).

Ginsburg, Joseph M.: Toxicity of cadmium to chewing insects. (Über die Giftigkeit von Cadmium auf fressende Insekten.) (*New Jersey Agricult. Exp. Stat., New Brunswick.*) Science (N. Y.) 1934 II, 269.

Verf. untersucht die Giftigkeit von Cadmiumoxyden und -hydroxyden auf fressende Insekten. Als Versuchstiere dienten die Raupen von *Malacosoma americana* Fabr., *Bombyx mori* Linn. und außerdem der Käfer *Tribolium confusum* Duv. Die Raupen wurden auf vorher mit verschiedenen Mengen von Cadmiumoxyden und -hydroxyden behandelten Futterpflanzen (Apfel- bzw. Maulbeerbäume) gesetzt. Es zeigte sich eine hohe Sterblichkeit, z. B. starben von *Malacosoma* bei Konzentrationen von 1, 2, 3, 4 pound (1 p = 453,6 g) auf 100 Gallonen (1 Gallone = 4,54 l) Wasser nach 48 Stunden 70% bzw. 90, 100, 100 der Tiere. Bei *Tribolium*, dessen Mehl, das 15% Cadmiumhydroxyd enthielt, verfüttert wurde, waren nach 10 Tagen sämtliche Tiere getötet.

Albrecht Hase und Vera Wellborn (Berlin-Dahlem).

Scheuring, Ludwig, und Ferdinand Leopoldseder: Die Wirkung der wichtigsten Düngesalze auf Fische. (*Bayer. Biol. Versuchsanst., München.*) Arch. f. Hydrobiol. 17, 203—220 (1934).

Veranlaßt wurden die Untersuchungen durch Klagen aus Fischereikreisen über Schädigung und Abtötung der Fische durch Kunstdüngersalze. Im ganzen verwendeten die Verf. 3 verschiedene Salze und Düngemittel, die den 4 Gruppen: 1. Alkali- und Kalksalze, 2. ammoniakaltige Salze, 3. Harnstoff und 4. sog. biologischen Düngemitteln zuzurechnen sind. Die Salze der I. Gruppe sind alle nur schwach alkalisch und relativ unwichtig. Forellen zeigten sich beim Kali widerstandsfähiger als Weißfische. Die Hauptschädigung wurde in der Veränderung des osmotischen Drucks gesehen. Die Salze der Gruppe II schaden dagegen durch ihre hämolytische Wirkung verbunden mit starker Schleimabsonderung besonders an den Kiemen. Der in der III. Gruppe angewandte Harnstoff wurde schädlich durch Wasserentzug, wodurch der Fischkörper starr und steif wurde und nach dem eingetretenen Tode den Eindruck eines getrockneten Fisches machte. Durch die Wägungen wurde bestätigt, daß die Fische große Mengen von Wasser abgegeben hatten. Die in der IV. Gruppe angewandten biologischen Düngemittel konnten selbst in 5proz. Lösung keine Schädigung herbeiführen. Die Verf. kommen zu dem Ergebnis, daß aller Wahrscheinlichkeit nach durch das Streuen von Düngersalzen auf Wiesen und Feldern für die Fische keinerlei Gefahr drohe. Obwohl auch die Konzentration der Lösungen beim Auswaschen von Säcken, welche Ammondünger enthielten, normalerweise gering sein dürfte, raten sie hier zur Vorsicht. Es wäre auch daran zu denken, daß vielleicht durch schwache Lösungen von Düngemitteln die Fortpflanzungsprodukte der Fische geschädigt werden könnten. Darüber liegen jedoch keinerlei Beobachtungen vor. In einem Nachtrag machen die Verf. Vorschläge, in welcher Weise aus Zweckmäßigkeitsgründen eine gewisse Standardisierung bei Untersuchungen über die Wirkung von giftigen Stoffen auf Tiere erfolgen könnte. Es wird eine einheitliche Regelung der Zeitdauer vorgeschlagen, wobei als Normalzeit 6 Stunden bzw. ein vielfaches von 6 in Vorschlag gebracht wird. Für die Grenzfeststellungen wird die Letalitätsgrenze erreicht, wenn die angewandte Konzentration nach Ablauf der Standardzeit (in der Norm 6 Stunden) gerade nicht mehr tödlich wirkt. Die Schädlichkeitsgrenze ist erreicht, wenn der Fisch die gewählte Standardzeit überlebt und auch nachher im Frischwasser innerhalb von 2 Tagen nicht an Vergiftungsfolge eingeht. Die Empfindlichkeit ist erreicht, wenn der Fisch während der Standardversuchszeit nicht reagiert und auch nachträglich in Frischwasser innerhalb von 2 Tagen keine Vergiftungsfolgen auftreten. Schließlich werden noch genormte Bezeichnungen vorgeschlagen, welche in übersichtlicher Weise die Körperlage des Fisches, den Bewegungsmodus und die Frequenz und Art der Atmung versinnbildlichen.

W. Wunder (Breslau).

Zellen- und Gewebelehre.

Morphologie und Physiologie der Zellen und Gewebe.

(*Cytologie, allgemeine Histologie, Histopathologie.*)

Fischer, Hermann: Größenänderungen von Kern und Nucleolus im Blattgewebe. (*Botan. Inst., Univ. Kiel.*) *Planta* (Berl.) 22, 767—793 (1934).

Die reichen, in Tabellen und Diagrammen übersichtlich zusammengefaßten Er-

gebnisse beinhalten interessante Einzelheiten über das Verhalten von Kernen und Nucleolen sowohl in nach Verwundung regenerierendem, wie in normalem Gewebe. Als Untersuchungsobjekt diente vorwiegend *Peperomia blanda* und *Bryophyllum daigremontianum*. Die wichtigsten Beobachtungen sind: Feststellung gleichmäßigen in seinem Wesen von den Ernährungsbedingungen unabhängigen Kernwachstums von der Verwundung offensichtlich bis zum Eintritt der Teilungsfähigkeit; günstige Ernährung (Kultur auf Zuckerlösung) kann die Vorgänge in jungen Blättern lediglich beschleunigen, in alten jedoch verzögern. Das Wachstum erstreckt sich auch auf die Nucleolen, die bei *Peperomia* im Verhältnis schwächer, bei *Bryophyllum* stärker als die Kerne und in deutlicher Abhängigkeit von der Ernährung an Größe zunehmen. Dieselbe Abhängigkeit besteht jedoch auch im gesunden Gewebe, in dem sich sogar eine rhythmische Schwankung im Tagesverlauf nachweisen läßt. Aus der Unregelmäßigkeit der Nucleolengröße innerhalb desselben Gewebes wird eine pulsierende Kerntätigkeit erschlossen. Die in den Kernkörperchen der Versuchspflanzen auftretenden Vakuolen sind keine Artefakte, sondern normale Gebilde. von Berg (Wien).

Pfeiffer, Hans: Vom Lichtbrechungsverhalten von *Tradescantia*-Zellen vor und während der Karyokinese. *Protoplasma* (Berl.) 22, 22—33 (1934).

Verf. gibt nach einem kurzen Hinweis auf die Bedeutung der Lichtbrechungsverhältnisse der Inhaltsstoffe lebender Zellen die einfachsten Methoden an, nach dem Brechungsindex bestimmt werden kann. Es handelt sich dabei um die Immersion, der zu untersuchenden Substanzen in Medien mit bekanntem Brechungsindex. Auftreten von Grenzlinien unter dem Mikroskop und deren Verhalten bei schiefer Beleuchtung des Objektes oder bei Heben des Tubus deuten auf positiven oder negativen Brechungsunterschied. Durch Einengen kann empirisch die gleichbrechende Flüssigkeit und somit der Brechungsindex gefunden werden. Verf. gibt eine Tabelle für Immersionsflüssigkeiten zum Ermitteln des Brechungskoeffizienten von Protoplasma. Die Anwendung der angegebenen Methode an den sich teilenden Staminalhaarzellen von *Tradescantia* ergab vor Einsetzen der Teilung leichte Abnahme, während der Prophase stufenweise Zunahme und vor Eintritt der Telophase Rückgang der Refraktion bis auf den Wert der Ruhezelle. Vielleicht läßt diese Tatsache auf eine Verschiebung des Wasserbindungsvermögens der Plasmakolloide schließen. W. Albach (Gießen)

Krajevöj, S.: Über die tri-, tetra- und hexaploiden Chromosomensätze in den somatischen Zellen von *Scorconera Tau-Saghyz*. (*Genet. Inst., Akad. d. Wiss., Lenin grad.*) *C. R. Acad. Sci. URSS* 3, 284—288 u. engl. Text 286—288 (1934) [Russisch]

Scorconera Tau-Saghyz und 4 weitere *Scorconera*-Arten ergaben als normale Chromosomenzahl der somatischen Zellen $2n = 14$. In den Keimwurzeln der erst genannten Art aus Samen, die in Kasakstan, auf dem Dshelagan-Ata-Gebirge in der Schlucht Kara-Ssai gesammelt waren, wurden jedoch in der Metaphase 2—10% an Zellen mit $2n = 21, 28$ und 42 Chromosomen festgestellt. Alle anderen Herkünfte dieser Art und ebenso die Arten *S. nervosa* Trevir, *hispanica* L., *purpurea* L. und *parviflora* Jacqu. ergaben ausschließlich normale Chromosomenzahlen. Die triploiden und tetraploiden Sätze kommen sowohl im Periblem wie im Phlerom vor, die hexaploiden wurden im Phlerom nicht gefunden. Fälle der Verschmelzung von 2 Kernen zu einem, wodurch sich die tetraploiden Sätze erklären würden, hat Verf. nicht beobachtet. Er glaubt daher, daß die Chromosomenvermehrung durch sekundäre Teilung der Chromosomen vor sich geht. Für die Entstehung der triploiden Sätze konnte eine Erklärung nicht gefunden werden. Die hexaploiden Sätze seien durch Verdoppelung der triploiden entstanden. Ankeinem der Samen bei erhöhter Temperatur beeinflusste die Chromosomenzahlen nicht. Da *S. Tau-Saghyz* sich in der Natur vornehmlich durch Wurzel- ausläufer vermehrt und diese im Phlerom entspringen, hält Verf. seine Feststellung für wirtschaftlich bedeutungsvoll, indem auf diesem Wege triploide und tetraploide Klone von erhöhter Produktivität entstehen könnten. H. v. Rathlef (Halle a. d. S.).

Joyet-Lavergne, Ph.: Nouvelles méthodes générales pour la recherche du chondriome. Leur application à l'étude des champignons. (Neue allgemeine Methoden für die Untersuchung des Chondrioms. Ihre Anwendung bei dem Studium der Pilze.) *Cellule* **43**, 43—66 (1934).

In der vorliegenden Arbeit gibt Verf. zunächst eine Zusammenstellung der neuen Methoden zur Darstellung des Chondrioms. Da diese sich auf das Oxydo-Reduktionsvermögen aufbauen, sind sie von den klassischen Methoden sehr verschieden und sowohl für die pflanzlichen als auch die tierischen Untersuchungsobjekte anwendbar. Das Oxydo-Reduktionsvermögen ist eine allgemeine und auch fundamentale Eigenschaft dieses Gebildes. Die erste Methode benutzt 2 Arten von Reagenzien: 1. solche, die sich in ihrer Farbe durch Oxydation verändern (2proz. Lösungen von Pyrogallol, Metol, Hydrochinon, Diamidophenol); 2. solche, die sich bei Reduktion verändern (1proz. Lösung von Goldchlorür, Silbernitrat, Chromsäure, Kaliumpermanganat und m-Dinitrobenzol). Die zweite Methode verwendet die Oxydations- und Reduktionsvermögen von Farbstoffen, von denen einige sogar die Darstellung des Chondrioms *in vivo* gestatten (die Leukoverbindungen von Chrysylblau, Nilblau, Janusgrün, Lichtgrün und Methylblau). Diese Methode ermöglichte die Darstellung des Chondrioms in einigen Pilzellen, für die es noch nicht beschrieben ist. Im zweiten Teile der Arbeit sind die Ergebnisse dieser neuen Untersuchungsmethoden (erhalten an 6 verschiedenen Pilzarten) mitgeteilt.

W. Albach (Michelstadt, Odenwald).

Menke, Wilhelm: Chloroplasten-Studien. II. Mitt. (*Mineral. u. Pflanzenphysiol. Inst., Univ. Graz.*) *Protoplasma* (Berl.) **22**, 56—62 (1934).

In der vorliegenden 2. Mitteilung versucht Verf., aus den Verhältnissen der optischen Anisotropie der Chloroplasten Aufklärung über deren Struktur zu erlangen. Die Chloroplasten von *Mougeotia* leuchten dann hell auf, wenn die Fadenrichtung diagonal zu den Schwingungsrichtungen der Nicols verläuft. Durch Imbibition der Chloroplasten von *Closterium* mit Glycerin konnten die Gangunterschiede vermindert werden, sie verschwanden bei größerer Glycerinkonzentration, um sogar mit entgegengesetztem Vorzeichen aufzutreten. Daraus ergibt sich, daß die Chloroplastendoppelbrechung auf einer optisch-positiven Formdoppelbrechung mit einer schwachen negativen Eigendoppelbrechung der Teilchen beruht. Die Chloroplasten stehen nicht unter Spannung. Sie sind kolloidale Systeme, in denen die Teilchen sich in verschiedenen Ordnungsständen befinden. Ein Teil der Phasen ist ungeordnet über den Chloroplastenraum verteilt, vermutlich ist es die hydrophile Eiweißphase. Die Teilchen der Lipoidphase sind teilweise gesetzmäßig geordnet, aber nicht dreidimensional (Raumgitter der Kristalle), sondern ein- oder zweidimensional. Die Teilchen (Micelle) sind wohl amorph. Auftretende Eigendoppelbrechung wird durch die Phytosterinkristalle verursacht. (vgl. diese Ber. **31**, 273.)

W. Albach (Michelstadt, Odenwald).

Scharrer, Ernst: Über die Beteiligung des Zellkerns an sekretorischen Vorgängen in Nervenzellen. (*Neurol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.*) *Frankf. Z. Path.* **47**, 143—151 (1934).

In Erweiterung seiner histologischen Befunde an sekretorisch tätigen Nervenzellen konnte Verf. nun an den Zellen des Nucleus lateralis tuberis des Hechtes und der Schleie eine morphologisch faßbare und sehr auffällige Teilnahme des Zellkerns an der Sekretbildung feststellen. Beim Hecht erscheinen in der medialen Partie des Nucleus lateralis tuberis die Zellkerne zipfelig ausgezogen; zwischen den Zipfeln finden sich Kolloidtröpfchen. Bei der Schleie dagegen entsteht das Sekret innerhalb des Zellkerns: es tritt Kolloid in Tropfenform direkt im Kerngerüst auf, und außerdem findet man in den Kernen große körnchengefüllte Blasen, die den Kern bisweilen so aufblähen können, daß er schließlich nur noch wie eine feine doppelwandige Hülle des Sekretes erscheint. Diese Blasen sind auch frei im Plasma festzustellen und scheinen durch das Ependym hindurch in den Ventrikel ausgestoßen zu werden. — Auffällig ist die verschiedene Ausbildung des Nucleus lateralis tuberis bei den einzelnen Fischen: bei *Fundulus heteroclitus* fehlt der ganze Nucleus lateralis tuberis; bei *Rhodeus* sind keine Zelleinschlüsse vorhanden; bei *Crenilabrus pavo* enthält das Plasma kleine, in van Gieson-Präparaten gelbgefärbte Körnchen. — Trotz dieser Ganglienzellen ungewöhnlichen Einschlüsse, und obgleich sich im Bielschowsky-

Präparat keine Fibrillen nachweisen ließen, hält Verf. die geschilderten Zellen für nervöse Elemente — und nicht etwa für hypertrophierte Gliazellen —, weil sie lange Fortsätze und feinkörnige Nißl-Schollen besitzen. Gegen ihre Deutung als pathologische Veränderungen (Takahashi 1922) spricht ihr regelmäßiges Vorkommen bei allen Barschen, Hechten und Schleien, sowohl im männlichen wie im weiblichen Geschlecht. Wenn auch die Möglichkeit, daß es sich bei jenen Einschlüssen um resorbiertes Hypophysenkolloid handelt, nicht ausgeschlossen werden kann, meint Verf. doch, daß die eigentümlichen Kernformen auf eine besondere sekretorische Tätigkeit des Nucleus lateralis tuberis hindeuten, zumal in neuerer Zeit immer mehr neurohumorale Vorgänge physiologisch nachgewiesen werden konnten. — Nach den bisherigen Untersuchungen des Verf. lassen sich im Fischgehirn drei verschiedene neurokrine Bezirke nachweisen, denen ventrikelnah Lage, reiche Gefäßversorgung, kolloidartige Zelleinschlüsse und besondere Zellstrukturen gemeinsam sind: 1. der Nucleus praeopticus pars magnocellularis (vor allem bei *Crenilabrus pavo* und *Cristiceps argentatus*; entsprechende Befunde bei Amphibien, Reptilien und Säugern sowie beim Menschen); 2. der Nucleus lateralis tuberis (*Esox*, *Perca*, *Tinca*); 3. kleine ähnliche Zellgruppen im Mittelhirn (vor allem *Phoxinus*, *Crenilabrus*, *Tinca*, *Rhodeus*). *Erich Ries* (Leipzig).

Radu, V. Gh.: Recherches relatives aux mécanismes sécrétoires dans les cellules. Étude comparative des cellules glandulaires du canal déférent chez quelques isopodes (Untersuchungen über die sekretorischen Mechanismen in den Zellen. Vergleichende Untersuchung der Drüsenzellen im Samengang bei einigen Isopoden.) (*Laborat. de Morphol. Animale, Univ., Jassy.*) Arch. roum. Path. expér. 7, 33—68 (1934).

Nach einer allgemein gehaltenen Literaturbesprechung der Probleme: Golgi-Apparat, Mitochondrien, Vakuom und Ergastoblasten werden die cytologischen Ergebnisse einer Untersuchung des Samenganges von 3 Isopoden (*Armadillidium vulgare*, *Porcellio convexus* und *P. pictus* [?]) ausführlich geschildert. Der Samengang zerfällt in 2 Abschnitte. Im proximalen, „nierenförmigen“ Abschnitt arbeiten die Zellen des sekretorischen Epithels asynchron, so daß dort leicht alle Stadien des Arbeitsrhythmus der Zellen nebeneinander zu finden sind. Diese Zellen zeigen drei verschiedene Cytoplasmastrukturen: „le chondriome ordinaire, les ergastoblastes et le vacuome.“ Die Ergastoblasten (D. Voinov 1928) sollen sich wegen ihrer färberischen und chemischen Übereinstimmungen irgendwie von den Mitochondrien ableiten lassen; sie vermehren sich jedoch selbständig durch Teilung, wachsen heran und bilden das Prosekret, während ein Teil von ihnen jeweils in teilungsfähigem Zustand für die folgende Arbeitsphase der Zelle zurückbleibt. Das Sekret entsteht in neu auftretenden Vakuolen in den Ergastoblasten, um sich dann in Sekretgranula umzuwandeln und schließlich in viele kleine Körnchen zerfallen, die extrudiert werden, während die Ergastoblasten schon vorher vergehen. — Es ergibt sich aus der Darstellung, daß die Ergastoblasten durch die Diktyosomen mit typischem, osmiophilen Externum und osmiophoben Internum entsprechen; sie sind im Leben infolge ihrer starken Lichtbrechung auch ungefähr deutlich erkennbar, lassen sich nur schwer basisch vital färben und sind am besten mit Mitochondrientechniken darzustellen. Verf. betrachtet die Ergastoblasten als typische Zellorganelle. Die Chondriosomen werden von ihm dagegen mit den von Jakobs (1928) bei *Astacus* beschriebenen Basalfilamenten, also typischen Ergastoplasmadifferenzierungen, verglichen; sie sollen dementsprechend keine speziellen Organelle mit bestimmter Struktur sein, sondern sie werden als eine fein verteilte Substanz aufgefaßt, die an der Basis der Zelle aus resorbierten Stoffen gebildet wird und in ihrer Quantität stark mit dem Arbeitsrhythmus schwankt. Sie sollen weiterhin irgendwie zum Aufbau der Ergastoblasten beitragen. Recht unklar bleibt das Ende der Vakuolen. Sie werden als nichtkonstante Zellstrukturen angesehen, die in der Sekretbereitungsphase entstehen und eine sekundäre Rolle bei der Sekretpreparation spielen. Auf bestimmten Stadien vor der Sekretbereitung soll sich weder durch Vitalfärbung noch nach Fixierung, Färbung und Imprägnierung ein Vakuom nachweisen lassen.

lassen; doch sollen andererseits auch in solchen Fällen nach exzessiver Neutralrotfärbung gefärbte Vakuolen, über deren Natur nichts weiter gesagt wird, auftreten. Ob nur die zuerst in den Ergastoblasten auftretenden „Vakuolen“ in ihrer Gesamtheit als das „Vakuom“ aufgefaßt werden, ist aus der Arbeit nicht recht ersichtlich. (Vgl. diese Ber. 10, 42 u. Voinov, 9, 804.)

E. Ries (Leipzig).

Miyagawa, Rempei: Studien über die Hortegaschen Zellen. II. Mitt. (*Path. Inst., Prov. Med. Fak., Kyoto.*) (24. gen. meet., Tokyo, 2.—4. IV. 1934.) *Transactiones Soc. path. jap.* 24, 345—346 (1934).

Die Hortegaschen Zellen wurden beim Kaninchen in verschiedenen pathologischen Experimenten untersucht. Durch Tusche demonstrierte Verf. die phagocytaire Funktion dieser Zellen. Nach Verletzung des Hirngewebes treten zahlreiche Kernteilungsfiguren in den H. Zellen auf. Bei verschiedenen akuten Infektionskrankheiten umwandeln die H. Zellen in sog. Stäbchen- und Fettkörnchenzellen. Verf. fand nur bei der Weilschen Krankheit regelmäßige Mitosen in den H. Zellen. Funktionell sind die H. Zellen den Histiocyten sehr ähnlich, morphologisch und hinsichtlich Färbbarkeit ist jedoch zwischen beiden Zellarten ein großer Unterschied. Die H. Zellen sind nach Verf. spezifische feste Neurogliazellen. (Vgl. diese Ber. 31, 22.)

F. Kiss (Budapest).

Rossi, O.: Reperti nuovi in tema di innervazione della fibra muscolare striata. (Neue Befunde zum Thema der Innervation der quergestreiften Muskelfaser.) (*Clin. l. Malatt. Nerv. e Ment., Univ., Pavia.*) *Monit. zool. ital.* 45, 197—203 (1934).

Verf. untersuchte Zungenmuskeln von jungen Kaninchen und Katzen mikroskopisch und fand, daß in den Muskelfasern Nervenendausbreitungen vorhanden sind, welche aus kleinen, nahebei liegenden sympathischen Ganglien herzuleiten sind. Damit ist ein sicherer Beweis für die sympathische Innervierung des quergestreiften Muskels gegeben. Weiter beschreibt Verf. dickere Fasern, die sich in der Nachbarschaft der oben erwähnten Ganglien T-förmig teilen; der eine Ast führt zum Ganglion, der andere endet zwischen den Muskelfasern und bildet dort eine motorische Endigung von bekannter Art.

H. Löwenbach (Berlin-Dahlem).

Lebowitch, R. J.: Phagocytic behavior of interstitial cells of brain parenchyma of adult rabbit toward colloidal solutions and bacteria. (Das phagocytaire Verhalten der Interstitialzellen des Gehirnparenchyms erwachsener Kaninchen gegenüber kolloidalen Lösungen und Bakterien.) (*Eugene Littauer Mem. a. Fulton County Laborat., Nathan Littauer Hosp. a. Dep. of Path., Albany Med. Coll., Gloversville, N. Y.*) *Arch. of Path.* 18, 50—71 (1934).

Durch Rio-Hortega ist das 3. Element der Cajal-Zellen in 2 Gruppen aufgeteilt worden, in die Mikroglia- und die Oligodendrogliazellen. Über die Funktionen dieser Zellen besteht in der Literatur noch keine Übereinstimmung, insbesondere nicht darüber, ob die Mikrogliazellen als die alleinige Quelle der Makrophagen im Gehirn anzusehen sind, oder ob auch den Astrocyten die gleiche Funktion zukommt. Zur Klärung wurden an Kaninchen Versuche durchgeführt vorgenommen, daß experimentell durch Punktion eine Läsion im Schläfenlappen gesetzt wurde und den Tieren dann, meist auf dem Blutwege, Trypanblau, Tusche, kolloidale Eisenlösung, Blutpigment oder Bakterien injiziert wurden. In der Umgebung der Läsionen ließen sich alle Übergänge von den ruhenden Mikrogliazellen bis zu den ausgebildeten Makrophagen beobachten. Während in den ruhenden Zellen niemals Phagocytose beobachtet wurde, zeigte ein kleiner Teil der aktivierten Mikrogliazellen Speicherung der kolloidalen Stoffe und der Bakterien. Je mehr eine Zelle in ihrer Struktur diejenige der Makrophagen erreicht, desto intensiver ist die Speicherung. Die Speicherung der Vitalfarbstoffe kann als weiterer Beweis für den mesenchymalen Ursprung der Mikrogliazellen angesehen werden. — In den Neurogliazellen und den Oligodendrogliazellen wurde keinerlei Phagocytose beobachtet. Ebenso fehlt diese Funktion den endothelialen Zellen der Gehirnblutgefäße, die demnach nicht zum dem spezifischen endothelialen System gehören. Dagegen wurden phagocytaire Elemente unter den Adventitialzellen beobachtet.

Habs (Heidelberg).

Roskin, G.: Die Myomzelle und einige Probleme der Muskelzelle. (*Histol. Laborat., Wiss. Inst. f. Zool., Univ. Moskau.*) *Arch. Anat.* 13, 3—26 u. dtsch. Text 163—187 (1934) [Russisch].

Es wurden 8 verschiedene Myome cytologisch untersucht und dabei eine ungeheure

Variabilität der Muskelzelle festgestellt, wobei ein auffallend hoher Wert des Variationskoeffizienten in der Kerngröße vorhanden ist. Myofibrillen werden nicht gleichmäßig in der ganzen Zelle gebildet, sondern regional an den Enden oder nur an einer Stelle. Meist entsprechen die Fibrillen denen der glatten Muskelzelle, auch wenn die Geschwulst (nicht Geschwür) von quergestreifter Muskulatur stammt. Es kommen aber auch, wenn auch seltener, quergestreifte Fibrillen neben solchen ohne Inophragmen vor. In einzelnen Fällen war ein und dieselbe Fibrille an verschiedenen Stellen bald glatter, bald quergestreifter Natur. Die Grenze zwischen glatter und quergestreifter Muskulatur ist also fließend, besonders da von Houette ein Rhabdomyom der Blase und von Eben-Carey experimentell aus glatter Harnblasenmuskulatur eine quergestreifte hergestellt wurde. Die Myomzelle ist keine Embryonalzelle, denn neben Vereinfachungen und Degenerationserscheinungen finden progressive Prozesse statt, die einen charakteristischen Symptomenkomplex für die Geschwulst liefern, ebenso wie die Histogenese, Regeneration und Bildung *in vitro* ihre spezifischen Symptomenkomplexe besitzen, die natürlich zum Teil miteinander übereinstimmen können. Leider ist die Arbeit voll von Druck- und sprachlichen Fehlern. *H. Marcus* (München).

Haughton, Isabel: Note on the amoeboid elements in the blood of *Helix aspersa*. (Bemerkung über die amöboiden Elemente im Blut von *Helix aspersa*.) (*Zool. Dep., Trinity Coll., Dublin.*) *Quart. J. microsc. Sci.* **77**, 157—166 (1934).

Nach Stichverletzung in der Nähe des Herzens gewonnene wiederholte Blutproben ergaben ein stetiges Anwachsen der Leukocytenmenge, das schon 15 Minuten nach der Verletzung einen bemerkenswert hohen Grad erreichte, während die normale Leukocytenmenge des Blutes nur eine geringe ist. Die Zellen strecken zunächst zahlreiche feine Pseudopodien aus, die sich dann mit denen anderer Zellen verbinden, im weiteren Verlaufe kontrahieren und so schließlich zu einer dichten Zusammenklumpung der Zellen führen. Wenn die Zellklumpen mit dem Deckglase in Berührung kommen, strecken sie breite, flache Pseudopodien aus und bilden so ein Netzwerk. Phagocytose dieser Zellen gegenüber Carmin konnte nachgewiesen werden. Explantiertes Herzgewebe (Atrium) ergab im Blut als Kulturmedium in weniger als 24 Stunden typische Netzwerke von ausgewachsenen bzw. ausgewanderten Zellen. Explantate der unverwundeten Schnecke ergaben die Erscheinung nur in weniger als der Hälfte der Fälle, während solche von vor 4—5 Tagen vorher verwundeten Tieren fast immer positiv waren. Die Kulturen blieben bis zu 6 Tagen steril, vielleicht als Folge der Leukocytennatur der Zellen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß es sich hier wie im Blute nicht um Wachstum bzw. Zellvermehrung, sondern nur um Zellwanderung handelt, und zwar um Leukocyten. Denn die Zellen verhalten sich ganz so wie die des Blutes. Wenn Ventrikelgewebe ein weniger massenhaftes „Wachstum“ in der Kultur zeigt, so ist die Ursache dafür wohl das kleinere Ventrikellumen und die daher geringere Blut-, d. h. Leukocytenmenge. Auch die Zellen der Herzkulturen zeigen die gleiche Phagocytose wie die Blutzellen. Die Blutelemente der Herzkulturen und die der bindegewebigen Netzwerke im Mantelgewebe zeigen keinerlei Unterschiede, weder im frischen noch im fixierten und gefärbten Zustande.

H. Joseph (Wien).

Levi, Giuseppe: Explantation, besonders die Struktur und die biologischen Eigenschaften der *in vitro* gezüchteten Zellen und Gewebe. *Erg. Anat.* **31**, 125—707 (1934).

Der Verf., ein Histologe von Weltruf, bediente sich der Methode der Gewebezüchtung fast seit ihrer Einführung. Die Entwicklung dieser Methode blieb mit dem Namen Levi untrennbar verbunden; ihm und seinen Schülern verdankt dieser moderne Zweig der Biologie zahlreiche und bedeutendste Ergebnisse. Es gibt darum nur wenige, die wie er dazu berufen sind, in einem großen zusammenfassenden Werk die durch die Methode der Gewebezüchtung gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse kritisch zu ordnen und überlegener Sichtung zu unterwerfen. Die Art, mit der der Verf. diese Aufgabe erfüllt, ist meisterhaft. Im Vordergrund des Interesses des Verf. liegt die Erforschung der strukturellen Eigenschaften der gezüchteten Zellen und Zellverbände

er versäumt aber dabei nicht, bei jeder gebotenen Gelegenheit auch allgemeine zellologische Probleme, die zur Vertiefung unserer Kenntnisse der deskriptiven Cyto- und Histologie beitragen können, ins Gesichtsfeld zu ziehen. So übermittelt uns der Verf. eine eingehende und umfassende Kenntnis des Baues der Zelle in vitro und der Zellkultur, deren Studium jetzt mehr und mehr von vielen Forschern leider vernachlässigt wird zugunsten einer Betrachtungsweise, die in der Kultur fast ausschließlich ein technisches Hilfsmittel zur Erforschung verschiedenartigster biologischer Probleme ist. Der Verf. verzichtet bewußt auf die Besprechung der gesamten Literatur, sogar auf seinem eigenen Gebiet. Viele Arbeiten werden mit vollem Recht mit Schweigen übergangen, viele kurz und vernichtend beurteilt. Von den wertvolleren Arbeiten wird doch das Wesentliche hervorgehoben, von Schlacken befreit und ins Richtige gestellt. Jedem Befund, und das ist das Wertvollste in diesem Werk, wird außerdem sein voller Sinn dadurch verliehen, daß seine Tragweite für die allgemeine Zell- und Gewebelehre erläutert wird. Die Gewebezüchtung wird in dieser Beleuchtung zu einer Methode, die die Forschungsmöglichkeiten der klassischen Cytologie und Histologie ungemein erweitert, aber in keinerlei Widerspruch zu den deskriptiven biologischen Disziplinen gerät, sondern mit ihnen eine organische Einheit bildet. Das Werk zerfällt in drei große Abschnitte. A. Allgemeines über Gewebezüchtung. B. Allgemeine morphologische und biologische Eigenschaften der Zellen in der Gewebekultur. C. Spezielle morphologische Eigenschaften der Zellen in den Kulturen. Der erste Abschnitt ist als eine allgemeine Einführung gedacht und enthält sehr ausführliche und manchmal wertvolle Angaben über die Technik der Gewebezüchtung. Anschließend werden verschiedene Wachstumstypen der Kulturen besprochen und grundsätzliche Fragen der Proliferation in vitro angeschnitten. Hier findet auch die Züchtung von Geweben von niederen Tieren und „Explantation“ in vivo eine kurze Erwähnung. In dem zweiten Abschnitt wird das Problem der Zellform, Zellgröße und die Frage der Zelländerung in vitro ausführlichst auseinandergesetzt; anschließend werden die morphologischen und funktionellen Beziehungen der Zellen zueinander erörtert; dann folgt die eingehendste Besprechung der feinen Struktur des Cytoplasmas und des Kernes der in vitro gezüchteten Zellen; daran schließen sich die Kapitel über protoplasmatische Einschlüsse, Vitalfärbung, Phagocytose, über die Veränderungen der Struktur des Cytoplasmas in Abhängigkeit von verschiedenen Nährmedien und grundsätzliche Auseinandersetzungen über die Zellteilung und die Wachstumserscheinungen in vitro. Die Kapitel über Regeneration der Zellkolonien und über die Einwirkung der chemischen und physikalischen Faktoren auf das Wachstum der Gewebekulturen schließen diesen Teil der Arbeit. Das Thema des letzten Abschnittes ist das Verhalten der verschiedenen Gewebsarten in vitro. Hier werden die Eigenschaften und Besonderheiten der verschiedenartigen Epithelkulturen abgehandelt, sowie unsere Kenntnisse über das Verhalten des Mesenchyms in vitro dargelegt. Es folgen dann Kapitel über die Kulturen der zelligen Blutelemente und der blutbildenden Gewebe, der Züchtung der glatten und quergestreiften Muskulatur und dem Nervengewebe gewidmet sind. Am Schlusse findet sich ein kurzer Bericht über die Züchtung von Geschwulsten. Das Werk enthält zahlreiche, sorgfältig ausgesuchte und tadellos wiedergegebene Abbildungen.

A. Fischer (Kopenhagen).

Ephrussi, Boris, et A. Litvac: Quelques résultats de la statistique des mitoses dans les cultures d'épithélium rénal du lapin. (Einige statistische Ergebnisse über die Mitosen in Kulturen von Kaninchennierenepithel.) (*Inst. de Biol. Physico-Chim., Paris.*) Arch. exper. Zellforsch. 16, 203—220 (1934).

Sehr schöne Untersuchungen über Zahl, Ablauf und Verteilung der Mitosen an einem besonders geeigneten Material, nämlich an den großen einschichtigen Epithelmembranen, die von der frisch explantierten Kaninchenniere gebildet werden. Diese Membranen entstehen zunächst durch Zellauswanderung. Erst wenn die Membran bereits gebildet ist, vermehren sich die Zellen durch Mitose. Zwischen dem Nieren-

gewebe neugeborener und erwachsener Kaninchen besteht kein Unterschied in der Größenordnung der Mitosenhäufigkeit. Die gefundenen Zahlen sind etwas kleiner als die aus den bekannten Untersuchungen Fischers an einer Fibroblastenkultur was dem langsameren Wachstum des Epithels entspricht. Eine starke Bevorzugung der peripheren Teile der Wachstumszone hinsichtlich Mitosenzahl besteht nicht. Diese Verhältnisse ähneln also den von Fischer an einer Carcinomkultur festgestellten. Es wird vermutet, daß die gleichmäßigere Verteilung der Mitosen über die ganze Wachstumszone nicht so sehr charakteristisch ist für malignes als vielmehr für epitheliales Gewebe im Gegensatz zum mesenchymalen. *Knake (Berlin).*

Latta, John Stephens, and Harald Norlin Johnson: Studies of lymphatic tissue grown in vitro with splenic extract as culture medium. (Untersuchungen an lymphatischem Gewebe in vitro, mit Milzextrakt als Züchtungsmedium.) (*Dep. of Anat., Coll. of Med., Univ. of Nebraska, Omaha.*) Arch. exper. Zellforsch. **16**, 221—229 (1934).

Ausführliche Darstellung von Versuchsanordnung und Befunden ohne wesentliche neue Ergebnisse. *Knake (Berlin).*

Burkhardt, L.: Beobachtungen an explantiertem Fettgewebe. (*Path. Inst., Univ. Gießen.*) Arch. exper. Zellforsch. **16**, 187—202 (1934).

Einzelne Zellen von ausgepflanztem Fettgewebe des Meerschweinchens werden in mehreren Übertragungen mit Hilfe von Zeichnungen und Photogrammen genau verfolgt. Besonders Knochenmark ist für fortlaufende Beobachtung günstig. Das Protoplasma der Fettzellen wird aktiviert, es tritt in verschiedener Form am Rande der Zellen hervor. Gebilde von Makrophagenart lösen sich von den Zellen ab. Die Fettzellen können ihren Ort aktiv verändern. Sie zeigen teilweise lebhafte Stoffwechselvorgänge, d. h. Zahl, Größe und Form der Fettvakuolen einer Zelle sind im Laufe von Tagen sehr wechselnd. Aus diesen Befunden und aus entsprechenden Beobachtungen an pathologisch-anatomischem Material wird geschlossen, daß Fettzellen an regenerativen und reparatorischen Vorgängen aktiv teilnehmen können; ferner daß die Fettzellen trotz ihrer hohen Spezialisierung gewisse Eigenschaften und Fähigkeiten mesenchymaler Zellen erhalten bleiben. *Knake (Berlin).*

Péterfi, T., und St. C. Williams: Elektrische Reizversuche an gezüchteten Gewebekulturen. II. Versuche an verschiedenen Gewebekulturen. (*Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol. Berlin-Dahlem.*) Arch. exper. Zellforsch. **16**, 230—240 (1934).

Mit einer bereits früher beschriebenen Methodik haben die Verff. nunmehr auch an anderen Zellen als an Nervenzellen elektrische Reizversuche durchgeführt und dabei festgestellt, daß die Reaktion auf den elektrischen Reiz sehr verschieden ausfällt. Fettzellen, flache Mesenchymzellen, epitheloide Zellen, großen Monocyten, Satellitenzellen und Sarkomzellen bleiben ohne jegliche Reizbeantwortung; dagegen ließen die meisten der kleinen amöboiden Zellformen (kleine Monocyten, Wanderzellen der Milzkulturen, Mikrogliazellen u. a.) einen ausgesprochenen Kathodotropismus erkennen, der sich vor allem in der Bewegungsrichtung äußert; strukturelle Veränderungen sind dabei nicht feststellbar. Die Fibroblasten des embryonalen Herzens zeigen einen ausgesprochenen Anodotropismus, der in einer sehr langsamen und gleichmäßigen Verschiebung des Cytoplasmas kenntlich wird, ohne Auftreten einer Körnelung. Bei mechanischem Reiz mit der Mikronadel erweisen sie sich als ebenso empfindlich wie die Neuroblasten. Quergestreifte Muskelzellen (aus der Rückenmuskulatur von 12—14 Tage alten Hühnerembryonen gezüchtet) lassen sowohl bei galvanischer wie faradischer Reizung langsame Kontraktionen erkennen, aber ohne sicher feststellbare Strukturänderung; auch die Lage der Anode oder Kathode zur Faser ist völlig gleichgültig (sekundäre rein funktionelle Reizbeantwortung). (I. vgl. diese Ber. **27**, 539.) *A. Hartman*

Péterfi, T., und St. C. Williams: Elektrische Reizversuche an gezüchteten Gewebekulturen. III. Versuche an Mischkulturen. (*Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol., Berlin-Dahlem.*) Arch. exper. Zellforsch. **16**, 241—254 (1934).

Die Versuche wurden ausgeführt an Mischkulturen, welche einerseits aus Gehirns-

und Herzplantaten und andererseits aus Gehirn- und Skelettmuskelplantaten bestanden. Das Wachstum in den Mischkulturen zeigte sich günstig: es konnten schon vom 2. Tage Verbindungen zwischen herauswachsenden Axonen oder Neuroblasten und Herzfibroblasten oder Myoblasten beobachtet werden. Bei Reizung von mit fremden Zellen zusammenhängenden Axonen bemerkt man bei den breiten flachen Mesenchymzellen und bei den Herzfibroblasten während und nach der Reizung keine merkliche Strukturveränderung, doch tritt die Reizung am Endkölbchen in typischer Weise durch Anschwellen in Erscheinung. Die großen Gliazellen antworten durch Schwellung des Zellkörpers und bei den Myoblasten zeigt sich die Wirkung in einer Kontraktion des gereizten Endes der Zelle. Werden an Stelle einzelner Axone ganze Neuroblasten, deren Axone mit fremden Zellen in Verbindung getreten waren, gereizt, so erfolgt eine Körnelung des Neuroblasten, eine Quellung des ganzen Axons und eine besonders deutliche Quellung des Endkölbchens mit der ganzen in seiner nächsten Umgebung liegenden Stelle der innervierten Zelle. Handelt es sich um Myoblasten, so werden dieselben an beiden Enden dünner und zeigen gröbere Körnelung als vorher. Die Verff. glauben mit ihren Versuchsergebnissen den Beweis erbracht zu haben, daß die in vitro gezüchteten Neuroblasten die Grundeigenschaft des Nervengewebes, nämlich die Fähigkeit zu einer spezifischen Reizübermittlung schon besitzen und daß die Struktur- und Formveränderungen, welche bei direkter Reizung der Neuroblasten für diese Zellart charakteristisch gefunden wurden, mit der Funktion des Neurons innigst zusammenhängen. Sie treten ebenso auf bei einer Reizleitung durch das Neuron und werden begleitet von typischen Struktur- und Formveränderungen seitens der Effektorzellen. Die morphologischen Kennzeichen der Reizübermittlung werden im ganzen Bereich des Neurons und an der Innervationsstelle fast gleichzeitig sichtbar, sobald die primäre Reaktion des gereizten Neuroblasten manifest wurde. Diese primäre Reaktion kann auch bei derselben Stromstärke verschieden sein, je nachdem, ob man den Reiz durch einen peripheren Fortsatz zum Neuroblasten leitet oder den Zellkörper direkt reizt. In beiden Fällen tritt eine irreversible Körnelung (Tigroid?) und eine Formänderung auf; eine polar gerichtete Cytoplasmaverschiebung (Abwanderung von der Kathode) ist jedoch nur bei direkter Reizung bemerkbar. Die Effektorzellen beantworten den durch das Neuron geleiteten Reiz in derselben Form wie dieser auch bei der direkten elektrischen Reizung für die Zellart charakteristisch ist; die Reizbeantwortung der Effektorzelle tritt jedoch bei einer Reizung durch den Axon oder das ganze Neuron rascher und in stärker ausgeprägter Form auf, als bei direkter elektrischer Reizung ohne Mitwirkung des Neuroplasmas.

Hartmann (München).

Wesle, Otto: Kontraktion der Magen-Darmmuskulatur des Hühnerembryos in der Gewebeskultur. Tübingen: Diss. 1934. 15 S.

Der Magen-Darmtractus von verschiedenen alten Hühnerembryonen wurde als Deckglaskulturen in jüngeren Stadien vollständig, in älteren Stadien mit Auswahl explantiert. Beobachtungen der Kontraktion bzw. der Peristaltik einmal täglich. Der Magen zeigt in jüngeren Entwicklungszeiten, der Darm in höherem Alter die meisten Kontraktionen. Als Zentren der Bewegung werden die Ganglienzellhaufen angesehen. Es wird angenommen, daß mit fortschreitendem Alter die Magenmuskulatur so überreichlich entwickelt wird, daß nicht jede Kultur nervöse Elemente enthält. Dagegen sind die Ganglienzellhaufen über den Darmtractus gleichmäßig und dicht verteilt. Wachstum und Kontraktion beeinflussen sich gegenseitig nicht. Die Wachstumszonen hatten keine selbständige Bewegung.

Knake (Berlin).

Masson, P.: La mitonécrose. (Die Mitonekrose.) *Hommage Mém. Cantacuzène* 95—505 (1934).

In unmittelbar nach dem Exitus im Gefolge infektiöser Erkrankungen entnommenen Organen (Nebennierenrinde bei Grippe, Leber bei Peritonitis, Septikämie u. a.) fanden sich im Gegensatz zu dem normalen Verhalten sehr viele Mitosestadien. Die Kernteilung wird jedoch nur eingeleitet; Prophasen sind normal, Metaphasen meistens

bipolar, die Spindeln normal differenziert. Meist schon in der Metaphase setzt eine Pyknose der Chromosomen ein. Sie verklumpen zu untereinander verschmelzenden Kugeln. Später erfolgt Chromatolyse, die Chromosomen verlieren ihre Basophilie. Die gelegentlichen Ana- und Telophasen werden unter den gleichen Erscheinungen sistiert. Neben diesen Mitonekrosen treten andere celluläre Degenerationsformen auf. Während in der Leber keine bevorzugte Region vorkam, fand sich in der Nebennierenrinde die Hauptmenge der Mitonekrosen in der Zona fascicularis und der Grenze zur Zona reticularis hin. Verf. sucht Übereinstimmungen zwischen der Mitose und der Nekrobiose aufzustellen, bei beiden kämen gleiche Sol-Gelveränderungen u. a. vor, die Mitose sei „eine cyclische Krankheit“ und die Mitonekrose stelle eine Übergangserscheinung zwischen beiden, bei der die Zelle nicht „genesen“ kann, dar. *H. Bauer*.

Ludford, R. J.: Factors influencing the growths of normal and malignant cells in fluid culture media. (Faktoren, die das Wachstum normaler und bösartiger Zellen in flüssigem Kulturmedium beeinflussen.) (*Stroud Laborat., Imp. Cancer Research Fund, London.*) *Proc. roy. Soc. Lond. B* **115**, 278—297 (1934).

Verschiedene Mäuse- und Rattentumoren wurden in flüssigem Medium gezüchtet. Einige wuchsen weder in Mäuse- noch in Rattenserum, andere nur in Mäuseserum, andere in beidem. Tumoren des gleichen Stammes, aber verschiedener Generationen, zur gleichen Zeit und im gleichen Medium gezüchtet, können große Verschiedenheiten zeigen. Fibroblasten und Monocyten bzw. Makrophagen aller untersuchten Tumoren leben sowohl in Ratten- wie in Mäuseserum gut. Zellen, die in Rattenserum nicht flächenförmig wachsen, tun es in Rattenplasma. Mäusetumor 63, der 4 Tage lang in Rattenserum nicht gewachsen war, wuchs 24 Stunden nach Übertragung in Mäuseserum plattenförmig. Durch Waschen und Zusatz von Rattenserum werden die Membranen zersprengt, sie wachsen aber wieder bei Rücküberführung in Mäuseserum. Die Membranbildung hängt weniger von wachstumsfördernden oder -hemmenden Substanzen ab als davon, ob die Zellen in dem betreffenden Medium am Glas haften können. Mäuscarcinom 206 wächst in Jensen-Rattensarkomimmunsersum ebenso gut wie im Serum junger Ratten. Verschiedenes Verhalten gegenüber Trypanblau wird beschrieben. Das Auftreten von viel Makrophagen ist für die Membranbildung hinderlich wegen der phagocytotischen Fähigkeit dieser Zellen und weil sie die Tumorzellen vom Glas abdrängen. Die Tätigkeit dieser Zellen wird bei „Immuntieren“ die Hauptrolle zugeschrieben. Untersucht Tumoren: Mäusesarkom 37, Crocker 2529, Mäuscarcinom 63, 206, Teercarcinom 2146 und 173, Mammacarcinom 27, 113, 91, Twort-Carcinom, Bonne-Teersarkom, Jensen-Rattensarkom 41 und 46.

Demuth (Berlin).°°

McCarrison, Robert, and G. Sankaran: Effect of plasma from polyneuritic fowls on the growth in vitro of embryo-chick intestine. (Die Wirkung von Plasma polyneuritischer Hühner auf das Wachstum von embryonalem Hühnerdarm in vitro) (*Nutrit. Research Laborat. of the Indian Research Fund Assoc., Coonoor, S. India*) *Indian J. med. Res.* **22**, 67—70 (1934).

Es ist bekannt, daß Vitamin-B-Mangel Beziehungen zur Funktionsschädigung des Magen-Darm-Tractus hat. An Kulturen von embryonalem Hühnerdarm wurde eine Wachstums hemmung im Plasma von polyneuritischen Hühnern beobachtet. — Selbige kleine Zahl von Versuchen.

Knake (Berlin).

Ueno, Harutake: Ein Beitrag zur Gewebszüchtung des menschlichen Carcinoms besonders mit Cervix- und Portiocarcinom. (*Gynäkol. Klin. u. Path.-Anat. Inst., Univ. Fukuoka.*) (23. gen. meet., Fukuoka, 5.—7. IV. 1933.) *Transactiones Soc. path. jap.* **23**, 710—712 (1933).

Piezenko, Borys: Beitrag zum Problem der Verimpfung der heteroplastischen bösartigen Neubildungen. I. Eine neue erfolgreiche Verimpfungsmethode der heteroplastischen Neubildungen und der histologische Bau der experimentell erlangten Neubildungen bei Mäusen, die mit dem Jensensarkom einer Ratte geimpft wurden. *Bull. internat. Acad. pol. Sci., Cl. Méd.* Nr 1/2, 111—128 (1934).

Zusatz von normalem Mäuseblut macht die Überimpfung von Jensen-Sarkom auf Mäuse in 50 % der Fälle möglich. Die entstehende Neubildung war auf weitere Mäuse nunmehr auch ohne Zusatz von Blut möglich. Hämolysiertes Blut war weniger, das Stroma der roten Blutkörperchen gar nicht wirksam.

Druckrey (Berlin).°°

Agduhr, Erik: Studies on the influence of some natural fats and their components on animal tissue structures. I. The influence on some organic structures of different fatty substances, fats and fatty oils of vegetables and animals. (Untersuchungen über den Einfluß von einigen Naturfetten und ihrer Bestandteile auf tierische Gewebstrukturen. I. Der Einfluß auf einige Organstrukturen von Fettsubstanzen, Fetten und Fettölen pflanzlicher und tierischer Herkunft.) (*Histol. Inst., Univ. Upsala.*) Uppsala Läk.för. Förh., N. F. **39**, 307—394 (1934).

Aus den umfangreichen Versuchen an weißen Mäusen mit Verfütterungen von pflanzlichen Ölen (Olivenöl, Sojabohnenöl, raffiniertes Sojabohnenöl und Palmöl) und tierischen Fetten (Eidotter, Butter, Oleum leucisci, Unterhautfett, Dorschlebertran) geht hervor, daß bei entsprechend langer Verfütterung dieser Substanzen immer deutliche, im einzelnen Falle in ihrer Stärke allerdings verschiedene Schädigungen an den Nebennieren, Nieren, Herz und Leber nachzuweisen sind. — Bezüglich aller Einzelheiten muß auf die gründliche Originalarbeit verwiesen werden, da im Rahmen eines Referates unmöglich alle Einzelheiten gebracht werden können. *Max Clara.*

Keimzellen.

Pady, S. M.: Meiosis in *Milesia marginalis*. (Die Reduktionsteilung bei *Milesia marginalis*.) (*New York Bot. Garden, New York.*) Bull. Torrey bot. Club **61**, 345 bis 354 (1934).

Die Teleutosporen von *Milesia marginalis* werden im Frühjahr in den Epidermiszellen der überwinterten Wedel von *Thelypteris marginalis* gebildet. Das Mycel, das zwischen den Blattzellen liegt, ist zweikernig. Es dringt schließlich in die Epidermiszellen ein, und es entsteht die Initialzelle, in der sich die beiden Kerne gleichzeitig teilen. Es entstehen dann mehrere zweikernige Zellen. Darauf verschmelzen die beiden Kerne, auch die beiden Nucleoli bilden einen einzigen großen Nucleolus. Das Chromatin ist zu dieser Zeit zu einem sehr zarten Netz angeordnet. Nach kurzer Ruhe beginnt die heterotype Prophase (Diakinese). Es entsteht ein Spirem, wobei die Chromatinden in der Peripherie liegen. Bei genügender Feuchtigkeit beginnen jetzt die Teleutosporen zu keimen. Das Promycel dringt durch eine enge Keimpore nach außen, durch die auch der ganz schmal gewordene Kern wandert. Danach ballt sich das Chromatin in der Mitte des Kerns zusammen und ist außen von einem farblosen Hof umgeben. Darauf wird eine intranucleäre Spindel gebildet, an deren Enden Centrosomen feststellbar sind. Die bis dahin ganz verklumpt zusammenliegenden Chromosomen wandern an Polen zu. Die Chromosomenzahl soll 8 betragen. Nach der Tochterkernbildung setzt die 2. Teilung ein, die ähnlich verläuft wie die erste, es wird auch ein Spirem gebildet. Es entsteht auf diese Weise ein vierzelliges Promycel, an dem 4 Sterigmen gebildet werden mit 4 Basidiosporen. *F. Moewus* (Erlangen).

Miduno, Tadamasu: Cytologische Untersuchungen der Bryophyten. I. Die Morphologie der Spermatozoiden einiger Hepaticen. (*Div. of Plant-Morphol. u. of Genet., Bot. Inst., Imp. Univ., Tokyo.*) J. Fac. of Sci. Univ. Tokyo III **4**, 367—387 (1934).

Verf. gibt eine Beschreibung der Morphologie der Spermatozoiden der Hepaticen: *Dumortiera hirsuta*, *Marchantia polymorpha*, *Conocephalus conicus* und *D. supradecompositus*. Auffallend ist bei den Spermatozoiden von *Dumortiera* die große Anzahl der Cilien. Von 500 ausgezählten hatten 50% 4, der Rest 2 Cilien, 10 hatten 6 und eines sogar 8. Mit Ausnahme von *Riccardia pinguis* wurden noch bei keinem Moos mehr als 2 Cilien gefunden. Verf. glaubt darin einen Ausdruck der Verwandtschaft dieses Mooses mit den Farnen zu sehen. Das Kernstück der Spermatozoiden von *Dumortiera* ist sichelförmig, an den Enden zugespitzt. Das Plasmastück haftet am hinteren Ende und enthält zwei dunkel gefärbte Punkte und viele Körnchen. Bei *Marchantia* ist das Kernstück fadenförmig, das Plasmastück länglich und enthält eine Vakuole, einen Punkt und viele Körnchen. Bei den *Conocephalen* ist das Kernstück stabförmig, bei *C. conicus* sind in ihm ein dunkel gefärbter Punkt und

viele Körnchen zu beobachten, der Anheftungspunkt des Plasmastückes liegt immer an der konkaven Seite des Kernstückes. — 4 Tafeln mit ausgezeichneten Mikrophotographien erläutern den Text. In 2 Tabellen, die bisher vorliegende Angaben zusammenstellen, ist zu ersehen, daß die Unterschiede der Klassen, der Reihen oder der Gattungen in der Morphologie des Spermatozoids ihren Ausdruck finden. Verf. vermutet, daß weitere Untersuchungen noch feinere Strukturen verdeutlichen und Beiträge für die Phylogenie und die Klassifikation liefern. *W. Albach* (Michelstadt, Odenwald).

Johansen, D. A.: Haploid chromosomes of *Riccia glauca*. (Die haploiden Chromosomen von *Riccia glauca*.) *Bull. Torrey bot. Club* **61**, 381—383 (1934).

Auf Grund von Untersuchungen an reichem Material wird die haploide Chromosomenzahl von *Riccia glauca* mit $n = 8$ festgestellt und die bisher vorhandenen Widersprüche (Beer 7—8, Heitz 9, Wentzel 8) damit überholt. Die Reifeteilungen zeigen 2 große und 5 etwas kleinere Gemini, sowie ein sehr kleines kugeliges Bivalent, dessen Partner stets vorzeitig bereits in der Metaphase auseinandergehen und in der Anaphase vorausseilen. Die großen Gemini verzögern ihre Trennung hingegen nicht selten bis zur späten Anaphase der übrigen Chromosomen. *v. Berg* (Wien).

Sass, John E.: Chromosome fragmentation in *Lilium tigrinum* Ker. (Chromosomenfragmentation bei *Lilium tigrinum*.) (*Botany Dep., Iowa State Coll., Iowa City*. *Amer. Naturalist* **68**, 471—478 (1934).

Leptotaen und Zygoten in den P.M.Z. der untersuchten Pflanzen verliefen normal. Spiralige Windungen sollen der Ausdruck von „Spannungen“ sein, die auf die Orientierung „struktureller Einheiten“ bei der Konjugation zurückgeführt werden. Und weil ungepaarte Teile von Homologen spiegelbildlich gleich sind, sollen sie „koordiniert“ (? Ref.) aus dem „Reticulum“ hervorgehen. Gelegentlich wurden in Anaphase I oder II ein oder mehrere Nachzügler beobachtet. Es kommt nicht zur Trennung, so daß die aneinander gehefteten Chromosomen bei der Bildung der Zellwand zerschnitten werden; dadurch können auch Fragmente entstehen. Die Verzögerung soll auf irgend einem Defekt im Teilungsmechanismus beruhen. *Propach* (Müncheberg, Mark).

Koshy, T. K.: Chromosome studies in *allium*. II. The meiotic chromosomes (Chromosomenstudien an *Allium*. II. Die meiotischen Chromosomen.) *J. microsc. Soc.*, III. s. **54**, 104—120 (1934).

Der allgemeine Ablauf der Meiose ist der übliche. Unter Berücksichtigung des Verhaltens der Chromonemata kommt der Verf. zu einer die heutigen Bestrebungen zu einer kausalen Analyse der Meiose ablehnenden Auffassung. Nach ihm bestehen die Telophasechromosomen der letzten prämeiotischen aus 2 ineinander gewickelten Chromonemata. Dementsprechend sind auch die nach der Interphase ausgebildeten Leptotänchromosomen ihrer ganzen Länge nach doppelt. Durch sehr enge Zusammenlagerung der Chromonemata wird der Anschein eines Aufbaues aus Chromomeren gegeben. Vor der an beiden Enden beginnenden Paarung setzt eine bestimmte Kontraktion der Chromosomen unter weitgehendem Selbständigwerden ihrer Chromatiden ein. Die Trennung der Partner und die Schleifenbildung im Diplotän beruhen nur auf der Umeinanderwicklung der Partner und ihrer verschieden starken Kontraktion. Die Anzahl der Umschlingungen wird im längsten Chromosom von 18 auf 4 und weniger reduziert. Auch in der Diakinese sind die Tetraden infolge stark wechselnder Zusammenlagerung der Chromatiden jedes Partners und durch die Umwicklung der Homologen kompliziert gebaut. Die einfachen Bilder Darlington's sollen lediglich auf Überfärbung beruhen. In der Telophase trennen sich die Chromonemata jeder Dyade, wobei sie nur am Spindelfaseransatz vereinigt bleiben. In der späten Prophase der 2. Reifeteilung erfolgt in jedem Chromonema der Längsspalt, so daß die Mikrosporen längsgespaltene Chromosomen aufweisen. Damit bestehen die Chromosomen während des ganzen Cyclus aus 2 Chromatiden, deren Längsspalt jeweils in der späten Prophase erfolgt und der nur vor der 1. Reifeteilung ausfällt. Das Problem der Chromosomenpaarung liegt nach Verf. in der Frage nach dem Zustandekommen der Paarung der

ungsgespaltenen Chromosomen. Die Versuche von Darlington und Huskins, die mit ungespaltenen rechnen, werden ebenso wie die weiteren Ansichten über den cytologischen Mechanismus des Crossing-over abgelehnt. (I. vgl. diese Ber. 29, 302; Darlington, 13, 99 u. Huskins, 25, 360.) *H. Bauer* (Berlin-Dahlem).

Hoare, Gladys V.: A comparative study of the chromosomes of *Scilla nonscripta* during somatic and meiotic mitosis. (Vergleichende Studien an den Chromosomen von *S. nonscripta* während der somatischen und der Reifeteilungen.) (*Dep. of Botany, Roy. Holloway Coll., Univ., London.*) *Cellule* 43, 5—42 (1934).

Verf. setzt ihre Untersuchungen an *S. nonscripta* fort und bringt Beobachtungen über den feineren Bau der Chromosomen während des Kernformwechsels. Danach ist in den Chromosomen der Mitose durch alle Phasen hindurch eine Doppelspirale vorhanden. In der Interphase und frühen Prophase liegen die Spiralen so dicht beieinander, daß eine Einheitlichkeit vorgetäuscht werden kann. In der späteren Prophase wird aber die Doppelnatur deutlich erkennbar, wenn sich die Spalthälften „auseinanderwickeln“. Fast gleichzeitig wird in jedem Tochterchromosom eine neue Doppelspirale sichtbar, die von der Metaphase bis zur Telophase bestehen bleibt. Diese neue Doppelspirale ist also die Vorbereitung zur nächsten Teilung. — Die letzten prämeiotischen Teilungen in den Antheren waren hinsichtlich des Spiralbaues von den normalen mitotischen Chromosomen nicht verschieden. Dementsprechend nimmt Verf. an, daß die Leptotaenchromosomen schon aus 2 Chromonemata beständen (vgl. hierzu die Beobachtungen von Huskins an *Fritillaria meleagris*). Die zweite Spaltung, die bei der Mitose zu einem vorübergehenden „Vierspiralenstadium“ führt, soll durch die Paarung der Homologen unterdrückt werden. Eine Ursache für diese Paarung wird nicht angegeben. Die Gegensätze zu der Frühreifehypothese Darlington's sind offenbar, eine Auseinandersetzung hierüber unterbleibt aber. Weiterhin werden noch Mitteilungen über die Chiasmafrequenz der gut unterscheidbaren Einzelchromosomen und das Verhalten des Nucleolus gemacht. In den R.T. der Embryosackmutterzellen und Endospermteilungen wurden ebenfalls Spiralstrukturen gefunden. Die Arbeit ist ziemlich unausgeglichen, weil die Auswertung der Beobachtungen über die Spiralstrukturen für die Theorie der Reifeteilung zu oberflächlich und willkürlich ist. (Vgl. a. diese Ber. 30, 23.) *Propach* (Müncheberg, Mark).

Medwedewa, G.: Cytologische Studien über *Ramie* (*Boehmeria nivea* L.). Züchter 228—234 (1934).

Es wurden 12 Klone aus den Hauptanbaugebieten der *Ramie* cytologisch untersucht. Die Chromosomenzahl war für alle einheitlich $2n = 28$. Die Embryosackentwicklung verläuft nach dem Normaltypus. Im reifenden Embryosack sterben aber die Synergiden und die Antipoden ab, so daß die reife Makrospore nur 2 Kerne enthält (Eikern und Polkern). Die Befruchtung geht auch nach dem Normalschema vor sich; Parthenogenese wurde nie beobachtet. Diese Feststellung wurde durch Isolationsversuche bestätigt. Dabei zeigte sich auch, daß nach Selbstbestäubung ebenso reicher Samenansatz erfolgte wie nach Fremdbestäubung. *Propach* (Müncheberg, Mark).

Friedman, Bernard, and Myron Gordon: Chromosome numbers in Xiphophorus fishes. (Chromosomenzahlen bei Fischen des Tribus Xiphophorini.) (*Zool. Laborat., Cornell Univ., Ithaca.*) *Amer. Naturalist* 68, 446—455 (1934).

Die 6 in Mexiko vorkommenden Arten (*Platypoecilus couchianus*, *P. xiphidium*, *P. variatus*, *P. maculatus*, *Xiphophorus montezumae* und *X. helleri*) weichen mit Ausnahme von *P. variatus* in der Metaphase der 1. Reifeteilung 24 Tetraden auf. *P. variatus* hat 25 Chromosomenelemente, die als 24 Tetraden und eine univalente Dyade gedeutet werden. (Diese Annahme bestätigende Teilungsphasen wurden nicht untersucht. B.) In Männchen aus der Artkreuzung *P. variatus* × *P. maculatus* kommen entweder 25 Chromosomen, darunter das Univalente, oder 24 vor, unter denen ein besonders großes als trivalentes gedeutet wird. Die Chromosomenzahl von *P. variatus* soll sich durch Fragmentation erklären lassen. *H. Bauer* (Berlin-Dahlem).

Terni, T.: Recherches de micrurgie et de U.V. microradiopiqûre sur les spermatozoïdes des urodèles. (Mikrurgische und Strahlenstiche mit ultravioletem Licht an Urodelenspermien.) (*3. internat. Zellforscherkongr., Cambridge, Sitzg. v. 21.—26. VIII. 1933.*) Arch. exper. Zellforsch. **15**, 335—340 (1934).

An Spermien von Urodelen, hauptsächlich von Geotriton, ließ sich sowohl durch Strahlenstiche mit ultravioletem Licht, wie auch durch mikrurgische Nadelstiche beweisen, daß das Zentralkörperchen im Zwischenstück entgegen unseren bisherigen Ansichten nicht das Bewegungszentrum des Schweifes darstellt. Man kann den Schwanz in zwei und mehr Stücke zerlegen, ohne daß die Bewegung irgend eines dieser Teilstücke aufhört. Die Kante der ondulierenden Membran besitzt fibrilläre Struktur. Sie ist wie eine Geißel contractil, sowohl im ganzen wie in Teilstücken. Wenn man mit Licht oder Nadel den Saum verletzt, dann hört die Bewegung nur an der Verletzungsstelle auf. Die notwendige Voraussetzung für das Schlagen des Saumes ist seine Insertion am Achsenfaden. Wenn man den Spermienkopf oder das Perforatorium bestrahlt, so kann man die Permeabilität des Spermiums für Flüssigkeit verändern.

von Lanz (München).

Dubintschik, J.: Der Einfluß physikalisch-chemischer Faktoren auf die Lebensfähigkeit der Spermatozoen. Ginek. Nr **3**, 79—86 (1934) [Russisch].

Versuche wurden angestellt mit Sperma vom Menschen, Hunde, Widder und Hengst. In hypotonischen Lösungen — 3proz. Glykose, 5proz. Saccharose, 0,3proz. NaCl — werden die fortschreitenden Bewegungen der Spermatozoen langsamer und hören häufig ganz auf. In hypertonischen Lösungen — 15proz. Glykose, 20proz. Saccharose und 3,5proz. NaCl — hört jegliche Bewegung sofort auf. Bei einem p_H von 4,2 verlieren fast alle Spermatozoen ihre Beweglichkeit, gewinnen sie aber wieder, wenn die aktuelle Reaktion nach der alkalischen Seite hin verschoben wird. Bei einem p_H von 3,5—3,4 erfolgt eine vollständige irreversible Paralyse. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß bei Zusatz von Milchsäure zu menschlichem Sperma die Verschiebung der aktuellen Reaktion nach der sauren Seite in viel höherem Maße gelingt als bei Zusatz von HCl. Anscheinend bleibt bei Zusatz von Mineralsäuren das Pufferungsvermögen des Spermas sehr weitgehend erhalten. Die Widerstandsfähigkeit des Spermas gegenüber Viscositätsänderungen wurde mit den Apparaturen von Determann und Ostwald geprüft. Die Beweglichkeit war aufgehoben in 20proz. Gummi arabicum Lösung bei einer Temperatur von 35°, wesentlich verlangsamt waren die Bewegungen in 20proz. Gelatinelösung. In 25proz. Gelatinelösung hörte jede Bewegung auf. Auf die Bewegung zähen Cervixschleimes in Fällen primärer Sterilität wird in diesem Zusammenhang hingewiesen. Nach ihrer Giftigkeit konnten die Kationen in nachfolgender Reihe geordnet werden: Fe, Zn > > > Ca > NH₄ > Na > > Ka. Von den Anionen hemmten die Beweglichkeit am stärksten Citrate, in weitem Abstand Jodide und Chloride. Sulfate und Tartrate schienen sogar die Beweglichkeit in günstigem Sinne zu beeinflussen! Oberflächenaktive Stoffe beeinflussten in sehr weitgehendem Maße das Sperma. Zu Versuchszwecken dienten 1proz. Kernseifenlösung, 1proz. oleinsaurer Natrium, 1proz. Lösung von Rindergalle, 1proz. glykohl- und tauroholsaures Natrium. Bolus alba hatte auf das Sperma keinerlei Einfluß. Gegenüber Temperaturwechsel zeigte sich folgendes Verhalten: In einem Reagensglas bei 37° aufgehoben, verlor der größte Teil des Spermas seine Beweglichkeit nach 2½ Stunden, bei Zimmertemperatur sistierten die Bewegungen bei einem Teil der Samenfäden nach 5½ Stunden, doch konnte man auch noch am nächsten Tage an einem Teil des Materials lebhaft Bewegungen feststellen. Bei einer Temperatur von 8° waren die Bewegungen nach 4½ Stunden lebhaft, nach 5½ Stunden setzten die Bewegungen bei einem Teil der Spermatozoen aus.

v. Knorre (Riga).

Martinovitch, P.-N.: La ligature temporaire des ovaires de la lapine et le problème de l'ovogenèse post-natale chez cet animal. (Die vorübergehende Unterbindung der

Ovarien beim Kaninchen und das Problem der postnatalen Oogenese bei diesem Tier.) *Inst. Centr. d'Hyg., Belgrade.*) C. r. Soc. Biol. Paris **116**, 1294—1297 (1934).

Eine vollständige Unterbindung von 72 Stunden genügt bei Ovarien jeden Lebensalters zur Abtötung aller Eizellen in den Ovarien. Eine Neubildung von Keimzellen nach Aufhebung der Ligatur wurde nicht beobachtet. *Spiegel* (Tübingen).

Einzellige.

(Cytologie.)

Hausman, Leon Augustus: On the revivification of certain species of protozoa after twenty years of encystment. (Wiederbelebung gewisser Protozoenarten nach 20jähriger Encystierung.) (*Dep. of Zool., New Jersey Coll. f. Women, Rutgers Univ., New Brunswick.*) Amer. Naturalist **68**, 456—462 (1934).

Im Jahre 1914 war in der Nähe von Ithaca N. Y. aus einem alten Wassertrog eine Wasserprobe und etwas Bodensatz entnommen worden. Sie enthielt neben anderen Protozoen reichlich *Amoeba guttula* und *limax*, *Mastigamoeba* sp., *Chilodon cucullulus*, *Holophrya* sp., *Oxytricha bifaria*, *Colpoda* sp. und verschiedene nicht näher bestimmte kleine Mastigophoren. Nachdem die Probe eingetrocknet war, wurde sie in einer zugeschmolzenen Glasröhre aufbewahrt. 20 Jahre später wurde das Sediment in sterilen Heuaufguß gebracht. Schon nach wenigen Tagen enthielt die Flüssigkeit zahlreiche kleine Mastigophoren (*Oikomonas* sp.) sowie einige *Mastigamoeba* sp. Da alle erforderlichen Vorsichtsmaßregeln beachtet wurden und da keine von den Kontrollserien Protozoen enthielt, ist anzunehmen, daß sich die beiden Formen in der Infusion nach 20jähriger Encystierung entwickelt hatten. *Berta Scharrer* (Frankfurt a. M.).

Tai, Li-Sun: On the cultivation of a photosynthetic dinoflagellate (*Ceratium* sp.). (Über die Kultivierung eines photosynthetischen Dinoflagellaten [*Ceratium* sp.].) (*Dep. of Biol., Nat. Tsing Hua Univ., Peiping.*) Chin. J. Physiol. **8**, 111—118 (1934).

Um die Faktoren, welche die sehr weitgehende Variabilität bei den marinen Dinoflagellaten bestimmen, zu analysieren, ist die Kultivierung unter kontrollierbaren Bedingungen notwendig. Die Kultur ist bisher nur bei *Gloeodinium montanum* auf Torfagar gelungen (Reichardt 1927). Verf. untersucht die Kulturbedingungen bei einer unbekannten *Ceratium*art, welche einen gelben Chromatophoren enthält und „offensichtlich photosynthetisch ist“. Die Kulturversuche werden in frischem unbehandelten Seewasser begonnen. Hier verhindert übermäßiges Bakterienwachstum jede Entwicklung der Ceratien. Kulturversuche in durch Kochen sterilisiertem und durch Bakterienfilter filtriertem Seewasser schlagen ebenfalls fehl. Der störende Einfluß der Bakterien wird eliminiert durch Verwendung von Seewasser, welches 8 Monate im Dunkeln gestanden hatte. Dann wird der Einfluß der wichtigsten Nährstoffe, der Stickstoffspender und der Phosphate geprüft. Von Phosphaten werden K_2HPO_4 und Na_2HPO_4 zugesetzt und kein Unterschied in ihrer Wirkung beobachtet. Als Stickstoffspender erweisen sich die Ammoniumsalze ungeeignet, während Nitratstickstoff, als KNO_3 zugesetzt, günstige Ergebnisse zeitigt. Als Standardmedium für die weiteren Licht- und Temperaturversuche wird Seewasser mit 0,025% KNO_3 und 0,025% K_2HPO_4 verwendet. Der Einfluß der Lichtintensität wird mit 35—100-Watt-Lampen beobachtet und mit steigender Intensität ein Steigen der Wachstumsrate festgestellt. Temperaturen zwischen 10° und 25° lassen Wachstum zu. Als Optimum werden Temperaturen zwischen 13° und 20° gemessen. Irgendwelche spez. Einflüsse auf die Variabilität werden nicht mitgeteilt. Es wird bei der Kultur lediglich festgestellt, daß die Variabilität ebenso stark ist wie in der Natur und dabei die gleichen Varianten auftreten, wie sie auch in der Natur gefunden werden. *Tüngler* (Berlin-Dahlem).

Adler, S., e R. Ashbel: Il metabolismo della Leishmania. Nota prelim. (Der Stoffumsatz von *Leishmania*. Vorl. Mitt.) (*Istit. di Parassitol., Univ., Gerusalemme.*) Arch. zool. ital. **20**, 521—527 (1934).

Verschiedene Stämme von *Leishmania* gedeihen in der Lösung von Kaninchenserumalbumin in Locke, dagegen nicht in der Globulinlösung in Locke. *Leptomonas culici-*

darum und *Herpetomonas muscidarum* wachsen sowohl in Albuminlösung in Locke als in Globulinlösung in Locke. Der Gaswechsel der verschiedenen Stämme und Arten von *Leishmania* ist in der Tabelle ausgedrückt.

Autoreferat.

Mac Lennan, R. F., and H. K. Murer: Localization of mineral ash in the organelles of *Trichonympha*, a hypermastigote flagellate from *Zootermopsis angusticollis*. (Die Lokalisation der Mineralaschen in den Organellen von *Trichonympha*, einem zu den Hypermastigoten gehörigen Flagellat aus *Zootermopsis angusticollis*.) *J. of Morph.* 56, 231—241 (1934).

Mit Hilfe der Mikroveraschung von ganzen Flagellaten und Schnitten sowie durch spezifische Reaktionen wird das Vorkommen von Mineralbestandteilen in *Trichonympha campanula*, *T. collaris* und *T. sphaerica* untersucht. Bevorzugte Stellen bilden das neuromotorische System, der Kern und einige Granulationen des Cytoplasmas. Organisch gebundenes Eisen ist im Chromatin nachzuweisen. Calcium findet sich vorwiegend im Chromatin, neuromotorischen System, in der Kernmembran, in endoplasmatischer Körnung und Zonen aktiver Absorption. Westphal (Hamburg).

Jepps, Margaret W.: On *Kibisidytes marinus*, n. gen., n. sp., and some other rhizopod protozoa found on surface films. (Über *Kibisidytes marinus*, n. gen., n. sp., und einige anderen an Oberflächenhäutchen gefundene Rhizopoden.) *Quart. J. microsc. Sci.* 77, 121—127 (1934).

Ein bisher unbekannter mariner Rhizopode wird beschrieben. Die Größe beträgt 10—14 μ . Das Protoplasma ist undurchsichtig, daher sind Einzelheiten schwer zu erkennen. Eine contractile Vakuole scheint zu fehlen. In Hämatoxylinpräparaten zeigt sich kein Chromidium, dagegen enthält der Kern unregelmäßig zerstreute, färbare Granula. Die Tiere heften sich mit ihrer bräunlichen Schale an der Wasseroberfläche oder an festen Gegenständen an. Die Dicke der taschenförmigen, gewöhnlich mit braunem Material inkrustierten Schale ist variabel. Durch die einzige Öffnung treten die sehr feinen verzweigten Pseudopodien aus. Die Hauptnahrung der Tiere scheinen Bakterien darzustellen. Teilungsstadien wurden nicht beobachtet, dagegen läßt das Vorkommen zweier Organismen in einer Schale auf eine Vermehrung durch Zweiteilung schließen. Die systematische Stellung ist noch nicht sicher; Verf. stellt die Tiere vorläufig zu den Protomyxiden. Als Name wird *Kibisidytes marinus* vorgeschlagen. Die beschriebene Form wird mit zwei an der Oberfläche von Süßwasser anzutreffenden, braunschaligen Arten *Microcometes paludosa* Cienk. und *Microgromia elegantula* Penard verglichen, über die noch einige kleinere Beobachtungen mitgeteilt werden.

Berta Scharrer (Frankfurt a. M.).

Westphal, Alb.: Studien über Ophryoscoleciden in der Kultur. (*Protozool. Abt. Inst. f. Schiffs- u. Tropenkrankh., Hamburg.*) *Z. Parasitenkde* 7, 71—117 (1934).

Um über die Physiologie der Panseninfusorien, vor allem über ihren Kohlehydratstoffwechsel, Aufschluß zu erhalten, wurde ein Kulturverfahren ausgearbeitet, mit dem eine möglichst genaue Nachahmung des natürlichen Pansenzustandes, insbesondere seiner Gärungsvorgänge, erstrebt wurde.

Als Medium dient aus Schlachthofmaterial gewonnener Pansenbrei, der nach mindestens 48stündigem Aufenthalt im Kühlschrank infusorienfrei geworden, im übrigen unverändert ist mit Zusatz von etwas Stärke. Die günstigste, durch Zugabe von 10proz. Harnstofflösung aufrechterhaltene Reaktion ist schwach basisch, die geeignetste Temperatur 39°. Für das Wachstum der Infusorien sind ferner anaerobe Bedingungen (Verschluß durch Paraffinöl) und gleichmäßige Verteilung des Mediums (automatische Rührvorrichtung) erforderlich. Bei täglicher Verdünnung der Kultur mit frischem Pansenbrei ist eine praktisch unbegrenzte Fortführung möglich.

Die Infusorien teilen sich um so rascher, je stärker die Verdünnung ist. Nach 5 Wochen konnte eine Vermehrung auf das 2,45fache erreicht werden. Cystenbildung war nicht zu beobachten. Die Versuchsergebnisse beziehen sich in der Hauptsache auf *Eudiplodinium medium*. Die eingehenden morphologischen Untersuchungen bringen Klarheit über den Bau der Skeletplatten und über das bei den Ophryoscoleciden bisher umstrittene Ento-Ektoplasmaproblem. Letzteres umfaßt drei morphologisch

unterscheidende Zonen, deren äußerste bisher von vielen Autoren zum Ektoplasma gerechnet wurde und enthält den Kern, die Skeletplatten und die Vakuolen. Die an Total- und Schnittpräparaten untersuchten Skeletplatten zeigen unter sich keinen engen Zusammenhang und keine Konstanz der feineren Struktur, sondern vielmehr eine deutliche Abhängigkeit vom inneren Kohlehydratstoffwechsel der Infusorien. Nach Verfütterung von Reisstärkepulver ist verhältnismäßig rasch die Auflösung der Stärke und die Bildung von Paraglykogen zu beobachten. Die Ablagerung dieses Reservestoffes geschieht an den fibrillären Stützbildungen des Entoplasmas. Von diesen stellen Ablagerungsorte 1. Ordnung die im übrigen nur aus Fibrillen bestehenden Skeletplatten dar. Solche 2. Ordnung sind die mit kräftigen Fibrillen ausgestattete Umgebung des Schlundes und der Anlröhre und die Anhäufung von Querrfibrillen in der Gegend der hinteren pulsierenden Vakuole. Als Orte 3. Ordnung sind die nur bei reichlicher Nahrungsaufnahme auftretenden Ablagerungen im äußeren Entoplasma anzusprechen. Diese werden im Hungerzustand auch zuerst wieder aufgebraucht, während ein vollständiger Abbau der Reservestoffe der Skeletplatten erst nach 55 Stunden Hunger festgestellt werden konnte. Die Ophryoscoleciden besitzen die Fähigkeit, unter den ihnen gebotenen Nahrungspartikeln eine Auswahl zu treffen. Reisstärke und das stärkehaltige Kakaopulver werden begierig aufgenommen, Kreide-, Kohle-, Eisenpulver und Glasstaub werden dagegen abgelehnt. Unterbleibt der Zusatz von Stärke zum Kulturmedium, so verhungern die Infusorien trotz reichlichen Vorhandenseins von Cellulose und Chlorophyll. Die Cellulose kann also von den Ophryoscoleciden nicht verwertet werden. Für die Wirtstiere bedeutet demnach die Anwesenheit der Panseninfusorien keinen Nutzen. Diese sind, da die von ihnen aufgenommene Nahrung vom Wirt größtenteils wieder zurückgewonnen wird, vielmehr harmlose Commensalen.

Berta Scharrer (Frankfurt a. M.).

Vergleichende Morphologie.

Organographie der Pflanzen.

Thallophyten.

Bothe, Friedrich: Vorschläge zur einheitlichen Benennung der Fortpflanzungsorgane niederer Pflanzen. Ber. dtsch. bot. Ges. 52, 313—320 (1934).

Cholnoky, Béla von: Über Bau und Entwicklung der Alge *Chaetopeltis orbicularis*. Österr. bot. Z. 83, 187—213 (1934).

Der Chaetopeltis-Thallus läßt noch den fadenförmigen Aufbau erkennen. Es sind zahlreiche Hauptäste zu unterscheiden. Der Raum zwischen den Hauptästen ist mit Zellen ausgefüllt, die als Seitenäste gedeutet werden müssen. Es handelt sich um eine gestauchte Verzweigung, was aus der Lagerung dieser Zellen und der Richtung der Wände ersichtlich ist. Auch Seitenzweige 2. und 3. Ordnung lassen sich feststellen. Der Thallus ist stets einschichtig. Da die Zellen dauernd ihre Teilungsfähigkeit behalten, haben die älteren Thalli einen sehr verwickelten Aufbau, weil durch den Druck der neuen Zellen Formveränderungen auftreten. Auch die Zellwände nehmen eigenartige Formen an, und Verf. vermutet, daß die Wände von Chaetopeltis eine andere Zusammensetzung haben als die der höheren Pflanzen. Sehr oft gehen einzelne Zellen oder Zellgruppen zugrunde. Dadurch wird oft die Druckwirkung aufgehoben und die in der Nähe liegenden Zellen nehmen eine andere Form an. Die entstandenen Lücken werden wieder ergänzt. Aus dem Wachstum der Thalli und aus der Ergänzung der unvollkommen gewordenen Thalli kann eine ausgesprochene Polarität der Zellen festgestellt werden. Durch das Absterben größerer Zellgruppen werden manchmal kleine Stücke vom Thallus frei, und es konnte sogar festgestellt werden, daß aus einer einzigen am Leben gebliebenen Zelle ein neuer Thallus hervorgehen kann. — Die normale und häufigste Vermehrung erfolgt aber durch Zoosporen. Zunächst wird die somatische Teilung eingehend beschrieben. Zu Beginn der Prophase vergrößert sich der Ruhekern auf das

Doppelte. Im Außenkern liegen unregelmäßige chromatische Fäden. Der Nucleolus färbt sich immer weniger. Die Angaben von Schussnig (1930), daß bei *Ulothrix zonata* die Spindel aus der Nucleolussubstanz hervorgehen soll, konnte bei dieser Alge nicht bestätigt werden. Verf. wendet sich auch gegen die Ergebnisse eines Schussnig-Schülers, Reich (1926), daß aus dem Nucleolus zentrosomenähnliche Körnchen hervorgehen sollen. In der Anaphase konnten bei *Chaetopeltis* 8 Chromosomen gezählt werden. Während der Kernteilung teilt sich auch das Pyrenoid. Aus einer Zelle gehen immer 4 Zoosporen hervor. Bei der Zoosporenbildung findet die Reduktionsteilung nicht statt. Die Augenflecke werden schon nach dem 1. Teilungsschritt ausgebildet. Die 4 Zoosporen verlassen das Zoosporangium einzeln nacheinander, nicht in einer gemeinsamen Hülle (nach Heering 1914). Während des Ausschlüpfens sind die Zoosporen stark formveränderlich. Sie können autochthone amöboide Bewegungen ausführen. Diese hören auf, wenn die Zoosporen Geißeln erhalten haben. Die Zoosporen besitzen stets ein Pyrenoid. Sie sind 4 Stunden bis 2 Tage beweglich. Die ersten Keimungsstadien werden beschrieben. Die jungen Thalli scheiden sehr viel Gallert aus. Zum Schluß wird noch eine Beschreibung junger und älterer Thalli von *Stigeoclonium nanum* gegeben. (Vgl. diese Ber. 1, 442.) *F. Moewus* (Erlangen).

Hatch, A. B.: A jet-black Mycelium forming ectotrophic mycorrhizae. (Ein pechschwarzes, ektotrophe Mycorrhiza bildendes Mycelium.) Sv. bot. Tidskr. 28, 369—383 (1934).

Bis jetzt waren 2 Typen schwarzer Mycorrhiza bildende Pilze beschrieben worden. *Rhizoctonia sylvestris* Melin und *Mycelium radicis atrovirens* Melin. Verf. hat an nordschwedischen Waldböden an Sämlingen verschiedener Koniferen ein glänzend schwarzes Mycel gefunden. Dasselbe wurde untersucht und es gelang mit ihm, an verschiedenen Pflanzen reine Mycorrhizen nach dem etwas abgeänderten Verfahren von Melin zu erzeugen. Das Mycel bildet Mycorrhizen mit den meisten Bäumen, an denen ektotrophe Mycorrhizen vorkommen. Es wurde in schwedischen, amerikanischen und vermutlich auch in japanischen Böden nachgewiesen und bevorzugt auf fruchtbare und humusarme Böden. *Sartorius* (Mussbach, Pfalz).

Lohwag, Heinrich: Mykologische Studien. IX. Über die Fruchtkörperentwicklung der Geastraceen. Beih. z. bot. Zbl. A 52, 269—289 (1934).

Mattiolo, Oreste: Curiosi adattamenti intesi a permettere la dispersione delle spore nel genere „Catastoma Morgan“ fra le „Lycoperdaceae“. (Eigentümliche Vorrichtungen für die Verbreitung der Sporen im Genus „Catastoma Morgan“ der Lycoperdaceae.) Atti Accad. naz. Lincei, Mem., VI. s. 5, 459—468 (1934).

Verf. berichtet über die Geschichte des Genus *Catastoma*, schließt die systematische Beschreibung des vorliegenden Materials an und erörtert dann den interessanten Vorgang, durch den die Ausstreuung der Sporen ermöglicht wird. Nach der Reife springt die äußere Hülle des Fruchtkörpers auf, und es gelangt dann das Osculum durch Drehung des Fruchtkörpers infolge der Schwere des anhaftenden Hüllenteils bei Erschütterungen von unten nach oben. *P. Justus Kalkschmid*.

Vergleichende Anatomie der Tiere.

Integument.

Nowikow, B. G.: Die Gesetzmäßigkeit der Entwicklung des Gefieders bei den Tauben. (Inst. f. Exp. Morphogenese, Moskau.) Zool. Ž. 13, 235—248 u. dtsh. Zusammenfassung 249 (1934) [Russisch].

Die Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung des Gefieders nestflüchtender Vögelarten sind verhältnismäßig gut bekannt. Die Entwicklung der Federn auf den verschiedenen Pterilien erfolgt in einer bestimmten Reihenfolge, wobei die einzelnen Punkte des Entwicklungsbeginnes bei den hühnerartigen Vögeln im Gegensatz zu den Schwimmvögeln besonders stark auseinandergezogen sind. Über die Entwicklung des Gefieders bei Nesthockern waren bisher nur wenig Untersuchungen angestellt worden.

n 25 Tauben wurde, beginnend mit dem Ausschlüpfen aus dem Ei, im Verlaufe von 70 Tagen die Federentwicklung verfolgt. Bestimmt wurde die Gewichtszunahme der Jungvögel in Abständen von 3 zu 3 Tagen, Längenzunahme aller Schwungfedern 1. Ordnung des linken Flügels, der Schwungfedern 2. Ordnung und der Steuerfedern. Nach der Formel von Brawais wurde der Koeffizient der Korrelation zwischen dem Wachstum der Federn auf verschiedenen Pterilien und zwischen Entwicklung der Befiederung und Wachstum des Gesamtorganismus errechnet. Darstellung in Kurvenform. Bei den Tauben erfolgt die Entstehung der Federfollikel auf den einzelnen Pterilien gleichzeitig. Die Zeit der Ausbildung des Federkleides ist stark verkürzt. Dieser auffallende Gegensatz zu den Verhältnissen bei nestflüchtenden Vögeln steht mit der Lebensweise der Tauben im Zusammenhang. Die junge Taube ist auf eine möglichst schnelle Entwicklung ihrer Flügel angewiesen. Zwischen der Entwicklung des Gefieders und dem Wachstum des Gesamtorganismus besteht eine positive Korrelation. Der Erneuerungsrythmus der großen Befiederung bei erwachsenen Tauben zeigt große Ähnlichkeit mit dem Entwicklungsrythmus der entsprechenden Federn bei den jungen Tieren. Der Beginn der Mauser des Jugendgefieders vollzieht sich wie folgt: im Alter von 48 Tagen Schwungfedern 1. Ordnung, im Alter von 52 Tagen Steuerfedern, von 78 Tagen Schwungfedern 2. Ordnung. Während der 1. Mauser erfolgt praktisch eine vollständige Erneuerung der Schwungfedern 1. Ordnung und eine teilweise der Schwungfedern 2. Ordnung und der Steuerfedern. Die Federn 1. Generation sind kürzer als die Federn 2. Generation.

v. Knorre (Riga).

Woitkewitsch, A. A.: Zur Frage der Bedeutung der sich aus der Federscheide entwickelnden Federn. (*Inst. f. Exp. Morphogenese, Moskau.*) Zool. Ž. 13, 250—255 (1934) u. dtsh. Zusammenfassung 256 (1934) [Russisch].

Bei der normalen Mauserung wird die junge Feder angelegt, noch bevor die alte ausgefallen war. In mehreren Versuchsserien wurde die Frage geklärt, ob ein Offenbleiben der alten Federscheide die Neubildung der jungen Feder beeinflusse. Aus den Federn von Tauben wurden die Schwungfedern entfernt, aus deren unterem hohlen Abschnitt kleine Röhrchen verschiedener Länge präpariert wurden. Diese Röhrchen wurden wieder in die Federscheide eingesetzt und verhinderten das Zusammenfallen der Scheidenwände. Ein Teil der Röhrchen wurde mit Paraffin verschlossen. Einen Einfluß auf die neue Federentwicklung übten sowohl die offenen als auch die geschlossenen Röhrchen nicht aus. Die Federscheide ist für die junge Feder ohne Bedeutung. Sie dient lediglich der Befestigung der alten Feder.

v. Knorre (Riga).

Lawrow, N. P., und S. P. Naumow: Die Struktur des Felles der feinzehigen Zieselmaus (*Spermophilopsis leptodactylus* Licht) und deren Mauserung. Zool. Ž. 13, 311 bis 331 u. dtsh. Zusammenfassung 331—332 (1934) [Russisch].

Um die Rauchwarenausbeute zu verbessern, wurden ausgedehnte Studien über den Haarwechsel und die Biologie von *Sperm. leptod.* angestellt. In der Kara-Kum konnten 3 Farbvarietäten der Art festgestellt werden. Die Unterschiede sind nur dem Winterpelz eigen. Die histologische Untersuchung der Haare ergab, daß Grannen- und Leithaare im Sommer mehr an Stacheln als an Haare erinnern. Vibrissen finden sich am Kopf, Hals, an den vorderen Extremitäten, an der Brust und am Bauch. Bemerkenswert ist das Vorhandensein von Vibrissen in der Gegend der Brustwarzen. Bisher wurden Vibrissen nur bei *Sciurus* und *Ratufa* gefunden. *Sp. leptod.* unterscheidet sich von allen anderen Zieselmausarten auch dadurch, daß sie gleich dem Eichhorn 2mal im Jahr mausert. Wie beim Eichhorn mausert die Rute nur 1mal im Jahr. Die Fellstruktur enthält eine Anzahl von Eigentümlichkeiten, durch die sich die Art merklich von den anderen Citellusarten unterscheidet und sich den eigentlichen Eichhornarten (*Sciurus*) nähert. Auch der Schädelbau von *Sperm.* ist *sciurus*-ähnlich.

v. Knorre.

Sasaki, T.: On the strength and the elongation of the human hair. IV. A critical study of the strength and the elongation of normal hair with regard to several probabilities. (Über die Stärke und Verlängerungsfähigkeit des menschlichen Haares.

IV. Eine kritische Untersuchung über Stärke und Verlängerungsfähigkeit des normalen Haares im Hinblick auf verschiedene Möglichkeiten.) Mitt. med. Akad. Kioto 11, 721—746 u. engl. Zusammenfassung 915—916 (1934) [Japanisch].

Die Stärke eines Haares nimmt beim Zusammennehmen mehrerer Haare im Vergleich zur Einzelprobe ab, während sich die Verlängerungsfähigkeit nicht ändert. Beide Eigenschaften zeigen für die Haare derselben Kopfgegend gewisse, aber nicht erhebliche Veränderlichkeiten. Auch die verschiedenen Abschnitte eines Haares zeigen keine erheblichen Unterschiede voneinander, doch sind Stärke und Verlängerungsfähigkeit von der Länge der Haarstücke abhängig. (Vgl. diese Ber. 31, 414.) K. Saller.

Sasaki, Takeo: On the strength and the elongation of the human hair. V. Supplementary. (Über die Stärke und Verlängerungsfähigkeit des menschlichen Haares. V. Ergänzungen.) Mitt. med. Akad. Kioto 11, 758—772 u. engl. Zusammenfassung 918—919 (1934) [Japanisch].

Ergänzende Beobachtungen über die Fähigkeit des Haares, Feuchtigkeit zu absorbieren und Hitze zu leiten. K. Saller (Göttingen).

Skelet.

Dawson, Alden B.: Further studies on epiphyseal union in the skeleton of the rat. (Weitere Untersuchungen über die Epiphysenverknöcherung am Rattenskelet.) (Zool. Laborat., Harvard Univ., Cambridge.) Anat. Rec. 60, 83—86 (1934).

Befunde über das Ausbleiben der Epiphysenverknöcherung, die bisher an der Wistar-Albino-Ratte erhoben wurden, werden für den Bussey-Stamm der rosaäugigen Haubenratte bestätigt. Vollständige knöcherne Vereinigung der Epiphysen mit den Diaphysen fand sich am distalen Ende des Humerus, am Radiusköpfchen und an den distalen Enden von Tibia und Fibula. Knorpelige Epiphysenscheiben blieben dagegen erhalten am Kopf und am distalen Ende des Femurs, an den proximalen Enden von Tibia und Fibula, den distalen Enden von Radius und Ulna, am Processus olecrani und am Humeruskopf. Leichte individuelle Variationen wurden getroffen, aber keine groben Abweichungen. Die Untersuchungen wurden ausgeführt an Tieren im Alter von 438 bis zu 775 Tagen. Es wird angenommen, daß dieser Defekt in der Knochenbildung für die Ratte charakteristisch ist und mehr auf erbliche als auf Umweltfaktoren zurückgeht.

Knake (Berlin).

Blume, Werner: Sind mechanische Ursachen für die Entstehung des Promontorium verantwortlich zu machen? (Anat. Inst., Univ. Göttingen.) Z. Anat. 103, 498—518 (1934).

Verf. lehnt die Auffassung ab, daß einzig und allein mechanische Ursachen die Entstehung des Promontoriums bedingen sollen. Nach Untersuchung einer Reihe sorgsam präparierter fetaler Becken wird zunächst festgestellt, daß die Größe des Promontoriumwinkels gewissen Variationen unterworfen ist und daß sich bei Entwicklungsstadien von 15,5 cm Sch.St.L. bis zum Neugeborenen keinerlei Beziehungen zwischen Winkelgröße und Fruchtag, sowie keinerlei Geschlechtsunterschiede feststellen lassen. Verf. betrachtet dann die Vorstellungen von Merkel, Fehling und Lammers sowie von Arx und schließlich Falk, er findet bei allen Angriffspunkten für die Kritik. Die Untersuchungsergebnisse an fetalen Mißbildungsbecken (ein Spaltbecken und ein Promelie-Becken) sprechen überzeugend gegen die genannten Theorien, nach Ansicht des Verf. sogar auch gegen alle sonst möglichen Vorstellungen, welche die Promontoriumsentwicklung durch mechanische Ursachen erklären möchten. Er hält die Anlage des Promontoriums für erbmäßig bedingt und seine Ausbildung für zusammenhängend mit der frühzeitig auftretenden Keilform der zwischen letztem Lumbal- und 1. Sacralwirbel gelegenen Bandscheibe, deren Ausbildung unter Heranziehung zweier Entwicklungsstadien (4,5 cm und 8,5 cm Sch.St.L.) betrachtet wird. Letzter wird auf Wachstumsenergien zurückgeführt. Nach Ansicht des Verf. ist der langen Rückenmuskulatur niemals eine primäre Bedeutung, höchstens eine formerhaltende Wirkung zuzuschreiben.

Fr. Stadtmüller (Göttingen).

Graffi-Benassi, E.: *Sulle variazioni dimensionali delle ultime costole dell'uomo.* (Über die Größenverschiedenheiten der letzten Rippen beim Menschen.) (*Istit. di Antropol. Gen. ed Appl., Univ., Bologna.*) *Monit. zool. ital.* **45**, 127—146 (1934).

An einem Material von 1645 10., 11. und 12. Rippen italienischer Skelete wurden die Längenmaße mit Mittelwerten und Schwankungsbreiten bestimmt. Bei der 12. Rippe ist die Variabilität der Maße am größten. Links sind die Maße etwas geringer als rechts, aber statistisch nicht sicher; die Tendenz zu einer Reduzierung ist links größer. Die 3 untersten Rippen sind in ihren Längen miteinander korreliert. Auch die überzähligen Rippen werden unter ähnlichen Gesichtspunkten besprochen.

K. Saller (Göttingen).

Marsigli, Carlo: *La pneumatizzazione del temporale nei suoi rapporti con la articolazione della mandibola.* (Die Pneumatisation des Schläfenbeines in ihrer Beziehung zum Kiefergelenk.) (*Clin. Oto-Rino-Laringoiatr., Univ., Roma.*) *Valsalva* **10**, 565—592 (1934).

Radiologische Studien bei 31 Individuen, bei welchen Verf. die Entwicklung der pneumatischen Zellen in der Gegend der Fossa mandibularis im Prozentsatz von 1,8 fand. Die anatomischen Bedingungen können, nach dem Verf., den Verlauf mehrerer otogener osteomyelitischen Prozessen nach der Richtung der Fossa mandibularis hin sehr gut erklären.

Benedetto Agazzi (Milano).

Schüller, Arthur: *Varianten der Schädelstruktur.* (*Zürich, Sitzg. v. 24.—31. VII. 1934.*) *Verh. 4. internat. Kongr. Radiol.* **2**, 177—178 (1934).

Der Autor berichtet über die röntgenographisch erkennbaren Varianten der Strukturelemente des Schädeldaches, insbesondere der Diploestruktur, der Gefäßkanäle und Pacchionischen Gruben. Multiple, rundliche, erbsengroße Aufhellungen in der Diploe werden als Varicositäten gedeutet. Die Berücksichtigung der normalen Strukturdetails und ihrer Varianten gibt Anhaltspunkte für das Verständnis der Art und der Lokalisation von pathologischen Veränderungen des Schädelskeletes.

A. Schüller (Wien).

Aichel, Otto: *Die Bulla nasolacimalis des Gorilla.* (*Anthropol. Inst., Univ. Kiel.*) *Z. Morph. u. Anthropol.* **34**, 21—40 (1934).

Der Gorilla besitzt eine eigentümliche Erweiterung des knöchernen Tränennasenganges, die den anderen Menschenaffen sowie dem Menschen fehlt (Bulla nasolacimalis). Dieses wenig bekannte Gebilde und seine Beziehungen zur Kiefer- und Nasenhöhle werden an macerierten Schädeln von 5 Gorillas beschrieben und mit den Verhältnissen bei Orang, Schimpanse und Mensch verglichen. Verf. polemisiert gegen Bolk, nach dessen Auffassung die genannte Höhle als Ausstülpung des unteren Nasenganges entsteht, mit dem Alter sich immer mehr vergrößert und schließlich die Kieferhöhle ersetzt, während der Tränengang sich allmählich verkürzen soll. Im Material des Verf. ist die Seitenwand des unteren Nasenganges immer erhalten, und die Öffnung der Bulla entspricht der Mündung des Tränenganges. Bei 4 verschiedenen alten Gorillas aus Kamerun ist die nur mäßig entwickelte Bulla als Vorwölbung in die voll ausgebildete Kieferhöhle zu erkennen. Bei einem Gabungorilla nimmt sie fast völlig den Raum der Kieferhöhle ein, die nur als schmaler Spalt erhalten ist. Es liegen also nicht Alters-, sondern Rassenunterschiede vor. Verf. erklärt die Entstehung der Bulla nasolacimalis wie folgt: Pneumatische Höhlen vergrößern sich nicht durch aktives Wachstum der Schleimhaut. Vielmehr wird bei fortschreitender Knochenresorption „die Schleimhaut in den entstehenden Hohlraum hineingesogen“. Die entstehende Kieferhöhle beeinflusst durch ihren „Sog“ auch den Tränennasengang, der beim Gorilla ziemlich weit hinten in ihrem Bereich liegt, während er beim Menschen, Orang und Schimpansen weiter vorn gelegen ist und frühzeitig von einem festen Knochenmantel umgeben wird.

Cl. F. Werner (Hamburg).

Schmäh, R.: *Die Entwicklung der Unterkieferknochen bei Polypterus.* (*Anat. Inst., Univ. München.*) *Gegenbaurs Jb.* **74**, 364—379 (1934).

An 2 Polypteruslarven von 6,8 und 8 cm Länge werden die Entwicklungsverhältnisse der Unterkieferknochen untersucht, von dem 8 cm langen Tier wurde ein Wachsplattenmodell angefertigt. Es konnten 8 selbständige Verknöcherungen nachgewiesen

werden: 3 Ersatzknochen, nämlich Mentomandibulare, Mediomandibulare und Articulare und 5 Deckknochen, nämlich: Dentale, Angulare, Goniale (= Spleniale oder Operculare anderer Autoren), Post- und Präspleniale. Das Mediomandibulare ist eine bisher nicht beschriebene Verknöcherung des Meckelschen Knorpels, die wohl durch rein mechanische Beanspruchungen vor dem Processus coronoides entsteht. Die Unterkieferknochen des Polypterus lassen sich mit denen der Stegocephalen homologisieren.

Fr. Stadtmüller (Göttingen).

Bustin, E.: Die anatomischen Beziehungen zwischen Kieferknochen und Nasenhöhle und ihre klinische Verwertung. *Z. Stomat.* **32**, 646—658, 689—699 u. 740—757 (1934).

Organe der Ernährung.

Serra, Giselda: Osservazioni sull'apparato masticatorio del genere *Orthopsis*. (Beobachtungen über den Kauapparat des Genus *Orthopsis*.) (*Istit. di Paleontol., Univ. Roma.*) *Atti Accad. naz. Lincei*, VI. s. **20**, 51—54 (1934).

Der Kauapparat (Labene des Aristoteles) des Genus *Orthopsis* gehört nach seinem Baumerkmale in die Gruppe der Camarodonta (Jackson 1919). Max Clara.

Proell, F., und R. Wyrwoll: Experimentelle Untersuchungen über das Wachstum des Unterkiefers und der Zähne. (*Zahnärztl. Inst., Univ. Greifswald.*) *Dtsch. Zahnärztl. Z.* **1**, 81—94 (1934).

Daß die Versuche früherer Untersucher, das Wachstum des Unterkiefers experimentell mittels der Markiermethode zu verfolgen, zu gegensätzlichen Ergebnissen führte, ist aus der Unzulänglichkeit der angewandten Verfahren zu erklären. Deshalb versuchten die Verf. eine geeignete Methode auszuarbeiten. Feinste Nägel aus Wiplastahl (besser als aus Gold) erwiesen sich als Marken am geeignetsten. Sie wurden in Vertiefungen, die an der Außenseite des Unterkiefers angelegt wurden, fest eingefügt, so zwar, daß sie die Oberfläche des Knochens nicht überragten, um nicht dem Periostzug ausgesetzt zu sein; sie heilten reaktionslos ein und waren als Fixpunkte zu verwenden. Als Versuchstiere dienten Hunde, denen zum Teil auch Zahnkeime entfernt wurden. Ungefähr am Ende des 1. Lebensjahres wurden die Unterkiefer anatomisch untersucht und die Marken ausgemessen, nachdem während der Versuchsdauer Röntgenaufnahmen gemacht worden waren. Es ergab sich, daß ein interstitielles Wachstum nicht stattfindet. Der Unterkiefer wächst am stärksten nach hinten und dem unteren Rand zu, besonders während der Entwicklung des ersten bleibenden Mahlzahns. Die Knochenanlagerung ist am unteren Kiefernrand in der Angulus- und Frontzahngegend am größten, an der lingualen Seite geringer als an der bukkalen. Der Alveolarfortsatz hat bereits mit der Ausbildung der Zahnkrone am Zahnkeim sein Höhenwachstum beendet und bildet sich nicht erst mit dem Durchbruch der Zähne. Weiter konnte durch die Marken bestätigt werden, daß die Epithelscheide für den ganzen Verlauf der Zahnentwicklung als fixer Punkt anzusehen ist.

Josef Lehner (Wien).

Spiegel, Arnold: Der zeitliche Ablauf der Bezahnung und des Zahnwechsels bei *Javamakaken* (*Macaca irus mordax* Th. & Wr.). (*Zool. Inst., Univ. Tübingen.*) *Z. Zool.* **145**, 711—732 (1934).

An Makaken, die im Zoologischen Institut in Tübingen unter ausgezeichneten Bedingungen seit Jahren gehalten werden, konnte durch fortlaufende Untersuchungen der lebenden Tiere das Erscheinen der Milchzähne und der Zahnwechsel festgestellt und ein Vergleich mit den wenigen anderen Angaben in der Literatur über ähnliche Untersuchungen an Affen durchgeführt werden. Die Durchbruchsformel für das Milch-

gebiß des Javamakaken lautet: $\overset{2}{id} 1, \overset{4}{id} 2, \overset{6}{cd}, \overset{5}{pd} 1, \overset{8}{pd} 2$. Die Zahlen bedeuten die Reihen-

folge des Durchbruches; die über den Zahnzeichen stehenden für die Zähne des Oberkiefers, die darunter stehenden für den Unterkiefer. Die Durchbruchsformel für das

Dauergebiß lautet: $\begin{matrix} 3 & 5 & 8 & \overbrace{7} & 2 & 6 & 10 \\ I1, I2, C, P1, P2, M1, M2, M3. \end{matrix}$ Gleiche Zahlen oben und unten
 $\begin{matrix} 3 & 4 & 8 & \overbrace{7} & 1 & 6 & 9 \end{matrix}$

bedeuten ungefähr gleichzeitigen Durchbruch. Eine Tabelle, die den Durchbruch der einzelnen Zähne mit dem Lebensalter in Beziehung bringt, ermöglicht künftige, ziemlich genaue Altersbestimmungen an lebendem und totem Material. Ein Vergleich mit den Anthropomorphen ergibt, daß bei diesen die *P* früher wechseln als *M* 2 durchbricht. Beim Menschen wechseln die *C* schon nach den *P* 1, was sonst bei keiner Primatenart vorkommt. *M* 2 bricht beim recenten Menschen sehr spät (als vorletzter Zahn) durch, beim Neandertaler auffallenderweise aber früher, und zwar vor dem Prämolarenwechsel.

Otto v. Wettstein (Wien).

Keil, Albert: Über Doppelbrechung und Feinbau des menschlichen Zahnbeins. *Zool. Inst., Univ. Gießen.* Z. Zellforsch. **21**, 635—652 (1934).

Zahnschliffe wurden zum Teil entkalkt, zum Teil mit Glycerin-Kalilauge ausgekocht, so daß außer normalen Schliffen entkalkte und von der organischen Substanz befreite zur Untersuchung kamen. Im polarisierten Licht bewirkt die Entkalkung nur eine geringe Herabsetzung der Doppelbrechung, das Auskochen dagegen eine stark verminderte Doppelbrechung und dabei ist das Vorzeichen der Doppelbrechung umgekehrt. Es handelt sich hier um die Erdsalze und man muß annehmen, daß im Allgemeinen die negativ-einachsigen doppelbrechenden Krystallite der Erdsalze mit der Länge nach der Verlaufsrichtung der kollagenen Fasern angeordnet sind. Der kreuzweise Verlauf der kollagenen Fasern läßt sich gelegentlich auch mit dem Polarisationsmikroskop darstellen. An ausgekochten Schliffen zeigen die Kugeln des Globularlenticins in polarisiertem Licht negative Kreuze. Folglich sind die Erdsalze in ihnen in sphäritischer Art abgelagert. Die von Korte beschriebenen Arkaden wurden bestätigt und in ihnen sphäritische Anordnung der Kalksalze gefunden, die beim Fortschreiten der Verkalkung wieder verschwindet und beim Beginn eines neuen Verkalkungsschubes wieder in den Arkaden auftritt. Die von v. Saal beschriebenen Riesendenticinkanälchen wurden ebenfalls gesehen, seine Befunde und Schlüsse bestätigt, ohne Neues zu bringen.

H. Marcus (München).

Münch: Über die Innervierung des menschlichen Dentins. Z. Zellforsch. **21**, 596—603 (1934).

Die Nerven der Pulpa und des Dentins wurden beim Menschen mit Hilfe einer modifizierten Osmium-Tannin-Methode untersucht. Nervenfasern verlaufen von der Pulpa zwischen den Odontoblasten hindurch zum Zahnbein. Diese Nervenfasern halten sich nicht an den Verlauf der Zahnbeinkanälchen, sondern verlaufen unter mehrfacher Verzweigung und unter Abgabe von Seitenästen ins Zahnbein hinein. Verf. fand an den Nerven vor ihrem Eintritt ins Zahnbein eine Verdickung, „welche den Gedanken nahelegt, daß es sich bei diesen Gebilden um sensible Zellen vom Typ der Spinalganglien handelt“.

F. Kiss (Budapest).

Bertram, Heinrich: Der Nachweis des Stoffwechsels im Hundezahnbein durch Farbwanderung. (*Zahnärztl. Inst., Univ. Göttingen.*) Dtsch. Zahn- usw. Heilk. **1**, 105—116 (1934).

Zum Nachweis der Stoffwechselwege im Zahnbein wurde die Wanderung von Farbstoffen, die von außen einverleibt wurden, festzustellen gesucht. Zu diesem Zwecke wurden in Eck- und Reißzahnkronen beim lebenden Hund Grübchen bis ins Dentin eingebohrt und diese in einen unter der Schmelz-Dentingrenze wurzelwärts gerichteten Sack verlängert, in welchen die Farblösung bzw. der Farbbrei eingelegt wurde. Dann wurde das oberflächliche Loch mit Haward-Zement verschlossen. Nach verschiedenen Tagen, bis 12tägiger Versuchsdauer wurden die Tiere getötet, die Zähne zu Dick- und Dünnschliffen verarbeitet, wobei jede Berührung mit Flüssigkeit außer Öl vermieden wurde; die Schliffe wurden in Luft untersucht. Krystalloide Farbstoffe (Eosin und Trypanblau) diffundieren gleichmäßig durch das Dentin nach allen Seiten, während

Nilblausulfat sich mehr wie ein kolloider Farbstoff verhält. Die kolloiden Farbstoffe (Kongorot, Benzopurpurin 4 B, Bordeaux extra) breiten sich nur in einem Gebiet zwischen der Zahnoberfläche und Pulpa in der Breite der Farbkavität und parallel zu den Dentinkanälchen aus. Manchmal färbt sich auch die gegenüberliegende, die andere Seite der Pulpa begrenzende Dentinwand. Die Farbwanderung erfolgt entlang der Dentinkanälchen und mit diesen auch in den Schmelz hinein, und zwar nur entsprechend dem gefärbten Dentinteil. Vor allem erscheinen dann die Diazonien, Schmelzhäuschel und -lamellen gefärbt, besonders wenn die Farbkavität bis an den Schmelz heranreicht. Da ein schmaler Streifen an der äußeren Schmelzoberfläche ungefärbt bleibt, kann ein Flüssigkeitsstrom durch diese nicht stattfinden. Nach intravenösen Injektion von Trypanblau färben sich weder die Zahngewebe noch Schleimhäute oder Haut; letztere wohl bei subcutaner Injektion ohne Mitbeteiligung der Zahngewebe. Die Versuche lassen auf eine Flüssigkeits- (Stoffwechsel-) Bewegung schließen, die in den Dentinkanälchen zwischen Faser und Scheide vor sich geht und von der Oberfläche des Dentins und umgekehrt verläuft. Ebenso hat die Pulpa einen Flüssigkeitsstrom wahrscheinlich aber kein geregeltes Lymphabflußsystem. Der Schmelz besitzt einen Stoffwechsel.

J. Lehner (Wien).

Svetovidov, A.: Über die Beziehung zwischen dem Charakter der Nahrung und der Zahl der pylorischen Blindsäcke bei Fischen. (*Inst. f. Zool., Akad. d. Wiss., Leningrad.* C. r. Acad. Sci. URSS 3, 67—72 u. engl. Text 70—72 (1934) [Russisch].)

Es wird versucht, auf Grund der Prüfung zahlreicher verschiedener Fischarten zu ergründen, ob Zusammenhänge gegeben sind zwischen der Art der Ernährung und der Zahl der Appendices pyloricae. Bei 5 verschiedenen Fischfamilien glaubt der Verf. Zusammenhänge nachgewiesen zu haben. Über die Funktion der pylorischen Blindschläuche besteht noch keine volle Klarheit. Manche Autoren nehmen an, daß durch sie nur die Darmoberfläche vergrößert wird. Andere wollen ihnen eine besondere Funktion bei der Sekretion von Verdauungssäften oder bei der Resorption der Nahrung zuschreiben. Auch soll in den Blindschläuchen die Nahrung längere Zeit zurückgehalten und dadurch vollkommener ausgenutzt werden.

W. Wunder (Breslau).

Matsuo, Hisaaki: A contribution on the anatomy of Auerbach's plexus. (Beitrag zur Anatomie des Auerbachschen Plexus.) (*Anat. Laborat., Nippon Univ., Tokyo.*) Jap. J. med. Sci., Trans. I Anat. 4, 417—428 (1934).

Der Plexus wurde mit Methylenblau gefärbt. Die Ganglionzellen sind nach Form und Größe verschieden. Die meisten Nervenzellen wurden in der Pars pylorica, die wenigsten im Oesophagus gefunden. Die Nervenfasern färben sich im allgemeinen früher als die Zellen.

F. Kiss (Budapest).

Simard, L.-C.: Sur les relations des cellules argentaffines de l'intestin avec les nerfs chez l'embryon de veau. (Das Verhältnis der argentophilen Zellen zu den Nerven im Darms des Kuhembryos.) (*Laborat. d'Anat. Path., Univ., Montréal.*) Archives Anat. microsc. 30, 235—248 (1934).

Die genannten Zellen wurden durch eine modifizierte Methode von Roger untersucht. Die argentophilen Zellen liegen am meisten im Epithel der Zotten und in den Drüsen. Die argentophilen Zellen stehen mit den Neurofibrillen in Kontinuität oder in Kontiguität. Die Vakuolen der argentophilen Zellen stehen wahrscheinlich mit der Funktion in Zusammenhang. Die argentophilen Zellen bilden nicht den Endapparat der Nerven. Die argentophilen Zellen entstammen vom Entoderm.

F. Kiss

● **Peterson, Lennart:** Beitrag zur Kenntnis des Ileum terminale fixatum und Ileum ilei terminalis fixati. Eine anatomische, klinische und klinisch-statistische Studie. (*Acta chir. scand.* [Stoekh.] Bd. 75, Suppl. 32.) Helsingfors, Mercators tryckeri aktiebolag. 1934. XI, 717 S. u. 21 Abb.

Böker, Hans: „Omentum lienale“. (42. Vers. d. Anat. Ges., Würzburg, Sitzg. 24.—27. IV. 1934.) Anat. Anz. 78, Erg.-H., 142—148 (1934).

Unter Beifügung von 8 Abbildungen weist der Autor nach, daß das dorsale Mes-

strium außer dem Lig. gastro-lienale und dem Omentum majus noch aus einem mittleren Abschnitt besteht, den er Omentum lienale nennt. Dieses stellt eine von der großen Curvatur des Magens ausgehende, vom Omentum majus getrennte Ausfaltung dar, die mit 3—4 fingerförmigen Lappen um die Milz herumreicht, ebenfalls von der Bursa omentalis aus zugänglich ist und manchmal mit seinem kranialen Teil auf das viscerale Peritoneum des Magens übergreift. In ähnlicher Weise wie beim Menschen findet es sich auch bei Hund, Katze, Affen und Halbaffen, nicht dagegen bei Nagetieren. Die Appendices epiploicae können am Anfang und Ende des Colon transversum rechts und links vom Omentum majus excessiv ausgebildet sein und mit letzterem einerseits und dem Zwerchfell andererseits verwachsen. Wie alle Netzbildungen des dorsalen Mesogastrium, wird das Omentum lienale von den A. gastroepiploicae, die Appendices des visceralen Colonperitoneums dagegen von Ästen der A. colica media versorgt. In der anschließenden Aussprache stellt Veit eine weitgehende Zergliederung des Omentum bei Cetaceen und Schreiber die starke Ausbildung eines Omentum lienale bei den Großkatzen fest.

V. Patzelt (Wien).

Drüsen. (Exokrin- und Endokrindrüsen als selbständige Organe.)

Clara, Max: Sulle interrelazioni morfologiche ed istogenetiche degli organi epiteliali derivati dall'intestino cefalico. (Über die morphologischen und histiogenetischen gegenseitigen Beziehungen der epithelialen, vom Kopfdarm abstammenden Organe.) *Monit. zool. ital.* 45, 183—193 (1934).

Die Tatsache, daß in den Nebenschilddrüsen und in den Ultimobranchialkörpern gelegentlich Follikelbildung beobachtet wurde, ist von einigen Autoren als Umbildung in Schilddrüsengewebe mit Übernahme der Funktion dieser Drüse gedeutet, von anderen dagegen bestritten worden. Verf. nimmt dazu Stellung und versucht in einer eigenen Erklärung die Differenzen in den Anschauungen zu beseitigen. Er weist zunächst darauf hin, daß morphologische Gleichheit noch nicht funktionelle Gleichheit bedeutet, und legt dann dar, daß alle vom Kopfdarm abstammenden epithelialen Organe die gleichen morphogenetischen Potenzen besitzen, unter welchen sich die Fähigkeit ist, mit Kolloid gefüllte Follikel zu produzieren. Die funktionellen Interrelationen zwischen den einzelnen benachbarten Organen bestimmen jedoch die endgültige Entwicklung der Organe selbst in der Weise, daß das eine in seiner Entwicklung früher stehen bleibt als das andere, so daß es nicht mehr bis zum follikulären Stadium gelangt. Die Nebenschilddrüsen, die in dieser Art in ihrer Entwicklung aufgehalten werden, behalten ein primitives Aussehen (epitheliale Stränge), ebenso wie der Ultimobranchial-Körper. Die Tätigkeit der Schilddrüse dominiert wahrscheinlich über die benachbarten Organe, weshalb es erklärlich wird, warum nach der Entfernung der Schilddrüse oder nach ihrer Atrophie im Parenchym der Parathyreoidea die Tendenz auftritt, mit Kolloid erfüllte Follikel zu bilden. Damit soll jedoch nicht gesagt sein, daß eine derartig umgebildete Nebenschilddrüse die Funktion der Thyreoidea übernehmen fähig wäre.

Hartmann (München).

Okkels, H.: Stades initiaux de la sécrétion thyroïdienne. Les granulations oxydasi-ques. (Anfangsstadien der Sekretion in der Thyreoidea. Die Oxydasegranula.) *(Inst. Anat.-Path., Univ., Copenhagen.)* C. r. Soc. Biol. Paris 116, 251—254 (1934).

Meerschweinchen erhielten eine Dosis Hypophysenvorderlappenextrakt injiziert (intraperitoneal), die etwa 1,5 g frischen Organs entsprach. Nach 30, 45 und 60 Minuten wurden die Tiere getötet, die Hälfte der Schilddrüse auf dem Gefriermikrotom geschnitten und nach Koechlin und Witt gefärbt; die andere Hälfte diente zur Färbung mit Neutralrot und zur Metallimprägnation nach da Fano. Die Befunde am Golgi-Apparat decken sich mit denjenigen, welche bereits früher geschildert wurden [C. r. Soc. Biol. Paris 112, 1694 (1934); vgl. dies. Ber. 27, 155]. Bei den Kontrolltieren finden sich in den Zellen aller Follikel nur eine ganz beschränkt Anzahl von Oxydasegranula, die sehr klein sind und meist im basalen Cytoplasma liegen. Im interstitiellen Gewebe

findet man ebenfalls eine kleine Zahl von Granulationen, im Kolloid niemals. Schon 30 Minuten nach der Injektion haben die intracellulären Granula sichtlich an Zahl zugenommen. 45 Minuten danach sind sie in allen Zellen, namentlich um den Kern stark angehäuft; sie lassen sich nunmehr auch in den peripheren Zonen des Kolloids und im interstitiellen Gewebe nachweisen. Nach 1 Stunde erscheinen die Thyreoidea-zellen mit Granula angeschoppt, doch ist ihr Gehalt an Oxydase bereits weniger auffällig; viele Granula sind in das Kolloid übergewandert, das stark vakuolisiert ist.

Hartmann (München).

Hirata, Kunio: On the histogenesis of the islands of Langerhans in Rana japonica (Günther). (Über die Histogenese der Langerhansschen Inseln von Rana japonica [Günther].) (*Biol. Inst., Univ., Sendai.*) Sci. Rep. Tôhoku Univ. IV, 9, 159—182 (1934).

Als Material dienten Larven von 2 Tage nach dem Ausschlüpfen bis zum 20. Tage in 3-tägigen Intervallen eingelegt sowie die erforderlichen Stadien bis zur vollkommenen Resorption des Schwanzes. Fixiert wurde mit den Flüssigkeiten A und B von Lane, Perenyi, Bouin, Champy. Gefärbt wurde mit Hämatoxylin nach Delafield, Heidenhain und zur Bindegewebsfärbung nach Mallory; letztere gab besonders gute Resultate nach der Fixierung von Lane B.

Die primären Inseln differenzieren sich wie die anderen Parenchymzellen des Pankreas aus dem Entoderm und haben zu dem Gewebe der Capillaren oder dem Bindegewebe keine genetischen Beziehungen. In frühen Stadien der Metamorphose beginnen sich die primären Inseln zu sekundären zu differenzieren und zu funktionieren. Zur gleichen Zeit fangen die peripheren Inseln der primären Inseln und die Zellen einiger kleinen primären Inseln an, stark fuchsinophil zu werden, während sie in enger Beziehung mit dem Pankreasgewebe sich befinden. Die bathychromen Zellen von Vincent und Thomson, die a-Zellen von Bensley und die a-, b-, c-Zellen von Saguchi gehören zu diesen fuchsinophilen Zellen. Zusammenhang zwischen den Inseln und anderen Geweben sind kein Beweis für ihre Abstammung. Eine vollständige Abkapselung ist für die physiologische Unabhängigkeit von Inseln und exokrinem Pankreas nicht notwendig.

W. Berg (Königsberg i. Pr.).

Caspersson, T., und Hj. Holmgren: Variationen der Kerngröße während der verschiedenen Phasen der Leberarbeit. (*Histol. Abt., Karolin. Inst., Stockholm.*) (42. Vers. d. Anat. Ges., Würzburg, Sitzg. v. 24.—27. IV. 1934.) Anat. Anz. 79, 53—59 (1934).

Von 24 weißen Mäusen desselben Stammes und im allgemeinen desselben Alters, welche unter gleichmäßigen Verhältnissen aufgezogen worden waren, wurden während 24 Stunden alle 2 Stunden 2 Tiere getötet, die Leber herausgenommen, gewogen und an einem Stück der Leber der Glykogengehalt nach Pflüger-Bertrand bestimmt, ein anderer in Form fixiert und nach Hämatoxylinfärbung histologisch untersucht. Mit dem Okularmikrometer wurden je 300 Kerne (über einen großen Teil des Präparats verteilt) gemessen. Die physiologische Streuung der Kerngröße wurde bei jeder Meßserie bestimmt und angegeben. Die größte Fehlerquelle ist in der individuellen Streuung gelegen, weswegen ein möglichst homogenes Material verwendet wurde.

Die Resultate für Glykogengehalt und Kerngröße werden in Tabelle und Diagramm zusammengefaßt. Für ersteren besteht eine Übereinstimmung mit den Resultaten von Wilander Ågrea und Jorpes. Auch die Variation der Kerngröße folgt im allgemeinen der Leberglykogenkurve. In der Nacht gegen 24 Uhr findet sich der größte Kerndurchmesser, ein Absinken desselben erfolgt gegen Morgen; gegen Mittag (14 Uhr) zeigt sich ein niedrigeres Maximum, dann wieder Absinken. Gegen 18 Uhr Ansteigen zum nächtlichen Maximum. — Nimmt man an, daß die Veränderungen des Kernvolumens in gewisser Beziehung zur Zellaktivität stehen, so wäre die Kurve der Kerngrößen so zu deuten, daß die Zellaktivität in der Nacht am größten, am Vormittag am geringsten ist. Um einigermaßen sicher zu bestimmen, welche Prozesse das Aktivitätsmaximum bedingen, reichen aber die Kenntnisse über die Leberfunktion noch nicht aus.

Suzuki, Toshio: Über die Beschaffenheit der Silbergranula in den Leberzellen (*Path. Inst., Univ. Sapporo.*) (24. gen. meet., Tokyo, 2.—4. IV. 1934.) Transactions Soc. path. jap. 24, 297—299 (1934).

Die Konschen Silbergranula in den Leberzellen treten teils als grobschollige

wärzlich bräunliche, in der Zelle unregelmäßig verteilte, nach Fixierung besser (s in frischem Zustand) imprägnierbare Gebilde, teils als rundliche, bräunliche Gebilde in Erscheinung. Vergleichende Untersuchungen an den Leberzellen von Kaninchen, Meerschweinchen, Hühnern, Tauben, Schildkröten, Schlangen, Fröschen und Kröten ergaben, daß nach Fixierung mit neutralem Formol in allen Fällen (mit Ausnahme der Meerschweinchen) die grobscholligen Gebilde vorhanden waren; nach Fixierung in saurem Formol treten diese Granula in der Säugetier- und Reptilienleber viel deutlicher hervor, während bei den anderen Klassen die Granula fehlen oder sehr spärlich sind; nach Fixierung in alkalischem Formol werden die Granula bei den Säugetieren und Reptilien spärlicher, während sie bei den anderen Klassen zunehmen. Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an der Leber des Kaninchens ergeben, daß die histochemischen Eigenschaften der Silbergranula im Laufe der Entwicklung verschieden sind, indem die Granula, welche beim Keimling nach Fixierung in alkalischem Formol sehr starke Silberreaktion geben, beim erwachsenen Tiere nach Fixierung mit saurem Formol ein positives Resultat zeigen. *Max Clara* (Blumau b. Bozen).

Kubo, Masaya: Studien über die histologischen Veränderungen der Nervenendigungen in der Leber. II. Mitt.: Experimenteller Teil. Mitt. med. Akad. Kioto 11, 363 (1935) u. dtsch. Zusammenfassung 617—622 (1934) [Japanisch].

Verf. untersuchte das Verhalten der Nervenendigungen in der Leber bei Reiskrankheit, Diphtherietoxin-, Nicotin-, Adrenalin-, Cholin-, Pilocarpin-, Atropin-, Alkohol- und Bleivergiftung, sowie bei Durchschneidung des Vagus und Splanchnicus, bei der Exstirpation des Plexus coeliacus und des Ganglion coeliacum. Ferner erweiterten sich die Forschungen des Verf. auf das Regenerationsvermögen der geschädigten Nerven. Seine wichtigsten Folgerungen sind folgende: Die beobachteten Nervenveränderungen, Degenerations- und Regenerationserscheinungen gehen im allgemeinen parallel mit dem Grade des Zerfalls des Muttergewebes. Die stärksten Veränderungen verursacht das Blei, am schwächsten wirken die Gifte mit Affinität zum Parasympathicus, wie Pilocarpin, Cholin und Atropin. Verf. schildert im einzelnen die beobachteten histologischen Veränderungen. Er stellt fest, daß die peripher gelegenen Nervenfasern am schnellsten atrophieren, während die im interstitiellen Bindegewebe verlaufenden dickeren Faserbündel widerstandsfähiger sind. Die marklosen Fasern halten sich länger als die markhaltigen. Aus dem gleichartigen Verhalten einer Anzahl feinerer Nervenfasern gegenüber dem Atropin, Pilocarpin und Cholin schließt Verf. ihre Zugehörigkeit zum Parasympathicus. Die Überzahl der in der Leber vorhandenen Nerven sind indessen als sympathische anzusehen. Bei Atropinvergiftung und Reiskrankheit kam es auch bei hochgradiger Zerstörung noch zur Regeneration, wenn die Giftzufuhr unterbrochen wurde, während bei den anderen Giften nach längerer Verabfolgung Regenerationen kaum mehr möglich waren. Was die Frage des Vorhandenseins von Ganglienzellen in der Leber angeht, so wird sie vom Verf. positiv beantwortet. Verf. schließt aus seinen Durchschneidungsversuchen der *Nervi vagi* und *splanchnici*, daß es sich in der Leber nur um postganglionäre Fasern handelt. Fast alle Nerven in der Leber scheinen durch den Plexus und das Ganglion coeliacum zu laufen. Die Durchschneidung des Splanchnicus wirkt antagonistisch zu der Durchschneidung des Vagus. Die nach Nervendurchschneidungen erfolgenden Funktionsveränderungen der Leber sind nicht lediglich als Ergebnis der betreffenden Nervendurchschneidung allein anzusprechen. (I. vgl. diese Ber. 30, 129.) *Laruelle* (Brüssel).

Kulka, Eugen: Vergleichende Untersuchungen über Schwangerschaftsveränderungen der Nebennieren. (Dtsch. Univ.-Frauenklin., Prag.) Arch. Gynäk. 157, 259—266 (1934).

Die Nebennieren gravider Mäuse, Ratten, Meerschweinchen und Kaninchen wurden histologisch untersucht. Maus: Die Nebenniere erfährt eine Auflockerung, welche hauptsächlich durch das Auftreten von zahlreichen Vakuolen bedingt ist. Die stärkste Substanzzunahme erfolgt in der Zona reticularis. Ratte: Graviditätsveränderungen

sind nicht besonders augenfällig. Meerschweinchen: Hier bestätigt die Untersuchung nur Bekanntes. Kaninchen: Sehr geringe Veränderungen. C. Kaufmann (Berlin).

Gefäßsystem, Leibeshöhlen, blutbildende Organe.

Jolly, J.: Sur le système lymphatique des batraciens. (Über das Lymphsystem der Frösche.) *Hommage Mém. Cantacuzène* 347—350 (1934).

Verf. gibt unter Berücksichtigung der neueren Literatur einen Überblick über das Lymphgefäßsystem der anuren Amphibien und geht dabei aus von den für die Frösche charakteristischen großen subcutanen, untereinander kommunizierenden Lymphsäcken, in deren Scheidewänden das Vorkommen von Sphinkterklappen bestätigt wird. Im übrigen kommen in den Wandungen der Lymphsäcke keine Muskelelemente vor. In Verbindung mit den Lymphsäcken stehen vier Lymphherzen. Die 2 vorderen öffnen sich in die Vertebralvene, die 2 hinteren in die Vena ischiadica. Auch bei den Froschlarven sind Lymphherzen vorhanden, und zwar 3—4 hintere auf jeder Seite. Diese Vermehrung der hinteren Lymphherzen findet sich auch noch an den erwachsenen Fröschen (*Rana*, *Hyla*) insofern, als die hinteren Lymphherzen nicht wie man früher glaubte, einfach sind, sondern sich aus mehreren Einzellymphherzen zusammensetzen, was an die sehr zahlreichen Lymphherzen der Urodelen erinnert. Schließlich besitzen die Anuren auch viscerale Lymphgefäße, welche die Lymphflüsse in den tiefen Lymphräumen zuleiten, und intestinale Lymphgefäße, welche den Chylus in die Lymphgefäße entsenden.

Ballowitz (Münster i. W.).

Starek, Dietrich: Über den feineren Bau der Lebervenen von *Hydrochoerus capybara* (*Anat. Inst., Univ. Köln.*) *Anat. Anz.* 78, 240—246 (1934).

Entsprechend älteren Befunden bei aquatilen Säugetieren fanden sich bei *Hydrochoerus capybara* (Wasserschwein) Drosselvorrichtungen in den extrahepatischen Teilen der Venen hepaticae in Form einer wulstförmig in das Lumen vorspringenden Sphinktermuskulatur. Verf. nimmt an, daß dieser Spermechanismus Beziehungen zu den Kreislaufveränderungen beim Tauchen hat. Durch das hierbei eintretende Sistieren der Atmung wird der venöse Rückfluß zum Herzen eingeschränkt, und das Blut staut sich in den in der Leber gelegenen Venenerweiterungen. Aufgabe der Sphinkteren soll es sein, den nun einsetzenden verlangsamen Rückstrom des Blutes in den rechten Vorhof zu regulieren.

Thauer.

Jerie, Vl.: Über die Ramifikation der Cerebralarterien. *Anthropologie* 12, Suppl.-H. 185—201 u. franz. Zusammenfassung 202—204 (1934) [Tschechisch].

Verf. injizierte die Arterien von 55 frischen Hirnen mit Gelatine, und zwar so, daß jede der drei Arterien anders gefärbte Gelatine eingespritzt wurde. Nach der Eröffnung der Fissura lateralis cerebri wurde das Präparat mit Formol fixiert. An 35 Hirnen (21 Männer und 14 Frauen) präparierte er die Arterien in ihrem ganzen Verlauf, stellte die Art ihrer Ramifikation fest und begrenzte ihre Rindenbezirke. Während seiner Arbeit hatte Verf. Gelegenheit, den Wert der physikalischen Eigenschaften der Gelatine für die Präparation festzustellen. Wenn er zu dicke Gelatine oder eine gröbere Farbensuspension verwendete, veränderte sich das Bild im Sinne Durets: Es wurden nur wenige gröbere Anastomosen (1. Grades) in Gegenden konstatiert, in denen die Gebiete der einzelnen Hirnarterien ineinander übergehen. Zwischen Ästen derselben Hirnarterie wurden keine Anastomosen konstatiert. Wenn aber flüssigere Gelatine oder feinkörnige Farben verwendet wurden, wurden zwischen den Ästen benachbarter corticaler Stämme derselben Arterie sehr feine Anastomosen (2. Grades) injiziert.

Dadurch wurde die Existenz eines pialen Arteriennetzes im Sinne von Testa und Latarjet bewiesen. Doch hat die Großzahl der arteriellen Äste eine terminale Verzweigung. Die aus den 3 Hirnarterien entstehenden Stämme zeigen zuerst individuelle Schwankungen in ihrer Anordnung, doch werden die aus ihnen entstehenden Äste durch Verlauf und Ramifikationstypus gut charakterisiert, so daß eine Identifizierung möglich ist. Am wenigsten beständig sind die Äste der Arteria cerebri posterior. Die Grenze des Gebietes der Arteria cerebri media zeigt auf der Gyri centrales, auf dem oberen Ende der Fissura parietooccipitalis und auf der impressio petrosa charakteristische Krümmungen. Sehr variabel ist die Grenze der Rindengebiete der Arteria cerebri anterior und posterior auf dem Praecuneus.

J. A. Valšík (Prag).

Hayek, Heinz v.: Über besondere Strukturen der Adventitia. (42. Vers. d. Anat. Ges., Würzburg, Sitzg. v. 24.—27. IV. 1934.) Anat. Anz. 78, Erg.-H., 63—66 (1934).

Nach Ansicht des Verf. ist es notwendig, den unterschiedlichen Bau der Zwerchfellarterien zu untersuchen, dort, wo sie dem Muskels und dort, wo sie der Sehnenplatte aufliegen. Wo die Arterie dem Muskel aufliegt, zeigt sie den vom Verf. beschriebenen deutlichen Dickenunterschied der Adventitia, die entsprechend den einstrahlenden Bindegewebsbalken der Fascie besonders stark ist, dort, wo die Arterienwand dem Muskel anliegt, dagegen dünner. Ein Dickenunterschied fehlt dort, wo die Arterie innerhalb der Zwerchfelmuskulatur gelegen ist. Aus dem verschiedenen Bau der Zwerchfellarterien und aus der verschiedenen Funktion des Zwerchfells kann man schließen, daß sich die Längsstrukturen der Adventitia der Zwerchfellarterien erst unter der Beanspruchung bilden. Die Bedeutung der Anlagerung der auf Zug beanspruchten Bindegewebsbalken gerade an die Arterie scheint darin zu liegen, daß die unter dem Blutdruck mit Blut gefüllte Arterie ein biegungsfestes Gebilde darstellt, dessen Festigkeit gegen Biegung durch die Anlagerung der Bindegewebsbalken weiter erhöht wird.

Ballowitz (Münster i. W.).

Sauser, Gustav: Arterieller Gefäßring um Trachea und Oesophagus. (Anat. Inst., Univ. Innsbruck.) Z. Anat. 103, 371—383 (1934).

Beschreibung einer seltenen Gefäßanomalie, die bei der Sektion einer an Tuberkulose gestorbenen, 40jährigen Frau gefunden wurde und die darin bestand, daß sich um die Trachea und den Oesophagus in der Nähe der Bifurkation starke arterielle Gefäße ringförmig herumlegten, so daß ein geschlossener arterieller Gefäßring um die beiden zusammenliegenden Organe bestand. Die Arterienäste lagen der Trachea und dem Oesophagus so dicht an, daß an letzterem tiefe dellenförmige Einsenkungen entstanden waren. Das Herz und die Pars ascendens der Aorta waren völlig normal; es waren aber zwei Aortenbögen vorhanden, ein rechter und ein linker. Die sich unter einem Winkel von etwa 80° zur Aorta thoracica vereinigenden beiden Aortenbögen bildeten eine Gabel, in welcher Trachea und Oesophagus lagen.

Ballowitz (Münster i. W.).

Stieve, Hermann: Muskelleistung und Herzgröße bei verschiedenen Tierarten. (42. Vers. d. Anat. Ges., Würzburg, Sitzg. v. 24.—27. IV. 1934.) Anat. Anz. 78, Erg.-H., 86—107 (1934).

Da beim Menschen die absoluten und relativen Gewichte des Herzens gesunder Individuen nur sehr selten untersucht werden können, bestimmt der Autor diese Maße bei Säugetieren und Vögeln, um der Frage näherzukommen, warum die Herzgröße die bekannt starken Schwankungen aufweisen kann. Er berücksichtigt dabei die Seehöhe, in der die Tiere leben, ferner ihre Arbeitsleistungen und übrige äußere Einflüsse. Nach diesen Untersuchungen erscheint es unmöglich, Muskelleistungen und Herzgröße miteinander in Deckung zu bringen und vom menschlichen Standpunkte aus zu betrachten. Auch liegt kein Grund vor anzunehmen, daß der Aufenthalt in höheren Lagen starke Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Herzens stellt. Dagegen lassen sich eine Reihe von bekannten Größenunterschieden durch Berücksichtigung der Herzbeanspruchung für die Aufrechterhaltung der Körperwärme erklären. *A. Pischinger.*

Zlábek, K.: Contribution à la connaissance de la structure du myocarde des poissons. (Beitrag zur Kenntnis der Struktur des Myokards der Fische.) (Inst. d'Anat., Univ., Prague.) C. r. Soc. Biol. Paris 117, 178—180 (1934).

Es wird zunächst die Gliederung des Myokards in eine äußere kompakte und eine innere spongöse Schicht beschrieben. Es handelt sich um zwei funktionell verschiedene Schichten, deren innere das Blut in den Ventrikel und in den Aortenbulbus leitet. Der äußere kompakte Anteil dient als zusammenfassende Schicht für alle intertrabekulären Räume. Beide Schichten sind durch eine Grenzschiebt, eine Art bindegewebiges Septum, verbunden. Der von den älteren Autoren erwähnte Spalt zwischen beiden Schichten ist im Leben nicht vorhanden, jedoch erfolgt — wie durch übertriebene Alkoholinjektion gezeigt werden kann — an der Stelle des Septums leicht eine Trennung der beiden Schichten.

A. Pischinger (Graz).

Wallraff, Josef: Die konstruktive Form des menschlichen Herzbeutels. (Vorl. Mitt.) (42. Vers. d. Anat. Ges., Würzburg, Sitzg. v. 24.—27. IV. 1934.) Anat. Anz. 78, Erg.-H. 68—80 (1934).

Die Veränderlichkeit der Form des Herzbeutels ist durch eine verschiedene Lagerung der kollagenen Bündel in den vorhandenen 3 Schichten ermöglicht. Es ändert sich hierbei der Kreuzungswinkel der rechtwinkelig und diagonal gekreuzten Fasern. Nur dadurch kann der Herzbeutel, der stets dem Herzen elastisch anliegt, allen Formveränderungen während der Herztätigkeit gerecht werden. Eine elastische Veränderlichkeit des Volumens ist hauptsächlich gewährleistet durch eine dichte und feine Weilung der sich kreuzenden Fasern. Durch Entwellung der Fasern kann das Volumen eines Herzbeutels von rund 800 ccm Rauminhalt um 278 ccm steigen. Eine Dehnung des Beutels über das physiologische Maß (Exsudate, Herzdilatation) kann nur durch Wachstum der Fasern erfolgen. A. Pischinger (Graz).

Nervensystem, Zentren.

Popa, Florica Gr.: Les „terminaisons en grappe“ et un de leurs rôles possibles. (Die „terminaisons en grappe“ und eine ihrer möglichen Funktionen.) (*Inst. d'Anat. Univ., Jassy.*) Hommage Mém. Cantacuzène 643—652 (1934).

Die genannten (traubenförmigen) Nervenendigungen wurden mit verschiedenen Methoden (Goldchlorid, Silbernitrat und Methylenblau) untersucht. Diese Endigungen liegen nach Verf. immer epilemmal. Sie können gleichzeitig 2—3 Muskelfasern umfassen, sie liegen manchmal an der Capillarwand und Verf. fand sie oft zwischen den Muskelfasern. Die genannten Nervenendigungen können ihre Größe durch die kontrahierten oder verlängerten Muskelfasern verkleinern bzw. vergrößern, wodurch sie nach Verf. eine Nachricht über den Zustand der Muskelfasern abgeben. F. Kiss.

Okinaka, Shigeo: Über das Endplättchen, besonders über das extrapyramidale Endplättchen im Intereostalmuskel. (*Med. Klin., Kais. Univ. Tokyo.*) Mitt. med. Ges. Tokio 48, 879—886, dtsh. Zusammenfassung 879 (1934) [Japanisch].

Experimentelle Untersuchungen an jungen Hunden, denen teils Spinalganglien, teils vordere Wurzeln im Bereiche des Brustmarkes exstirpiert wurden. Nach entsprechender Zeit wurden die Tiere getötet und das Material in Alkohol fixiert. Paraffinschnitte mit einer Modifikation der Cajalschen Methode behandelt dienten als Untersuchungsobjekte. — Waren Spinalganglien exstirpiert, fand der Verf. „großmarkhaltige“ (motorische), „feinmarkhaltige“ (extrapyramidale) und marklose (sympathische) Fasern mit ihren Endplättchen, die er beschreibt. Da die parasympathischen Fasern durch Exstirpation der Spinalganglien zugrunde gegangen seien, müßten die neu beobachteten Endplättchen, die mit den feinen markhaltigen Fasern in Verbindung stehen, als extrapyramidale aufgefaßt werden. — Waren vordere Wurzeln exstirpiert, wurden viele fein markhaltige und marklose Fasern und nur selten mitteldicke markhaltige Fasern, die wohl sensibler Natur seien, beobachtet. Verf. glaubt, daß die feinmarkhaltigen Fasern spinalparasymphathischer Natur sind. Harting (Bonn).

Rondolini, Germano: Numero dei neuroni sensitivi nei gangli della regione lombosacrale dell'uomo. (Die Zahl der sensiblen Neuronen in den Ganglien der Lumbo-Sakralregion des Menschen.) (*Istit. di Anat. Umana Norm., Univ., Torino.*) Monit. zool. ital. 45, 193—196 (1934).

In den Lumbal- und Sacralganglien wurden die Zellen gezählt und die Zahlen der beiden Seiten miteinander verglichen. Zwischen den beiden Antimeren besteht in den ersten 4 Ganglien, von oben nach unten fortschreitend, eine Asymmetrie von 5—13%, wobei sich die größeren Zahlen auf der linken Seite finden. Beim 5. Lumbalsegment besteht eine Verschiedenheit von 21% zugunsten der rechten Seite. Ähnlich liegen die Verhältnisse in den Sacralganglien: Linksüberwiegen im 1., 2. und 5. Segment, Rechtsüberwiegen im 3. und 4. Beim Vergleich der Summe aus allen Ganglien der

umbo-Sacralregion bleibt aber nur noch ein Mehr von etwas über 1% zugunsten der rechten Seite.

H. Löwenbach (Berlin-Dahlem).

Cordier et Coulouma: Les nerfs carotico-tympaniques. Leurs rapports avec la caisse du tympan et leurs relations avec le rameau de Jacobson. (Die Nn. carotico-tympanici. Ihre Verhältnisse zum Cavum tympani und ihre Anastomosen mit dem Jacobson'schen Nerven.) (*Laborat. d'Anat., Univ., Lille.*) Rev. Path. comp. et Hyg. n. 34, 1270—1281 (1934).

Feinpräparation der Nerven des Cavum tympani sowie ihrer Anastomosen mit dem Plexus carotideus internus. Verff. wollen dadurch eine anatomische Grundlage für experimentale und klinische Beobachtungen geben, laut welcher die pupillo-labialis-Bahnen durch das Mittelohr verlaufen.

F. Kiss (Budapest).

Grzybowski, J.: L'innervation de la dure-mère crânienne chez le chien domestique. (Die Innervation der Dura mater des Haushundes.) Anthropologie 12, Suppl.-H., 34 S. 42 (1934).

Verf. studierte die Innervation der Dura mater an 10 Hundeschädeln und fand, daß die Dura mater der Fossa cranii anterior mit Nerven versorgt wird, die aus Ästen abzweigen, die die Arteria ophthalmica int. und die Art. ethmoidalis begleiten. Diese Nerven versorgen die Dura mater der Basis und der Stirn bis zum Falx cerebri. Zweige des N. ophthalmicus, des N. trochlearis und der N. spinosus versorgen die D. m. der Basis der mittleren Schädelgrube, dann die temporale und einen Teil der parietalen D. m. Ein Übertreten dieser Nerven in die Falx wurde nicht beobachtet. Das Tentorium cerebelli und die, unterhalb gelegene parieto-occipitale D. m. werden mit Zweigen versorgt, die aus dem N. trochlearis und dem N. ophthalmicus stammen. Einige von diesen Zweigen verlaufen in der parieto-occipitalen D. m. bis zu der Falx, andere durchkreuzen das Tentorium und enden im Hinterteil der Falx. Manchmal findet man einen langen Ast, der dem freien Rande der Falx cerebri entlang läuft, diese Nerven kommen aus dem Tentorium cerebelli und aus der D. m. der Fossa cerebri ant. Der Hinterteil der Falx wird immer mit mehreren Nerven versorgt, die aus dem Tentorium cerebelli kommen. Die D. m. der Fossa cerebelli wird durch einen langen Ast des N. vagus versorgt. Manchmal wird ein Ast des N. hypoglossus gefunden.

J. A. Valšík (Prag).

Beccari, Nello: Contributi alla migliore conoscenza delle terminazioni centrali del nervo acustico nei pesci. (Beiträge zur besseren Kenntnis der zentralen Endigungen des Acusticus bei Fischen.) Psychiatr. Bl. 38, 297—309 (1934).

Untersuchungen über die Endigungen des Acusticus bei Clupea pilchardus und Scyllium naticula, die sich nicht zu kurzer Zusammenfassung eignen. Die Resultate sind am besten aus den Figuren zu ersehen.

Steck (Lausanne).^{oo}

Herriek, C. Judson: Neurobiotaxis in the Corpus striatum. (Neurobiotaxis im Corpus striatum.) (*Hull Laborat. of Anat., Univ. of Chicago, Chicago.*) Psychiatr. Bl. 38, 419 S. 425 (1934).

Die ventrolaterale Hemisphärenwand von Necturus (Amphibien) stellt das Priordium des Striatums und des Mandelkerns der höheren Wirbeltiere dar. Die vorderen und die hinteren Anteile der Strio-Amygdala-Formation empfangen Olfactoriusfasern. Der vordere Teil ist auf Grund seiner Faserbeziehungen als Vorläufer des Kopfes des Nucleus caudatus, der hintere Teil als der des Nucleus amygdalae zu betrachten. Der mittlere Teil stellt mit seinen Verbindungen zum Thalamus das Priordium des Linsenkerns dar. Dieses ganze Strio-Amygdala-Areal weist 2 Zelltypen auf: große Zellen mit reichverzweigten Dendriten und dicken Achsenzylindern und kleinere Elemente mit kurzen marklosen Achsenzylindern. Das Striatum war ursprünglich ausschließlich eine Endstätte olfactorischer Bahnen. Unter dem Einfluß nicht-olfactorischer Systeme trat dann eine lokale Spezialisierung einzelner Abschnitte ein. Mit der Verschiedenheit der Funktionen bilden sich die typischen Zellelemente und Faserverbindungen und damit aus einem ursprünglich homogenen Feld (im Sinne der Neurobiotaxislehre) die verschiedenen Systeme von „Kernen“ aus. Die Zellen

sammeln sich dabei in der Richtung der Zentren, mit denen sie in Verbindung stehen. Die neurobiotaktischen Zellbewegungen stellen eines der wichtigsten morphogenetischen Prinzipien dar, nach denen sich in der Phylogenie aus dem unspezialisierten Nervengewebe physiologisch und anatomisch abgrenzbare Systeme gebildet haben. *Ernst Scharrer.*

Addens, J. L.: A critical review of the occurrence of crossing root-fibres in the facialis, vestibular, glossopharyngeal, and vagus nerves. (Eine kritische Übersicht über das Vorkommen von gekreuzten Wurzelfasern im Facialis, Vestibularis, Glossopharyngeus und Vagus.) (*Centr. Inst. f. Brain Research, Amsterdam.*) Psychiatr. Bl. 38, 274—291 (1934).

Die Frage nach dem Vorkommen von gekreuzten Wurzelfasern in den genannten Hirnnerven wird auf Grund der in der Literatur vorhandenen Angaben und unter Heranziehung der Verhältnisse beim 7 Tage alten Huhn (Cajal-Serie) erörtert. Die von Cajal bei Säugern als kreuzende sensorische oder motorische Facialisfasern (bzw. als Vestibularisfasern) aufgefaßten Bündel gehören den Speicheldrüsenzentren an. Es gibt also keine unter dem Ventrikel kreuzenden primären Vestibularis- bzw. Facialisfasern. Auch bei den Vögeln handelt es sich um Fasern des autonomen Systems bzw. sekundäre kreuzende Vestibularisfasern und nicht um kreuzende sensorische VII-Fasern bzw. primäre kreuzende Vestibularisfasern, wie Cajal meinte. Die Existenz der von Wallenberg und Windle festgestellten primären Vestibularisfasern, die im Hirnstamm kreuzen sollen, ist sehr zweifelhaft. Die teilweise Kreuzung der primären vestibulo-cerebellaren Wurzel ist aber sichergestellt. Außer in der Commissura infima gibt es keine kreuzenden sensorischen oder motorischen Glossopharynxgeus- bzw. Vagusfasern. Bei diesbezüglichen Angaben in der Literatur handelt es entweder um Fibrae arcuatae internae oder Fasern der dorsalen Cochleariscommissur und deren Äquivalente. (Vgl. diese Ber. 29, 237.) *Ernst Scharrer* (Frankfurt a. M.).

Huber, G. Carl, and Elizabeth C. Crosby: The influences of afferent paths on the cytoarchitectonic structure of the submammalian optic tectum. (Der Einfluß afferenter Faserbahnen auf die cytoarchitektonische Struktur des Tectum opticum der Submammalier.) Psychiatr. Bl. 38, 723—738 (1934).

Das Tectum opticum der Cyclostomen, Ganoiden, Teleostier, Amphibien, Reptilien und Vögel wird vergleichend beschrieben. Es wird für alle Submammalier ein 6schichtiger Grundtypus angenommen. Von den afferenten Bahnen wird der Verlauf und die Endigungsweise des Tractus opticus sowie der Bahnen aus dem periventriculären System, die im wesentlichen bei allen Submammaliern übereinstimmen, in großen Zügen dargestellt. Zwischen den Zentren für Gehör und Seitenliniensystem und dem Tectum opticum bestehen enge Beziehungen. Bei allen untersuchten Formen enden im Tectum opticum auch aufsteigende sensorische Bahnen aus der Medulla oblongata. Zu diesen konstanten Bahnen kommen ferner bestimmte Verbindungen, die sich nur bei einzelnen Wirbeltiergruppen finden. Die Differenzierung des Tectum opticum, das bei urodelen Amphibien und bei Ganoiden primitiv entwickelt ist, drückt sich bei den Teleostiern durch eine deutliche, vor allem durch die Endigungen thalamotectaler Verbindungen bedingte Sonderung der Schichten aus. Das Tectum opticum des Frosches bezieht außer den Endigungen des Tractus opticus auch bulbo-tectale, spino-tectale und isthmo-tectale Fasern sowie solche aus der lateralen Schleife. Bei den Sauropsiden sind die afferenten Verbindungen besonders reich und vielfältig. Mit der Zunahme der peripheren afferenten Bahnen ist eine neurobiotaktische Wandlung gewisser Neuronen in peripherer Richtung verbunden, die zur Schichtung des Tectum opticum bei Teleostiern, Reptilien und Vögeln führt. *Ernst Scharrer.*

Sinnesorgane.

Hanström, Bertil: Neue Untersuchungen über Sinnesorgane und Nervensystem der Crustaceen. IV. (*Zool. Inst., Univ. Lund.*) Ark. Zool. 26 A, Nr 24, 1—66 (1934)

Der erste Teil enthält Bemerkungen über Nervensystem und Sinnesorgane einiger

Phyllopoden. Gehirn und Komplexaugen von *Polyartemia forcipata* gleichen weitgehend dem von *Artemia* und *Branchipus*. Es konnte nur ein paariges dorsales Frontalorgan gefunden werden, das ventrale scheint zu fehlen. Da auch das Naupliusauge sehr klein ist, so steht *Polyartemia* in der Ausbildung dieser frontalen Sinnesorgane auf einer tieferen Stufe als die anderen Euphyllopoden. Die Feststellungen Nowikoffs bezüglich des Baues des Gehirns von *Limnadia* werden bestätigt. Im Kopfvorsprung von *Limnadia* liegen zwei Zellhaufen, die wahrscheinlich dem dorsalen paarigen Frontalorgan angehören, ebenso wie eine dritte Partie, die sich an der Bildung des Augenkammerorgans beteiligt. Entsprechend liegen die Verhältnisse bei *Estheria cycladioides*. Die Untersuchung von *Sida crystallina* gibt schließlich Veranlassung, die Verschmelzung der Augen und der Sehganglien bei den Phyllopoden vergleichend darzustellen. Der Hauptteil der Arbeit enthält Untersuchungen über *Anaspides tasmaniae* als Vertreter der Anaspidae, der untersten Ordnung der Eumalakostraken. Die proto-, deuto- und tritocerebralen Gehirnnerven von *Anaspides* werden beschrieben. Ihre Anordnung wie der Bau des Gehirns erinnert am meisten an die Verhältnisse bei den Mysiden. So sind die Antennulennerven bei beiden Gruppen wenig differenziert, die Corpora pedunculata sind schwach entwickelt, Protocerebralbrücke und Zentralkörper sind deutlich miteinander verbunden usw. Auch mit anderen, früher untersuchten Crustaceengruppen zeigt das Gehirn von *Anaspides* mannigfache Übereinstimmungen. Im Augenstiel von *Anaspides* findet sich das bis jetzt nur von Decapoden und Stomatopoden durch die Hanströmschen Untersuchungen bekanntgewordene Organ X, ein aus Drüsen-Nervenzellen bestehendes, wahrscheinlich inkretorisches Organ. Das Auge von *Anaspides* läßt eine deutliche Verwandtschaft mit dem der Mysidaceen erkennen. Jedes Ommatidium besteht aus 2 Corneagen- und 2 Krystallkegelzellen, die den eucenen, auf dem Querschnitt runden Krystallkegel bilden. Die 7 pigmentierten Sehzellen der Retinula bilden ein schmales, spindelförmiges Rhabdom. Auf jedes Ommatidium kommen zwei Irispigmentzellen. Die Statocyste liegt als eine oval geformte Höhle an der medialen Seite des Basalglieds der Antennulen. Sie steht durch eine enge Öffnung mit der Außenwelt in Verbindung. Es werden aber keine Statolithen von außen eingeführt, sondern die Sinneshaare dienen gleichzeitig als Statolithen und als Rezeptoren. Diese sind an ihrem peripheren Ende keulenförmig verdickt und erregen bei verschiedenen Körperstellungen durch ihre eigenen Bewegungen die in einen Kanal in ihrem Innern eintretenden Nervenfasern. Dieser Statocystentyp hat nur in der von Caroli beschriebenen Statocyste der Höhlenform *Typhlocaris* ein Gegenstück. *Anaspides* besitzt weiterhin ein bei erwachsenen Tieren offenbar funktionsloses Nackenschild. Es ist von einem vierzelligen Sinnesorgan umgeben, das dem der Phyllopoden entsprechen dürfte. Auf Grund der hier kurz referierten Befunde glaubt der Verf., daß die Anaspidae eine zentrale Stellung innerhalb der Malakostraken einnehmen. Sie leiten in manchen ihrer Merkmale zu niederen, in anderen zu höheren Crustaceengruppen über. (III. vgl. diese Ber. 29, 30.) Ernst Scharrer (Frankfurt a. M.).

Barth, Günther: Untersuchungen über Myochordotonalorgane bei dekapoden Crustaceen. (Zool. Inst., Univ. Tübingen.) Z. Zool. 145, 576—624 (1934).

Am proximalen Ende des Meropoditen aller untersuchten Dekapoden finden sich auf der Ventralseite Sinnesorgane, deren Lage bei manchen Brachyuren durch eine Vorwölbung des Panzers gekennzeichnet ist und die als Myochordotonalorgane bezeichnet werden (sie fehlen anscheinend nur den Scherenfüßen der Macruren). Bei *Dotilla myetiroides*, bei der das Organ entdeckt wurde, ist zwischen der Innenwand des Meropoditen und dem kleinen Beugemuskel eine Membran ausgespannt, durch die Fortsätze von Sinneszellen durchtreten. Diese Zellen werden vom Beinnerv versorgt und sind in 2 verschiedenen Größen ausgebildet. Die Zellen selbst liegen oberhalb der Membran; ihre Fortsätze durchbohren die Membran und setzen sich in Endstränge fort, die distal hohle Stifte tragen. An die Stifte schließen sich Verstärkungsfäden an, die sich im Panzer durch eigentümlich propfenartige Verankerungen fest-

heften. Einer derartigen Anheftungsstelle entspricht auf der Außenseite eine Verdickung der Grenzlamelle. Proximal von dem beschriebenen Organ findet sich ein kleineres, ähnlich gebautes, das mit einem dorsalen, sehr feinen Muskelbündel in Verbindung steht. In der Nähe heftet sich auch ein dreischenkliges Ligament an der Membran an. Dieser Bau des Sinnesorganes findet sich mit geringen Abwandlungen bei allen untersuchten Arten. Bei den Macruren ist die Membran zu einem bindegewebigen Band verschmälert, bei den Anomuren ist nur ein bindegewebiger Strang ausgebildet. Aus ihrer Lage wird auf eine propriozeptive Funktion der Sinnesorgane geschlossen. Extirpationsversuche ergaben bei Arten mit schwach entwickeltem Organ keine deutlichen Ausfallserscheinungen, während Arten mit gut entwickeltem Organ (Ocypode ceratophthalma) gestörte Gangbewegungen zeigten. Verf. hält die Myo-chordotonalorgane für den stiftführenden Sinnesorganen analoge Bildungen.

Wilhelm Kühnelt (Wien).

Läsker, Gerhardt: Der vordere Augenabschnitt bei Lacerta serpa und Geckonen und die Funktion seiner Muskeln. Jena. Z. Naturwiss. 69, 15—82 (1934).

Die vorliegende Arbeit stellt sich die Klärung der morphologischen Verhältnisse und der Funktion des Akkommodationsapparates und der Muskulatur des vorderen Augenabschnittes der Geckonen und Eidechsen zur Aufgabe. Im 1. Kapitel der gründlichen morphologischen Untersuchung werden die Verhältnisse bei den Geckoniden eingehend beschrieben. Die Einzelheiten der mikroskopisch-anatomischen Befunde können im Referat nicht wiedergegeben werden. Hervorzuheben ist die Feststellung, daß der Skleralring im Prinzip die gleiche Anordnung der Knochenschuppen bei allen Geckonen zeigt. Bei Tarentola mauretanica besteht er aus 14, bei Hemidactylus turcicus aus 16 Blättchen, die außen und innen von den bindegewebigen Sklerallamellen umgeben sind. Die Ciliarmuskulatur besteht aus 3 Anteilen, dem meridional verlaufenden Brückeschen, dem Cramptonschen und dem Transversalmuskel. Der Cramptonsche Muskel zeigt nur z. T. einen meridionalen Faserverlauf; in seinem Bereich findet sich der Transversalmuskel, der von der innersten Lamelle des ventro-nasalen Skleralabschnittes nach temporal zur fetalen Augenbecherspalte und von da senkrecht zur Linse zieht. Die Zonula der Geckoniden, die sich in mancher Hinsicht von der der Lacertiden unterscheidet, setzt sich aus einer vorderen Gruppe von starken Fasern, einer mittleren Schicht von feinen, an Ursprung und Ansatz pinselförmig aufgeteilten Fibrillen und mehreren nach hinten sich anschließenden Lagen starker Fasern zusammen. Verschiebungen der Linsensegmente und -zellen gegeneinander werden bei der Akkommodation, die durch Druck auf eine kreisförmige Zone im distalen Abschnitt der gallertig weichen Linse erfolgt, durch Verzahnungen der Zellen an ihren schmalen Längsseiten vermieden. In die spaltförmige Pupille der Geckonen ragen von beiden Seiten 5 ungleich große Irislappen. Der komplizierte und charakteristische Verlauf der Sphincter- und Dilatorfasern der Iris wird eingehend beschrieben; ferner wird ihre Versorgung durch einen doppelten Gefäßring geschildert. — Der 2. Abschnitt der Untersuchung bringt als Beispiel für die Lacertiden die Darstellung der Verhältnisse bei Lacerta serpa. Auch hier wird eine für die Art konstante Anordnung der Blättchen des knöchernen Skleralringes gefunden. Im wesentlichen ist die Anordnung der Ciliarmuskulatur der bei den Geckoniden ähnlich. Der Transversalmuskel findet sich bei Lacerta distal vom Cramptonschen Muskel. Die Schichtung der Zonulafasern und die Verzahnung der Zellen des Linsenkerns stimmt ebenfalls im wesentlichen mit der für die Geckonen gegebenen Schilderung überein. Die Pupille von Lacerta serpa ist querelliptisch; der pupillare Irisrand ist fein gekerbt und gefältelt mit je einem dorsalen und ventralen tieferen Einschnitt. Die Sphincterfasern sind nicht in symmetrischen Ringen angeordnet, sondern alle Fasern konvergieren hinter der ventralen Pupillenkerbe. Die Dilatorfasern verlaufen radiär, z. T. biegen sie an der äußeren Sphinctergrenze oder noch im Bereich des Sphincters um und verlaufen mit den zirkulären Fasern. Die Gefäßversorgung der Iris erfolgt durch einen einfachen

teriellen Ring. Eine vergleichende Untersuchung von Linsen verschiedener Schlangenspezies zeigt auch bei diesen die durch die gegenseitige Verzahnung der Linsenzellen bedingte Regelmäßigkeit der Radiärlamellen der Linse. Von phylogenetischen Gesichtspunkten erscheinen die Einrichtungen des vorderen Augenabschnittes der Geckonen als Merkmale einer altertümlichen und einfacheren Entwicklungsstufe gegenüber den Lacertiden. Die Neuerwerbungen der Geckoniden (Brille, Verschlussfähigkeit der Pupille, doppelter Gefäßring usw.) sind spezielle Anpassungen. — Im 3. Kapitel werden die Irisbewegungen von *Tarentola mauretanica*, die durch Überlagerung der Irislappen zum Verschluss der Pupille bis auf 4 punktförmige Öffnungen führen können, und von *Lacerta serpa* in ihren Einzelheiten geschildert, teils auf Grund von Beobachtungen am lebenden Tier (*Tarentola*), teils nach Befunden am enucleierten Bulbus (*Lacerta*). Bei der Akkommodation des Eidechsenauges verengert sich der Ring des Ciliarkörpers infolge der Kontraktion des Crampton'schen Muskels und drückt durch Vermittlung des Ringwulstes der Linse auf die Linsenfasern. Diese weichen nach distal aus, und es entsteht so ein vorderer Lentikonus. Durch die Kontraktion des Transversalmuskels wird die Linse ventralwärts und etwas nasalwärts verlagert. Der Brückesche Muskel zieht den Ciliarkörper nach vorne und unterstützt dadurch die Wirkung des Crampton'schen Muskels. Die Befunde überzeugen durch ihre klare Darstellung.

Ernst Scharrer (Frankfurt a. M.).

Gasteiger, H.: Beiträge zur Frage des Reticulo-Endothelialsystems des Auges, mit besonderer Berücksichtigung der Hornhaut. (*Univ.-Augenklin., Innsbruck.*) Arch. Augenheilk. 108, 408—421 (1934).

Verf. spritzte 8 Kaninchen teils Trypanblau, teils Lithioncarmin intravenös oder subcutan ein und schnitt sodann die Cornea von der Vorderkammer aus mittels Dissectionsadel an, wodurch eine Quellung derselben hervorgerufen wurde. Bei der histologischen Untersuchung der Augen dieser Tiere konnte das Vorkommen reticulo-endothelialer, das ist aktiv farbstoffspeichernder Zellen in Bindehaut, Sklera und Uvea und ihr Fehlen in Netzhaut, Glaskörper und Linse bestätigt werden. Entgegen der bisher herrschenden Ansicht konnten aber farbstoffspeichernde Zellen bei einem verhältnismäßig großen Teil der Tiere auch in der Hornhaut nachgewiesen werden, wie bisher nur Blotvogel bei ganz jungen Mäusen gefunden hatte. Da jegliche entzündliche Erscheinungen fehlten, zieht Verf. den Schluß, daß diese Zellen Bestandteile der normalen Hornhaut sind und sich nur bisher wegen der eigenartigen Stoffwechselverhältnisse der Hornhaut dem Nachweise entzogen. Durch die erzeugte Quellung werde der Zutritt des Farbstoffes zur Cornea erleichtert und damit die Voraussetzung für die Speicherung des Farbstoffes geschaffen, der unter gewöhnlichen Bedingungen wohl nicht zu den Geweben der Hornhaut gelangen und zu einer Färbung bzw. Farbstoffspeicherung der normalerweise dort vorhandenen reticuloendothelialen Zellen führen kann. Verf. vermutet, daß die nachgewiesenen Zellen mit den Maximo-vschschen ruhenden Wanderzellen in der Hornhaut wesensgleich sind.

Schmelzer (Erlangen).

Key-Åberg, Hans: Beitrag zur Kenntnis der Anatomie und Physiologie des Musculus retractor bulbi beim Kaninchen. Sv. Läk. sällsk. Hdl. 60, 117—148 (1934).

Nach einer einleitenden Übersicht über die betreffende Literatur berichtet Verf. über eigene experimentelle und anatomische Studien am Kaninchenauge an einem großen Tiermaterial. Seine Untersuchungen haben, im Widerspruch zur Auffassung vieler anderer Autoren, ergeben, daß der Musculus retractor ein praktisch genommen ungeteilter Muskel ist. Er erscheint als eine den N. opticus und später den Bulbus ventral und lateral umfassende Muskelhülle, die in der Gegend des Äquators einen fein-faserigen tendinösen Abschluß erfährt. Nach oben innen sowie nach außen ist diese Muskelhülle teilweise offen, so daß eine Hufeisenform entsteht. Die Reizung des M.-retractor im total tenotomierten Auge mit faradischem Strom in der Höhe des hinteren Poles bewirkt eine deutliche Retraktionsbewegung. Bei Reizung des Muskels mehr

nach vorn sowohl medial als lateral ist die Retraktionsbewegung gemischten Typus: Zuerst eine einleitende schnelle Abduktion oder Adduktion und unmittelbar darauf eine reine Retraktion. Innerviert wird der Retractor nach den Untersuchungen des Autors einwandfrei durch Zweige des Abducens. Auch die experimentellen Untersuchungen zeigten die Unabhängigkeit des Retractormuskels vom N. oculomotorius. Beobachtungen, ausgeführt zur Klarlegung der Rolle des M.-Retractor bei der Auflösung von Nystagmusbewegungen des Auges, haben keinerlei wahrnehmbare Augenbewegungen feststellen können, wenn die übrigen 6 Muskeln wegoperiert worden sind. Dagegen ist eine minimale (mit der Nystagmusbewegung am intakten Auge isochrone und gleichgerichtete) Bulbusbewegung beobachtet worden, sobald der Retractor im Verlaufe des Versuches mit dem umgebenden tenotomierten Muskelbett in Kontakt gebracht worden ist. Auch bei calorischer Labyrinthreizung hat man keine wirklichen Nystagmusbewegungen des Retractors nachweisen können. Die minimalen, mit einem Nystagmus der Mm. recti synchronen Abweichungen, die die registrierten Kurven für den Retractor aufweisen und die vom Verf. als „Mitbewegungen“ aufgefaßt worden sind, werden auch an Kurven beobachtet, die eine Registrierung der Bewegungen ausschläge des peripheren Opticusstumpfes bei calorischer Labyrinthreizung darstellen.

Bassia Baumgart (Rom).

Hornoyold, A. Gandolfi: Les otolithes de trois grandes anguilles jaunes des lacs italiens. (Die Otolithen von drei großen Gelbaalen italienischer Seen.) (57. sess. Chambéry, 24. VII.—4. VIII. 1933.) Assoc. Franç. Avancement Sci. 304—307 (1933).

Man findet zuweilen große Gelbaale mit stark entwickelter Muskulatur am Kopf, so daß dieser im Verhältnis zum mageren Körper ungewöhnlich groß erscheint. Drei solcher Aale sind hier untersucht. Ein Hauptaugenmerk wird auf Form und Größe der Otolithen gerichtet. Die beiden Otolithen jedes Aales weichen in Länge und Breite voneinander ab. Auch steht die Otolithengröße nicht in einem bestimmten Verhältnis zur Körpergröße. Die Otolithen werden in einigen morphologischen Einzelheiten beschrieben.

Schnakenbeck (Hamburg).

Wagner, D. S.: Liopelma studies. I. The structure of the inner ear in relation to the reduction of the middle ear in the Liopelmidae (Noble). (Die Struktur des inneren Ohres in bezug auf die Rückbildung der mittleren Ohrsphäre bei den Liopelmidae.) (Dep. of Zool., Univ., Stellenbosch.) (42. Vers. d. Anat. Ges., Würzburg, 24.—27. IV 1934.) Anat. Anz. 79, 20—36 (1934).

Die Liopelmidae bilden eine primitive Anurengruppe, von denen nur 2 Genera bekannt sind: *Ascapus* aus Nordamerika und *Liopelma*, das einzige Amphibium Neuseelands. Die vorliegende Arbeit ist die erste einer Reihe, welche sich mit der Anatomie der Liopelmidae befassen wird. Sie behandelt den Bau des inneren Ohres bei diesen Formen ohne Mittelohr, im Vergleich zu dem inneren Ohr von *Rana*. Aus der Beschreibung des Labyrinthes, welche von einigen Schnittbildern erläutert wird, geht hervor, daß keine wesentlichen Unterschiede mit dem Froschlabyrinth vorhanden sind. Beide Genera sind im Besitze einer Papilla amphibiorum sowie einer Papilla basilaris. Der Mittelohrraum fehlt. Die Fenestra ovalis enthält nur das Operculum, während das Plectrum fehlt. Das Operculum ist knorpelig und teilweise dorsal mit dem Rand des Foramen ovale synchondrotisch verbunden. Der M. opercularis verbindet das Operculum mit der Suprascapula. Die Muskulatur der Oticalregion wird eingehend beschrieben; sie unterscheidet sich nicht wesentlich von derjenigen von *Rana* und *Bufo*. Die Reduktion der mittleren Ohrsphäre hat den Bau des inneren Ohres nicht beeinflußt.

de Burlet (Groningen).

Gastauer, Karl: Über die endostale Knochenschicht der menschlichen Labyrinthkapsel. (Univ.-Klin. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankhe, Würzburg.) Arch. Ohr- usw. Heilk. 138, 204—210 (1934).

Verf. stellt an Hand von etwa 40 Serien von vertikalen und horizontalen Knochenschnitten der Labyrinthkapsel Betrachtungen über die Ausbildung der endostalen

bucht an. Während die endostale Schicht regelmäßig die Basalwindung der Schnecke umkleidet, kann sie schon in der Mittelwindung Lücken aufweisen, besonders an den Knochenteilen und Abschnitten, die dem Lig. spirale unmittelbar anliegen. In der Spitzenwindung fehlt sie in ungefähr 40% der Fälle. Mit fast absoluter Sicherheit ermißt man sie in der Spitzenwindung an den Ansatzstellen des Lig. spirale. Im Vestibulum zeigt sich eine „große Verschiedenheit in der Ausdehnung der endostalen Knochenschicht“. Auf der Seite des ovalen Fensters ist sie (mit Ausnahme des Fensters selbst) ziemlich dick vorhanden. Die dem Fenster gegenüberliegende Seite zeigt eine geringere Gesetzmäßigkeit. Bedeutend unübersichtlicher liegen die Verhältnisse bei den Bogengängen. „Von einer Gesetzmäßigkeit im strengen Sinne“ kann nicht gesprochen werden. Die endostale Schicht ist hier meist sehr viel dünner als an den erwähnten Abschnitten. Sie war nur dort nachweisbar, wo die enchondrale Knochenentwicklung von Anfang an nicht entwickelt ist, „nämlich in den beiden vertikalen Bogenknöcheln an den Schenkeln nahe der inneren Pyramidenfläche. Häufig wurde sie an den Anhaftungsstellen der häutigen Bogengänge vermißt. Hinsichtlich der Entwicklung der Endostknochenschicht konnte festgestellt werden, daß ihre bindegewebige Anlage im Feten im allgemeinen kontinuierlich vorhanden ist, ohne daß hieraus Rückschlüsse auf das spätere Verknöcherungs- und Wachstumsverhältnis geschlossen werden können. Bei der langsam einsetzenden Verknöcherung bleiben gerade die Stellen des Endostes gewöhnlich frei von Knochengewebe, die auch späterhin am häufigsten Lücken in der Knochenbildung aufweisen. Es ist sicher, daß ein Teil der Lücken durch mangelnde primäre Ossifikation und nicht durch spätere Resorption entsteht. Die Ursachen für das Vorhandensein und Fehlen der endostalen Knochenlagen haben wir nicht feststellen lassen.“

Barth (Berlin).

Podesta, R., und José L. Monserrat: Die Methode von Del Rio Hortega in ihrer Anwendung auf die normale und pathologische Anatomie des Ohres. (*Serv. de Otorinolaringol., Hosp. de Niños, Buenos Aires.*) Rev. argent. Otol. etc. 2, 621—631 (1933) [spanisch].

Entwicklungsgeschichte.

Sollaud, E.: Le blastopore et la question du „Prostomium“ chez les crustacés. Der Blastoporus und die Frage des Prostomiums bei den Crustaceen.) (*57. sess., Hambéry, 24. VII.—4. VIII. 1933.*) Assoc. Franç. Avancement Sci. 321—327 (1933).

Nach einer kurzen Besprechung der Verschiedenheit des Blastoporusverschlusses bei Protostomiern und Deuterostomiern weist Verf. darauf hin, daß bei den Krebsen von den meisten Autoren (und auch von ihm selbst) von vorn nach hinten fortschreitender Verschluß des Blastoporus und Anlage des Stomodäums weiter vorn beobachtet wurde. Diese Verhältnisse würden besser mit denen der Deuterostomier übereinstimmen als mit denen der Protostomier, doch kommt Verf. jetzt nach genaueren Untersuchungen an Dekapoden zu anderen Resultaten. Bei Palämoniden differenzieren sich zuerst durch rein superfizielle Furchung Mikromeren und Makromeren. Von dem durch letztere gebildeten Feld aus erfolgt die Gastrulation durch Einwanderung von Zellen in die Dottermasse. Beiderseits vom Blastoporusfeld („aire blastoporique“) entwickeln sich nach vorn zu divergierende Zellstreifen, die den Blastoporus umfassen und sich vorn miteinander vereinigen. An dieser Stelle wird das Stomodäum gebildet. Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß kein „Segment der 1. Antenne“ existiert, da diese dem Prostomium angehört, und den Spaltfüßen, deren Entwicklung mit der 2. Antenne beginnt, nicht homolog ist. Die beschriebenen Verhältnisse finden sich schon bei Anneliden (*Saccocirrus*, *Protodrilus*, *Scolecopsis*), bei denen der Blastoporus ebenfalls nicht homolog mit den Parapodien ist.

Wilhelm Kühnelt (Wien).

Fernando, Wilfred: The early embryology of a viviparous psocid. (Die frühe Embryonalentwicklung einer viviparen Psocide.) *Quart. J. microsc. Sci.* **77**, 99—119 (1934).

Archipsocus fernandi erwies sich als günstiges Objekt für embryologische Untersuchungen, da die ♀ eine größere Anzahl von Larven der verschiedensten Entwicklungsstadien enthalten. Dem reifen Ei fehlen Dotter und Chorion. Peripheres und zentrales Plasma sind deutlich unterscheidbar; der Kern ist der Wand genähert. Die bei den ersten Furchungsteilungen gebildeten Kerne wandern teils an die Peripherie, teils bleiben sie in der zentralen Nährmasse liegen (Trophocyten). Sehr bald differenzieren sich am hinteren Ende des Embryos die Urkeimzellen. Die Bildung des Entoderms erfolgt durch Einwanderung von Kernen am vorderen und hinteren Ende. Diese von den Trophocyten und den Urkeimzellen deutlich unterscheidbaren Kerne verteilen sich ziemlich gleichmäßig im Inneren. Hierauf erfolgen lebhaftige Teilungen im ventralen Teil des Blastoderms und es gelangen 2 laterale und ein medialer Zellstreifen zur Ausbildung. Die seitlichen Streifen bilden das künftige Ektoderm, der mittlere das Mesoderm. An der vorderen und hinteren Grenze zwischen Blastoderm und Keimstreifen bilden sich Falten, die den ganzen Embryo überwachsen und sich ventral miteinander verbinden. Die vom Blastoderm gebildete Falte ist die „Serosa“, die vom Keimstreifen stammende, das „Amnion“. Hierauf treten Grenzen zwischen den einzelnen Segmenten auf und jedes Segment bildet seitliche Fortsätze. Das Abdomen ist 10-gliedrig. Am vorderen und hinteren Ende des Embryos entstehen Stomodaeum und Proctodaeum durch Einstülpung. Der Mitteldarm wird vom ventralen Teil des Entoderms gebildet, dessen Zellen sich epithelial anordnen und die noch vorhandene Nährmasse umwachsen. Erst spät tritt der fertige Mitteldarm mit Stomodaeum und Proctodaeum in Verbindung. Die Ernährung des Embryos erfolgt durch die Wand des Eischlauches unter Vermittlung des am Vorder- und Hinterende besonders differenzierten extraembryonalen Ektoderms (Serosa). Durch Zerreißen der Hüllen wird der Embryo frei und wandert in den Ovidukt abwärts. Zu dieser Zeit erscheint das „Dorsalorgan“, das sich direkt oberhalb des Stomodaeums bildet. Es zeigt netzartige Struktur und stark färbbaren Inhalt. Es ordnen sich nun Ektodermzellen ringsherum an und nehmen die stark färbbaren Granula in sich auf. Jetzt steht das „Dorsalorgan“ mit dem Lumen des Oviduktes in Verbindung. Später umwächst das Mitteldarmepithel das ganze Organ und nimmt es in sich auf. (Es scheint sich hier um die Einwanderung von Symbionten zu handeln, wovon aber Verf. nichts erwähnt. Ref.)

Wilhelm Kühnelt (Wien).

Lepeschinskaja, O. B.: „Die Entstehung der Flüssigkeit in der Blastocoele aus den Eigelbkörnern“ (bei *Acipenser stellatus*). *Arch. Anat.* **13**, 110—114 u. franz. Text 264—268 (1934) [Russisch].

Verf. fixierte während der Furchungsstadien Eier des Störs (*Acipenser stellatus*) in Kalium bichromat-Formalin-Eisessig und studierte insbesondere die Isolierung der Dotterkugeln aus dem Dotter. In der zunächst nicht unterteilten Dottermasse erscheinen kleine, besonders färbbare Granula. Diese ordnen sich an der Oberfläche kugelförmiger Bezirke an und verbinden sich zu einer homogenen Membran. Diese verflüssigt sich und wird damit zu der das Blastocoel füllenden Flüssigkeit. Mit der Verflüssigung gelangen gleichzeitig die frei gewordenen Dotterkugeln in das Blastocoel und können hier vom Ektoderm und Endoderm aufgenommen werden. Gräper.

Jolly, J., et M. Férester: Sur la formation de l'exo-cœlome dans l'œuf du rat (Über die Bildung des Exocöloms im Ei der Ratte.) (*Laborat. d'Histophysiol., Coll. de France, Paris.*) *C. r. Soc. Biol. Paris* **116**, 400—403 (1934).

Im Ei der Ratte wird am Ende des 9. Tages die primitive Ektodermhöhle durch einen ringförmigen Wulst in 2 Teilen, Ektoplacentarraum und Amnionhöhle, zerlegt. Die Bildung dieses Ringwulstes geht einher mit dem Auftreten von Spalträumen im distalen Mesoderm, welche zum Exocölom zusammenfließen. Dieses trennt die beiden Ektodermhöhlen voneinander; dieselben hängen anfänglich noch zusammen durch einen ausgezogenen Stiel (Amnionligament), welcher später zerreißt. Das embryonale

dom bildet sich selbständig, ebenfalls durch Zusammenfließen von Spalträumen; daher verbindet es sich mit dem Exocoelom. Die Coelombildung wird bedingt durch die reichliche Flüssigkeitsaufnahme aus dem mütterlichen Blut. *Chr. P. Raven.*

Snessarew, Paul: Über die embryonale Entwicklung der äußeren Bedeckung des Hühnerkörpers mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der interstitiellen Bindegewebsfasern. (*Abt. f. Physiol. u. Path. d. Sinnesorgane, Inst. f. Exp. Med. d. UdSSR., Moskau.*) *Z. Anat.* **103**, 472—497 (1934).

Verf. hat bei Hühnerembryonen verschiedener Entwicklungsstadien die Entwicklung des mesodermalen Anteils der Haut mit der Silberimprägnationsmethode und vergleichsweise mit anderen Bindegewebsfärbungen untersucht. Er lehnt eine Unterscheidung von Endo- und Exoplasma ab und faßt das ganze feine die Zellen verbindende Protoplasmanetz als protoplasmatisches Mesostroma zusammen. Lange bevor man mit den üblichen Bindegewebsfärbungen Fasern nachweisen kann, läßt sich in diesem Mesostroma ein System von argyrophilen Fasern nachweisen. Diese bilden eine lamellär netzartige Schicht, und zwar entsteht in früheren Stadien zunächst eine fektodermale faserige Membran. Die oberste Schicht wird Stratum superficiale genannt, in dem sich die Fasern senkrecht kreuzen. Darunter wird das Mesenchym lamellär netzförmig und die Lamellen lösen sich allmählich zu lockerem Bindegewebe auf. Verf. sieht die Entwicklung der argyrophilen Fasern als einen reaktiven Vorgang an. Es lassen sich weder bestimmte Gesetzmäßigkeiten zwischen Faser- und Zellzahl noch für die Lagerung der Fasern zu den Zellen bestimmen. Die argyrophilen Fasern können sich unmittelbar in kollagene umwandeln, außerdem kommt aber die unmittelbare Bildung kollagener und elastischer Fasern vor. *Gräper (Jena).*

Webster, W. D.: The development of the thymus bodies in *Necturus maculosus*. Die Entwicklung der Thymuskörper bei *Necturus maculosus*. (*Dep. of Zool. a. Anat., Univ. of Nebraska, Lincoln.*) *J. of Morph.* **56**, 295—323 (1934).

Bei *Necturus maculosus* zeigt sich die Primordialanlage der Thymus erst, wenn die Embryonen eine Länge von 7 mm erreicht haben. Jede dieser epithelialen Strukturen nimmt ihren Ursprung vom Entoderm in der hinteren dorsalen Portion der ersten Kiementaschen. Die 5. rudimentär bleibende Kiementasche bildet kein Thymussegment. Mit Ausnahme der ersten verlieren die Primordialanlagen ihren Zusammenhang mit den Kiementaschen bei Embryonen von 16 mm L. und liegen dann frei im Mesenchym. Das 1. Thymussegment zeigt in diesem Stadium bereits Degenerationserscheinungen und verschwindet schließlich ganz (30 mm L.). Das 2. und 3. Segment wachsen weiter und beginnen bei 32—34 mm L. Hassalsche Körperchen (Cysten) zu bilden, die eine schwach färbbare Sekretion erkennen lassen. Das 4. Segment wächst langsamer und beginnt erst viel später mit der Ausbildung Hassalscher Körperchen. Bei Embryonen von 79 mm L. liegen die 3 Thymussegmente dicht beieinander in der dicken Muskulatur vor den Kiemen und bilden die definitive Thymusdrüse des erwachsenen Tieres. Sie ist mit einer Bindegewebslage umgeben, von welcher aus reichlich Capillaren in das Innere der Drüse eindringen. *Hartmann (München).*

Larsell, O.: Morphogenesis and evolution of the cerebellum. (Morphogenese und Entwicklung des Kleinhirns.) (*Anat. Laborat., Univ. of Oregon Med. School, Portland.*) *Arch. of Neur.* **31**, 373—395 (1934).

Zusammenfassende Übersicht, zum Teil auf Grund der früher publizierten Untersuchungen des Verf., über die Entwicklung des Kleinhirns der Wirbeltiere mit Ausnahme der Fische und der Vögel. Die Faserverbindungen des Kleinhirns der Amphibien und die Entwicklung des Kleinhirns werden an Hand von Befunden am Axolotl, Molch und Frosch, die in der Hauptsache schon früher publiziert worden sind, dargestellt. Das Kleinhirn der Reptilien, die je nach ihrer Fortbewegung verschieden hohe Ansprüche an ihren Gleichgewichtssinn stellen, zeigt eine sehr verschieden hohe Entwicklung. Da die Seitenlinienorgane und ihre Nerven fehlen, erhält der den Aurikeln der Amphibien entsprechende Flocculus nur Vestibularisfasern. Die bei einer fuß-

losen Eidechse (*Anniella*) und beim Alligator erhobenen Befunde werden eingehender dargestellt. Sie werden mit den Ergebnissen eigener Untersuchungen und der verschiedener Autoren an Säugetieren verglichen. Im besonderen werden Embryonen und erwachsene Tiere von *Scapanus*, *Myotis* und *Didelphys* untersucht. Die Kleinhirnerne und ihre Faserverbindungen werden vergleichend untersucht. Bei den Amphibien existiert nur eine einheitliche Zellmasse, die mit dem Tegmentum verbunden ist. Bei den Reptilien finden sich zwei Kerne, bei den niederen Säugern drei und bei den höheren vier Kerne.

Ernst Scharrer (Frankfurt a. M.).

McRoberts, Donald D.: A study of the development of the cochlea and cochlearia in the fetal albino rat. (Eine Studie über die Entwicklung der Schnecke und der Schneckenerven beim Fetus der Albinoratte.) (*Zoöl. Laborat., Univ. of Wichita, Wichita.*) *J. of Morph.* 56, 243—265 (1934).

Eine beschreibende Arbeit, die zahlreiche Einzelheiten (Maße usw.) bringt, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Beschrieben wird die Schnecke des erwachsenen Tieres, des neugeborenen und die Entwicklung beim Fetus. Als wichtigste Ergebnisse der letzteren seien angeführt: Die Schnecke weist $2\frac{1}{2}$ Windungen auf, welche am 20. Entwicklungstag erreicht werden. Das wichtigste Gebilde ist der Ductus cochlearis, welcher am 19. Tag seine Windungszahl erreicht, worauf Skalen, Cortischer Tunnel, Haarzellen und Membrana tectoria aufscheinen, und zwar gleichzeitig. Zu dieser Zeit wird auch die Schnecke knorpelig, der Modiolus zeigt rasches Wachstum.

L. Hofmann (Wien).

Wood-Jones, Frederic, and Wen I-Chuan: The development of the external ear (Die Entwicklung des äußeren Ohres.) (*Dep. of Anat., Peiping Union. Med. Coll. Peiping.*) *J. of Anat.* 68, 525—533 (1934).

Nach der klassischen Darstellung von His geht die Ohrmuschel aus 6 embryonalen Höckern hervor, von denen je 3 dem vorderen und hinteren Rande der 1. Kiemenfurche angehören. Nach Untersuchung der Verff. an 400 chinesischen Feten entsteht die Ohrmuschel als solche ausschließlich aus dem hinteren (hyoiden) Rande, der keine getrennten Auricularhöcker erkennen läßt, während der vordere (mandibuläre) Rand nur noch im Tragus und der vorderen Gehörgangswand erhalten ist. Die nach klinischen Erfahrungen (im Gegensatz zu heutigen Auffassungen in der anatomischen Literatur) getrennte Innervation von Tragus und Ohrmuschel spricht ebenfalls für eine verschiedene Herkunft beider Teile bzw. für eine einheitliche Entstehung der ganzen Helix. In Übereinstimmung damit kann in typischen Fällen von Agnathia die Ohrmuschel größtenteils gut entwickelt sein, während der Tragus, der ja dem Kieferbogen entstammt, fehlt. Die schon von Stannus geäußerte Ansicht, daß die präauriculären Fisteln Reste der ersten Kiemenfurche sind, wird erst durch die neue Auffassung begreiflich. Denn die Fisteln (die bei Chinesen ziemlich häufig vorkommen) sitzen mit Vorliebe in einer Linie, die vor dem Crus helicis vom äußeren Gehörgang schräg zur Schläfe verläuft. Da der Sitz der präauriculären Anhänge ganz auffällig damit übereinstimmt, dürften beide Mißbildungen auf der gleichen entwicklungsge-schichtlichen Grundlage entstehen.

Cl. F. Werner (Hamburg).

Systemlehre, Floristik, Faunistik, Paleobiologie.

Sävulescu, Tr.: Une nouvelle espèce du genre *Paranthostomella* et considérations systématiques sur les *Sphaeriales pseudostromatae*. (Eine neue Art der Gattung *Paranthostomella* und systematische Betrachtungen über die *Sphaeriales pseudostromatae*.) *Arch. roum. Path. expér.* 7, 7—32 (1934).

Verf. beschreibt eine neue *Paranthostomella*, *P. Cantacuzinoi* und ihre zu *Microdiplodia* gehörige Pyknidenform. Auf eine frühere Beschreibung der Gattung unter dem Namen *Myriocarpa* durch Fückel wird hingewiesen. — Die Entwicklung der *Sphaeriales* geht (anschließend an die *Perisporiales*) von Formen mit Oberflächenperithezien aus und führt zu fortschreitender Einsenkung in das Substrat, Ausbildung eines *Pseudostromas* (*Clypeus*) und schließlich eines echten *Stromas*. Verf. unterscheidet drei Typen des *Pseudostromas*: 1. Scheibentyp, 2. Deckeltyp (mit eingeschlagenen Rändern), 3. Hohlkugeltyp, die Perithezien ganz umschließend. Die drei Formen stellen eine fortschreitende Entwicklung dar. Die Entwicklung von den *Astromatae* über die drei Stufen der *Pseudostromatae* zu den *Eustromatae* vollzieht sich

zwei, durch den Aufbau des Perithecienkernes unterschiedenen Linien, den Gnomoniaceen im Sinne v. Höhnels (Diaporthe-Typ) und den Clypeosphaeriaceen im Sinne des Verf. (etwa dem Sphaeriaceen-Typ v. Höhnels entsprechend). Innerhalb dieser Linien findet eine weitere Aufspaltung durch das Fortschreiten von Ein- zu Vielzelligkeit der Sporen, von Licht- zu Vielsporigkeit des Ascus, das Auftreten von Paraphysen statt. Auf Einzelheiten der interessanten Aussprache, die durch Zeichnungen und ein Schema der Genealogie vervollständigt wird, kann hier nicht eingegangen werden.

Mückel (Hamburg).

Zeller, S. M.: Some new or noteworthy fungi on Ericaceous hosts in the Pacific Northwest. *Mycologia* (N. Y.) 26, 291—304 (1934).

Petri, L.: Alcune considerazioni sopra i generi „Deuterophoma“ e „Blastophoma“. *Phytopath. Z.* 7, 117—119 (1934).

Seaver, Fred J.: Photographs and descriptions of Cup-fungi. XXI. The genus *Alycina*. *Mycologia* (N. Y.) 26, 344—347 (1934).

Snell, Walter H.: Notes on boletes. III. *Mycologia* (N. Y.) 26, 348—359 (1934).

Unamuno, Luis M.: Mykologische Notizen. VII. Interessante Bemerkungen zur spanischen mykologischen Flora. *Bol. Soc. españ. Histor. natur.* 34, 133—146 (1934) [Spanisch].

Tobisch, Julius: Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora von Kärnten. *Österr. bot. Z.* 83, 109—150 (1934).

Brown, Herbert H.: A study of a tectibranch gasteropod mollusc, *Philine aperta* (L.). Untersuchung eines tectibranchiaten Gastropoden, *Philine aperta* [L.] (*Dep. of Zool., Univ., Glasgow.*) *Trans. Roy. Soc. Edinburgh* 58, 179—210 (1934).

Monographie der Schnecke *Philine aperta* auf Grund der Untersuchung von Material aus Loch Sween (Argyll). Der Verf. schildert der Reihe nach das Vorkommen der Schnecke in bestimmten Biotopen, ihre Bewegung und Atmung. Daran schließt sich eine ausführliche anatomische Beschreibung (Mantel, Verdauungskanal, Muskulatur, Nervensystem, Cölom, Geschlechtsorgane, Hämocöl, Gefäßsystem), die Darstellung des Nahrungserwerbs, der Paarung und Eiablage sowie der Embryologie.

F. Pax (Breslau).

Pilsbry, Henry A.: Notes on the anatomy of *Oreohelix*. III. With descriptions of new species and subspecies. (Beiträge zur Anatomie von *Oreohelix*. III. Beschreibung neuer Arten und Unterarten.) *Proc. Acad. natur. Sci. Philad.* 85, 383—410 (1934).

Verf. gibt die Anatomie des Genitalapparates einiger bisher nur conchologisch bekannter *Oreohelix*. Neu beschrieben werden: *O. strigosa goniogyra* n. subsp., *O. s. delicata* n. subsp., *O. amariradix* n. sp., *O. junii* n. sp. Die in überaus reicher Formenfülle von Mexiko bis Kanada verbreitete Gattung zerfällt nach der verschiedenen Länge von Epiphallus und Penis sowie der verschiedenen Zahl der Embryonalwindungen bei der Geburt in zwei Untergattungen: *Oreohelix* s. s. und *Radiocentrum*. *Oreohelix* s. s. läßt sich nach dem verschiedenen Bau des Penis in drei Gruppen zerlegen: die Gruppe der *O. strigosa*, *O. subundis* und *O. yavapai*. Es folgt eine Liste aller bisher bekannter rezenter und pleistocäner Arten (33) und Unterarten (44) der Gattung *Oreohelix* mit genauen Verbreitungsangaben.

Otto Linke (Wilhelmshaven).

● Coen, Giorgio: Saggio di una Sylloge molluscorum adriaticorum. (Consiglio nazionale di ricercae R. Comitato Talassogr. Ital. Mem. 192.) (Versuch einer Zusammenfassung der adriatischen Mollusken.) Venezia: Carlo Ferrari 1933. VII, 186 S. u. 94 Abb. L. 46.—.

Ein Katalog einiger Sammlungen von Mollusken (und Brachiopoden!) in Tabellenform mit Abbildungen hauptsächlich sog. neuer Arten und Varietäten. Zoogeographisch wird nur die adriatische West- und Ostküste unterschieden, und die Literaturnachweise sind ungenügend.

Ad. Steuer (z. Z. Rovigno d'Istria).

Barrois, Jules: Le développement échinodermien dans ses rapports avec la genèse des vertébrés. (Die Entwicklung der Echinodermen in ihren Zusammenhängen mit der Wirbeltiergenese.) *Ann. des Sci. natur. Zool.* 17, 333—345 (1934).

Verf. sucht seine in einer Arbeit von 1927 aufgestellte Hypothese zu begründen, wonach Echinodermen und Wirbeltiere eine gemeinsame Stammform haben. Er gibt dabei zu, daß ein von ihm konstruierter primitiver Larventypus, der sich am ehesten

mit dem sog. *Pluteus bimaculatus* der Ophiuriden vergleichen ließe, in der Echinodermenentwicklung nirgends verwirklicht ist. Durch theoretische Ausfüllung der Lücken kommt er aber zu der Auffassung, daß die Echinodermen sich von jener bilateral-symmetrischen, gemeinsamen Stammform ableiten lassen und sekundär radiär-symmetrisch geworden sind. Typische Ascidiichencharaktere, die jener Primitivtypus aufwies, sind überlagert von Echinodermencharakteren, und in dem Maß, in dem letztere verschwinden (*Néoradiés*), treten erstere auf. In gleicher Weise wird an Hand von schematischen Bildern die Auffassung begründet, daß die geschwänzte Larve der Tunicaten ein einfacher, in die Länge gestreckter *Pluteus* ist, „*déroulé en V* droit“. Die Tunicaten werden als Ausgangsformen der Wirbeltiere hingestellt, die also auf dem Wege über jene gemeinsame Stammform auch mit den Echinodermen verwandt wären. (Vgl. diese Ber. 7, 284.)

Köhler (Zürich).

Vergleichende Physiologie. Stoffwechsel.

Ernährung. (*Stoffaufnahme, Assimilation.*)

Pourbaix, Nelly: *Mécanisme de la nutrition chez les Spongillidae.* (Mechanismus der Ernährung der Spongilliden.) (*Laborat. de Biol. Anim., Fac. des Sciences, Bruxelles.* 57. sess., *Chambéry*, 24. VII.—4. VIII. 1933.) Assoc. Franç. Avancement Sci. 348 bis 321 (1933).

Durch Züchtung von kleinen Spongilliden (*Ephydatia* und *Spongilla*) aus Gemmulas im Thermostaten auf einem Objektträger nach der Methode von Brien und durch Beobachtung der kleinen Schwämme unter dem Mikroskop konnte die Verf. die Aufnahme von kleinen Carmin- und Tuschebröckchen im Inneren des Schwammes genau verfolgen. Die Bröckchen wurden an der Außenseite des Kragens niedergeschlagen — niemals innen —, gelangten ins Innere der Zellen und von hier wurden sie durch Amöbocyten aufgenommen und dann von Archäocyte zu Archäocyte weitergegeben, bis sie ausgeschieden wurden, was Verf. auch experimentell und auf Schnitten nachweisen konnte. Für Einzelheiten dieses Vorganges sei auf die Schrift selbst verwiesen. Verf. glaubt, daß daher auch die Ernährung bzw. die Verdauung durch die Archäocyten erfolgt. (Es erscheint indessen nachzuprüfen zu sein, ob dies vielleicht nicht doch nur bei unverdaulichen Stoffen, wie sie Carmin und Tuschekörnerchen ja darstellen, der Fall ist, während die verdaulichen durch die Kragengeißelzellen resorbiert werden. Ref.)

Thiel (Hamburg).

Dennell, Ralph: *The feeding mechanism of the cumacean crustacean Diastylis bradyi.* (Der Nahrungserwerbsmechanismus des Cumaceen-Krebsses *Diastylis bradyi*.) (*Dep. of Zool., Univ., Manchester.*) Trans. Roy. Soc. Edinburgh 58, 125—142 (1934).

Im 1. Teile bringt der Verf. eine eingehende Beschreibung des Panzers und der Mundgliedmaßen (inkl. des 1. bis 3. Maxillipeden), wobei ihre Beteiligung an der Erzeugung des Respirations- und Filtrationsstromes besondere Beachtung findet. Im allgemeinen zeigen die Mundgliedmaßen von *Diastylis* den typischen Bau wie bei den filtrierenden Malakostraken, doch ist als besonders eigenartig hervorzuheben das Vorhandensein eines medianen Fortsatzes an der Bauchseite, der zwischen den Basen der 1. Maxillipeden inseriert ist, sich zwischen den Maxillen und den 1. Maxillipeden nach vorne erstreckt und die Ventralwand des Filtrerraumes bildet. Die 2. Maxillen besitzen keinen Endopoditen und nur einen kleinen Exiten und sind unfähig, eine Filterströmung wie bei *Hemimysis* und *Gnathopausia* zu erregen. Die beiden Kiemerkammern werden vom Panzer und dem mächtigen Epipoditen des 1. Maxillipeden begrenzt. Ein starker Respirationsstrom tritt zwischen den Mundgliedmaßen ein und verläßt die Kiemerkammern durch den rostralen Siphon. Die Rostralklappe und der Randsaum des Epipoditen dienen als Klappenventile. Die Rostralklappe wird

durch Wasserdruck geöffnet und schließt sich durch eigene Elastizität. Innerhalb des medianen Filterraumes erzeugen die Maxillen und Maxillipeden eine Filtrationsströmung, die sekundär durch den Respirationsstrom unterstützt wird. Diese Unterstützung des Filtrationsstromes durch den Respirationsstrom ist bei *Diastylis* größer als bei *Gnathophausia*, und die Pumpfähigkeit von Maxillen und Maxillipeden verhältnismäßig gering. Aufnahme großer Nahrungspartikel wurde nicht beobachtet; aus der Form der Mundgliedmaßen ist zu schließen, daß eine solche auch nicht vorkommt. Sowohl der Filter als auch der Respirationsstrom müssen die mit Filterborsten ausgestatteten Mundteile passieren, wobei die eingeführten Partikelchen auf ihnen abgelagert werden. Die Filterborsten der 2. Maxillen werden eingehend beschrieben. Die Nahrungspartikelchen sammeln sich an der unteren Fläche der Filterplatte und werden durch die Borsten der Enditen der 1. Maxillipeden flott gemacht und in der Nahrungsrinne vorwärts befördert, um endlich durch die proximalen Enditen der 1. Maxillen den Mandibeln übergeben zu werden. Die ursprünglichsten Cumaceen besaßen aller Wahrscheinlichkeit nach große Ähnlichkeit mit den Mysideen *Gnathophausia* und *Lophogaster*. Der Verf. stellt weitere Untersuchungen in Aussicht, die seine Anschauung bekräftigen sollen, daß sowohl die Cumaceen als auch die Tanaidaceen von primitiven mysidenähnlichen Vorfahren sich entwickelt haben.

O. Storch (Graz).

Hill, RoHa B.: Feeding habits of some Venezuelan Anopheles. (Sauggewohnheiten einiger Anophelen aus Venezuela.) *Amer. J. trop. Med.* **14**, 425—429 (1934).

Bei 8 *Anopheles*-arten wurde die Herkunft des gesogenen Blutes mit der Präcipitinmethode ermittelt. Die meisten Blutproben stammten von *A. albimanus*. Diese Mücke saugt gern am Menschen und ist deshalb wohl als wichtigster Malariaüberträger anzusehen. Ebenfalls gefährlich ist *A. bachmanni*.

Fr. Weyer (Hamburg).

Galzowa, R.: Aktive Reaktion des Darmsekrets bei *Bombyx mori* L. *Zool. Ž.* **13**, 186—193 u. dtsch. Zusammenfassung 193—194 (1934) [Russisch].

Zur Untersuchung dienen 3 Rassen. Vom Ende des 2. Stadiums bis zur Verpuppung werden täglich p_H -Messungen des Darminhaltes gemacht (Elektrometrisch mit einer Wasserstoffelektrode). Bei gesunden Tieren, die auf Maulbeere gezogen werden, schwankt der p_H -Wert nur unbedeutend, er liegt zwischen 9,9—10,0 und steigt nur während der Häutung auf 9,9—10,1. Bei Tieren, die mit Schwarzwurzel gefüttert werden, liegt der p_H -Wert dauernd etwas tiefer und fällt im 4. Stadium auf 9,35, gleichzeitig treten starke Verdauungsstörungen auf; im 5. Stadium gehen alle Tiere an Gelbsucht zugrunde. Schwarzwurzel (p_H 5,8—6,0) ist viel saurer als Maulbeere (p_H 6,6—6,7). Bei Erkrankung an Flacherie fällt der p_H -Wert des Darmsaftes von 9,9 auf 7,5 und tiefer in Abhängigkeit vom Grade der Erkrankung, bei Pébrine oder Bakteriose ändert er sich nicht.

M. v. Dehn (München).

Bardino, A. M.: Tentativi di esplorazione, sull'intestino isolato di bachi da seta, delle proprietà di permeabilità intestinale. (Versuche zur Erklärung der Permeabilität des isolierten Darmes der Seidenraupen.) *Boll. Zool.* **5**, 145—147 (1934).

Im wesentlichen negativ verlaufene Vorversuche zur Auffindung eines physiologischen Mediums für isolierte Därme der Seidenraupen, an denen die Durchlässigkeit untersucht werden sollte. Geprüft wurden Ringersche Lösung und Mischungen von dieser mit verschiedenen NaCl-Lösungen. Resultat war unbefriedigend. Da die Hämolymphe sauer sein soll, wurden auch Zusätze von Oxalsäure und HCl geprüft. Auch schon kleine Zusätze töten die Gewebe sofort. Reaktionen auf Aminosäuren sollen entscheiden, ob diese aus dem Darm austreten.

J. Speck (Heidelberg).

Mansour, K., and J. J. Mansour-Bek: The digestion of wood by insects and the supposed rôle of micro-organisms. (Die Verdauung des Holzes durch Insekten und die nutzbare Rolle der Mikroorganismen.) (*Dep. of Zool., Egypt. Univ., Abbassiah, Cairo.*) *Biol. Rev. Cambridge philos. Soc.* **9**, 363—382 (1934).

Die Abhandlung stellt eine eingehende und übersichtliche Besprechung der bisher vorliegenden Arbeiten über die Ernährungsphysiologie der holzfressenden Insekten dar. Verff. kommen dabei vor allem zu folgenden Schlüssen: Die Bedeutung der

intracellulären Mikroorganismen für ihre Wirte ist noch ungeklärt. Die Vergesellschaftung soll nicht als Symbiose zu deuten sein, weil (? Ref.) einige Verwandte von Symbiontenträgern „sterile Mycetome“ besitzen, und weil Sterilisierung von Mikroorganismen beherbergenden Arten ohne Schaden für den Wirt durchgeführt werden konnten. Für die Holzverdauung sind die Mikroorganismen bedeutungslos, weil sie bei holzfressenden Käfern erst dann in den Darmkanal gelangen, wenn das fertige Insektenkeine Holznahrung mehr aufnimmt, weil 2. nahe verwandte holzfressende Insektenarten sowohl Mikroorganismen beherbergen wie auch steril sein können, und weil 3. intracelluläre Mikroorganismen von Holzfressern *in vitro* keine Cellulose aufzulösen vermögen. Die extracelluläre Darmflora dagegen dient bei verschiedenen Lamellicornierlarven und einigen Termiten als unmittelbare Nahrungsquelle. Der relativ hohe Gehalt des Holzes an verschiedenartigen stickstoffhaltigen Substanzen spricht von vornherein gegen eine Bedeutung der Mikroorganismen für die Bindung freien Stickstoffes. Auch die Kohlehydrate werden wahrscheinlich durch eigene Fermente der Holznahrung entnommen, wobei der Fermentkomplex bei den einzelnen Arten entsprechend der Verschiedenartigkeit der Zusammensetzung des Holzes sehr unterschiedlich ist. Einigen Holzfressern fehlen Cellulasen; diese Formen verwerten von den Kohlehydraten des Holzes nur Stärke und Zucker. Hemicellulasen scheinen bei den Holzfressern nicht sehr verbreitet zu sein. Die Ergebnisse der experimentellen Symbioseforschung aus der Buchner-Schule, nach denen sowohl bei Cerealienfressern wie Blutsaugern der Sinn der Vergesellschaftung mit Mikroorganismen nicht im Aufschluß der Nahrung, sondern in einer Lieferung von Zusatzstoffen liegt, die wahrscheinlich vitaminähnlicher Natur sind, werden leider in bezug auf die Holzfresser von den Verf. nicht erörtert. Es ist aber gerade nach den neueren Untersuchungen nicht recht einzusehen, warum die regelmäßige und besonders „organisierte“ Vergesellschaftung vieler Holzfresser mit Mikroorganismen nur darum nicht als Symbiose gedeutet werden soll, weil die Mikroorganismen keine Verdauungsfermente liefern bzw. weil es Holzfresser ohne Mikroorganismen gibt.

E. Ries (Leipzig).

Hendee, Esther C.: The rôle of fungi in the diet of termites. (Die Rolle der Pilze in der Nahrung der Termiten.) Science (N. Y.) 1934 II, 316.

Fütterungsversuche an *Zootermopsis angusticollis* mit pilzfreiem und pilzhaltigem Holz zeigten, daß die Pilze eine wichtige positive Rolle in der Nahrung der Termiten spielen. Die Ausfallserscheinungen bei pilzfreier Diät liegen in vermindertem Wachstum (Gewichts- und Stickstoffbestimmung), Entwicklungshemmung, mangelnder Beweglichkeit und erhöhter Sterblichkeit. Ob dabei die Pilze direkt als Nahrungsbestandteil infolge eines besonderen Vitamingehaltes diese Wirkung auslösen oder durch enzymatische Wirkung das Holz „bekömmlicher“ machen, läßt sich noch nicht entscheiden.

Fr. Weyer (Hamburg).

Fetisoff, A. S.: Materialien für die Ernährung von Birkhähnen in dem süd-östlichen Baikalsee-Gebiet. Zool. Ž. 13, 369—396 u. engl. Zusammenfassung 397 (1934) [Russisch].

Untersucht wurden 1200 Kröpfe und Mägen von Birkhühnern, die 1927—1932 gesammelt wurden. Die Nester finden sich in bewegtem Gelände, vorgezogen werden Hänge mit Porst (Ledum palustre) und buschigem Fingerkraut (*Potentilla fruticosa*). Die Jungen ernähren sich anfangs fast ausschließlich (zu 95%) von tierischer Nahrung mit geringem Zusatz von vorjährigen Samen und jungen Blättern. Es überwiegen Schmetterlingsraupen und Ameisen. Je älter sie werden, desto verschiedenartiger wird die Ernährung. Im Alter von 1 Monat legen sie im Laufe des Tages oft eine Strecke von über 100 m zurück. Sind in der Nähe des Nistplatzes Beeren vorhanden, so dienen dieselben bald als Nahrung, fehlen sie, so bleibt es zunächst bei der tierischen Ernährung. Ausführliche Angaben über die in Kröpfen und Mägen gefundenen Tier- und Pflanzenreste und über das Verhältnis der einzelnen Bestandteile zueinander. Im ersten Monat bleibt die tierische Nahrung vorherrschend (über 70%), dann ändert sich das Bild. Ende Juli bis September findet sich vorherrschend Beerenernährung, außerdem verschiedene Pflanzenteile (Blätter, Blüten) und in geringen Mengen tierische Nahrung, verschiedentlich auch Heuschrecken, Schmetterlinge usw. Die Pflanzenkost macht über 85% aus. Die Lage und Größe der Ernährungsfläche ist für die Mannigfaltigkeit der Ernährung von

edeutung. Im bewegten Relief ist die Fläche kleiner, bietet aber verschiedenartigere Ernährung und die am Tage zurückgelegte Strecke ist kleiner. Die Bewegung erfolgt meist nach dem Reifwerden der Beeren zunächst in Gebiete mit Erdbeeren, dann Heidelbeeren, Preiselbeeren usw. Fehlen Beeren, so werden größere Wanderungen unternommen oder andere Pflanzenteile genossen, wie Blüten und Blätter von *Trifolium lupinaster*, *Hieracium umbellatum*. Zur Zeit der Ernte halten sich die Birkhühner fast dauernd in Nähe der Felder auf. Erwachsene Birkhähne ernähren sich in der Zeit von Anfang Juni bis Ende September von Beeren, Blättern, Blüten und Samen zu über 90% und nur in geringem Maße von tierischer Kost (Ameisen, Geradflügler u. a.). In der zweiten Hälfte Juni erfolgt die Mauser. Die Hähne machen sich in dieser Zeit wenig Bewegung, halten sich in dichter Vegetation auf, ernähren sich entsprechend mehr von Pflanzenteilen. Im Herbst (Ende September bis Anfang November) ernähren sich die Birkhühner hauptsächlich von Getreidekörnern (über 95% Pflanzenkost), im Winter (November bis März/April) vornehmlich von Zweigen und Knospen der Birke. Tierische Reste finden sich keine. Sobald der Schnee schwindet, finden sich wieder frühjährige Beeren und Samen, junge Pflanzenteile und wieder einige Insekten, vor allem Ameisen (jedoch weniger als 5%). Solange die Nahrung vornehmlich aus Beeren besteht, ist die Zahl der Magensteine gering, sie fehlen oft bei ganz weicher Pflanzennahrung, treten in zahlreichsten bei Körnerernährung auf. Es finden sich auch Reste von für Säugetiere giftigen Pflanzen.

v. Knorre (Riga).

Allard, H. A.: How some birds satisfy thirst. (Wie einige Vögel ihren Durst stillen.) U. S. Dep. of Agricult., Washington.) Science (N. Y.) 1934 II, 116—117.

Veranlaßt durch Gordon, der eine Wasseraufnahme zum mindesten bei Nestungen für unwahrscheinlich hält (vgl. diese Ber. 29, 592), macht Verf. auf verschiedene Feststellungen über das Verhalten einiger Vogelarten zur Trinkwasserfrage aufmerksam. Wüstenvögel scheinen in weitgehendem Maße Wasser entbehren zu können. Dies versichern jedenfalls Ticehurst und Cheesman von der Wüstenlerche *Laemon alaudipes cinerea* (Zar.). Von *Pterocles* hingegen berichtet Waldo, wie das Männchen durch Benetzen des Gefieders den Jungen Wasser zuträgt, das diese dann von den nassen Federn abnehmen. Allen beobachtete bei nordischen Vögeln, wie diese Schnee fraßen und Schneeflocken aus der Luft fingen. Letzteres hat Verf. ebenfalls bei Staren feststellen können, wobei er dahingestellt läßt, ob es sich um eine Befriedigung des Wasserbedürfnisses oder um eingebildeten Insektenfang gehandelt hat. Das Aufpicken von Schnee dient jedoch sicher nur der Wasseraufnahme. W. Banzhaf.

Danby, Marguerite: Über Fettresorption und Historetikulärsystem im Dünndarm. (Histol. Laborat., Univ. Amsterdam.) Z. mikrosk.-anat. Forsch. 36, 23—40 (1934).

Verf. sucht das alte Problem erneut morphologisch zu klären, ob das Fett bei der Resorption durch den Darm nur intercellulär durch das Zottengewebe geht oder ob noch die Möglichkeit besteht, daß eine intracelluläre Aufnahme stattfindet. Gefragt wird weiter nach der Rolle der Leukocyten bei der Fettaufnahme. Als Versuchstiere orientierten Meerschweinchen, daneben weiße Mäuse und Kaninchen. Die Fettfütterung erfolgte mit Butter, in verschiedener Weise mit Hungerperioden oder normaler Fütterung kombiniert. Mikrotechnisch kamen die üblichen histologischen Färbemethoden in Anwendung. Genau beschrieben werden die Zustände im Dünndarm bei gewöhnlicher Fütterung, bei Hunger, das Bild nach Fettfütterung, auch kombiniert mit Trypanblaufärbung. Nach 24 Stunden Nahrungsenthaltung ist weder im Epithel noch im Stroma Fett nachweisbar. Sonst sieht man sowohl inter- als auch intracelluläre Fettresorption. Die intracelluläre Aufnahme erfolgt sowohl durch Zottenstroma wie durch Makrophagen. Im Zottenstroma spielen sich sicher wichtige Stoffwechselvorgänge ab, ähnliches gilt für das Reticulum der Lymphknoten. Die fettspeichernden Makrophagen nehmen auch das Trypanblau auf und beteiligen sich in wichtiger Weise an der Resorption. Verbindungen zwischen Chylusgefäßen und Reticulum werden angenommen.

Krauspe (Berlin).

Stoffwanderung. (Wasserhaushalt der Pflanzen, Lymph- und Blutkreislauf der Tiere.)

McLean, R. C.: Transpiration current in horsetails. (Transpirationsstrom in Schachtelhalmen.) Nature (Lond.) 1934 II, 66.

Verf. stützt die Annahme, daß bei Schachtelhalmen der aufsteigende Wasserstrom

auch durch das System der verschiedenen Höhlen hindurchgeht. Sie sollen in den fertilen Sprossen von *E. maximum* und *E. hiemale* mit Wasser gefüllt sein, das unter Druck steht. Verf. beobachtete auch, daß die Höhlen von den umliegenden Zellen aus wieder mit Flüssigkeit gefüllt werden können, wenn sie sich vorher durch einen experimentellen Eingriff mit Luft füllen konnten. Brewig (Köln).

Molotkowsky, G. Ch.: Die Kontrollversuche der Theorie von Münch. (Botan. Garten, Kamienetz-Podolsk.) Bot. Z. 19, 225—230 u. dtsh. Zusammenfassung 231 (1934) [Russisch].

Münchs Theorie der Stoffbewegung wird durch die Ergebnisse einer Reihe von Versuchen bestätigt. Kemmer (Bremen).

Alexandrov, W. G., und L. I. Djaparidze: Zur Kenntnis der Leistungsfähigkeit des Wasserleitungssystems in den Blattstielen. Bot. Z. 19, 163—169 u. dtsh. Zusammenfassung 169 (1934) [Russisch].

Die Leistungsfähigkeit des Wasserleitungssystems wird auf Grund des Verhältnisses der Summe der Durchmesser aller Gefäße zur Blattfläche beurteilt und der sich ergebende Koeffizient als Bewässerungskoeffizient bezeichnet. Als Versuchspflanzen dienten *Bryonia dioica*, *Cannabis sativa* und *Helianthus annuus*, deren Leitsysteme sich im anatomischen Bau stark unterscheiden. Der Bewässerungskoeffizient der Schattenpflanze *Bryonia* erwies sich als bedeutend kleiner, als der von Sonnenblume und Hanf, die Lichtpflanzen sind. Diese wiederum zeigten untereinander erhebliche Unterschiede und zwar war die Sonnenblume stärker bewässert als der Hanf. Die Ursache dieser Verschiedenheit sehen Verff. darin, daß die untersuchten Sonnenblumenpflanzen ebenso wie die Bryoniapflanzen unverzweigt waren, während die Hanfpflanzen sich stark verzweigten. Bei der Sonnenblume war der Bewässerungskoeffizient der oberen Blätter kleiner als der unteren, bei *Bryonia* dagegen bei allen Blättern ungefähr gleich. Hoher Bewässerungskoeffizient kann nur unter Berücksichtigung weiterer Merkmale als Kennzeichen von Dürre-resistenz gewertet werden. Er kann aber zum Vergleichen der Dürre-resistenz einzelner Pflanzenindividuen herangezogen werden. H. v. Rathlef (Halle a. d. S.).

Schtschepkina, T. W.: Über das Prinzip der Einrichtung des Mechanismus der pflanzlichen Spaltöffnungsapparates, durch welches dessen periodische Kontraktion bedingt ist. Bot. Z. 19, 231—249 u. dtsh. Zusammenfassung 246—248 (1934) [Russisch].

Im Anschluß an frühere Untersuchungen der Verf. über Pektinstoffe und ihre Verbreitung in der Pflanze konnte festgestellt werden, daß die Cuticula aus ganz verschiedenen Stoffen besteht. Während ihre äußerste dünne Schicht aus fettartigen Stoffen besteht, stellt die innere, meist dickere Schicht ein in Wasser stark aufquellendes Kolloid mit hohem Pektingehalt dar. Dementsprechend verhalten sich diese beiden Schichten auch ganz verschieden, indem die äußere für Wasser undurchlässig ist, während die innere eine große Menge Wasser aufzunehmen und dadurch stark aufzuquellen vermag. Die Stoffe der äußersten können an der Luft unter Einwirkung des Sonnenlichtes, bei hoher Temperatur und geringer Luftfeuchtigkeit Veränderungen erfahren, indem sie oxydieren, die flüchtigen Anteile verdampfen und der Rest eintrocknet, wodurch die oft faltige Architektur der Cuticula zustandekommt. Auch die Schließzellen der Spaltöffnungen sind von denselben beiden Schichten überzogen und Verf. sieht in der Quellung und Entquellung der quellbaren Cuticularschichten jenes Moment, das bei den Öffnungs- und Schließbewegungen der Spaltöffnungen die Hauptrolle spielt. Die Stoffwandlungen in den Schließzellen sollen dabei nur eine indirekte Rolle spielen und die allgemeine Ansicht, daß das Öffnen der Stomata ausschließlich durch Wasseraufnahme seitens der Schließzellen bedingt ist, ist nur teilweise richtig, da man hierbei bisher die Rolle der Cuticularschichten ganz außer acht gelassen hat. Der Spaltöffnungsapparat stellt eben einen physiko-mechanischen Apparat dar, der mit dem gesamten ununterbrochenen Netz der Pektinstoffe in der Pflanze in Verbindung steht, was bei Beurteilung der verschiedenen im Blatt sich abspielenden physiologischen Vorgänge beachtet werden soll. J. Kissner (Wien).

Harnisch, Otto: Osmoregulation und osmoregulatorischer Mechanismus der Larve von *Chironomus thummi*. (Zool. Inst., Univ. Köln.) Z. vergl. Physiol. 21, 281—295 (1934).

Die normalerweise in Süßwasser lebenden Larven von *Chironomus thummi* sind auch in Salzlösungen bis zu 1% NaCl-Gehalt lebensfähig. In Salzlösungen über 0,8% NaCl tritt ein erheblicher Gewichtsverlust auf. Danach wäre zu vermuten, daß die Leibeshöhlenflüssigkeit einer NaCl-Lösung von 0,8—1,0% NaCl isotonisch wäre. Nach direkten Bestimmungen der Molarkonzentration mit Hilfe der Bangerschen Methode ist die Leibeshöhlenflüssigkeit einer Kochsalzlösung von 1—1,2% isotonisch. In Süßwasser befindliche Individuen nehmen durch die Haut osmotisch Wasser auf und scheiden es durch den Darm wieder aus. Bei mit Urethan betäubten Larven ist der osmoregulatorische Mechanismus nicht arbeitsfähig; derartige Individuen werden unter Wasseraufnahme prall und starr. Ebenso werden Larven, denen der Anus durch eine Haarligatur verschlossen worden ist, im Verlaufe von etwa 2 Tagen unter Wasseraufnahme prall und steif. Auf Grund histologischer Stufenuntersuchungen wird wahrscheinlich gemacht, daß das osmotisch von außen eingedrungene Wasser von dem Blinddarm (insbesondere dem „Dickdarm“) in Form von basalen Stauvakuolen aufgenommen wird, dann diffus distalwärts transportiert und schließlich unter Verknüpfung von Säumen kleiner distaler „Leerungsvakuolen“ ins Darmlumen abgeschieden wird. — Der Ref. möchte auf die ähnlichen Untersuchungen von Wigglesworth [vgl. diese Ber. 25, 398—400 (1933)] an Moskitolarven aufmerksam machen. Eine Auseinandersetzung mit ihren anderartigen Ergebnissen wäre erwünscht.

Carl Schlieper (Marburg a. d. L.).

Demianowsky, S., und E. Prokofjewa: Zur Dynamik der Reduktionsfähigkeit der Pflaumlympe von *Bombyx mori* L. Zool. Ž. 13, 176—184 u. dtsh. Zusammenfassung 184—185 (1934) [Russisch].

Die Untersuchung umfaßt, in eintägigen Intervallen, alle Entwicklungsstadien; sie ist an 3 Seidenspinnerrassen ausgeführt. Die Menge der reduzierenden Substanz wird nach Hagedorn und Jenssen bestimmt. Während jeder Häutung ist die Menge der reduzierenden Substanz am größten, entsprechend 150—180 mg% Glykose, in der Zwischenzeit fällt sie jäh auf 50—75 mg% und ist am niedrigsten während der intensivsten Freßtätigkeit, um bei Abnahme der Freßlust langsam anzusteigen und beim Einstellen der Nahrungsaufnahme stark emporzuschnellen. Die höchsten Werte wurden während der Verpuppung erhalten, über 200 mg%. Während der ersten Tage der Puppenruhe fällt der Wert, um dann bis zum Schlüpfen wieder anzusteigen. Danach fällt der Wert andauernd. Die Menge der reduzierenden Substanz ist beim Weibchen in allen Stadien etwas größer als beim Männchen, vom Augenblick der Eiablage an schwindet dieser Unterschied. Rassenunterschiede konnten in bezug auf die Menge der reduzierenden Substanz nicht festgestellt werden. Die Menge des Futters hat keinen Einfluß auf die Menge der reduzierenden Substanz im Blut. 2 Stunden nach Freßbeginn wird ein Wert erreicht, der während weiterer 12 Stunden konstant bleibt. Die Futterqualität ist gleichfalls ohne Einfluß. An 3 Versuchsgruppen werden Blätter von *Morus alba* v. *tatarica* verfüttert, die verschieden alt sind und sich durch ihre verschiedene chemische Zusammensetzung unterscheiden. Die Menge der reduzierenden Substanz ist im Blut aller 3 Gruppen gleich und ändert sich 2 Stunden nach Freßbeginn im Verlaufe von 12 Stunden nicht mehr. Sämtliche Angaben beziehen sich auf gesunde Tiere. Bei Tieren, die an Pébrine erkrankt sind, nimmt die Menge der reduzierenden Substanz vom 5. Stadium bis zum Tode dauernd ab. Der Arbeit sind ausführliche Tabellen beigegeben.

M. v. Dehn (München).

Riddle, Oscar, and Pela Fay Braucher: Hemoglobin and erythrocyte differences according to sex and season in doves and pigeons. (Unterschiede des Hämoglobingehalts und der Erythrocytenzahl gewöhnlicher Tauben und Ringeltauben, verschiede-

denen Geschlechts und zu verschiedenen Jahreszeiten.) (*Stat. f. Exp. Evolut., Carnegie Inst. of Washington, Cold Spring Harbor.*) Amer. J. Physiol. **108**, 554—566 (1934).

Die Untersuchungen wurden vorgenommen an gewöhnlichen, im rauen Klima heran gewachsenen Tauben und an Ringeltauben, die aus wärmerem Klima stammten. Zur Hämoglobinbestimmung wurde die Methode der Sauerstoffkapazität nach van Slyke verwendet. In 931 Messungen ergab sich bei den erwachsenen männlichen Tieren beider Taubenrassen ein gegenüber den weiblichen Tieren um nicht ganz 1% erhöhter Blutfarbstoffgehalt. Entsprechend war auch die Zahl der Erythrocyten der männlichen Tiere (3,228 Millionen je Kubikmillimeter) gegenüber derjenigen der weiblichen Tiere (3,096 Millionen je Kubikmillimeter) beider Rassen erhöht. Die höchsten Hämoglobinwerte wurden im Winter, die höchsten Erythrocytenzahlen im Herbst, und zwar um etwa 10% höher als im Sommer gefunden. Unter den untersuchten Tieren fanden sich bestimmte Gruppen, die stark abweichende Werte hatten und bei denen Störungen der Geschlechtsorgane vorlagen. Die jugendlichen Tauben beider Geschlechter zeigten leicht erhöhten Hämoglobinwert und Erythrocytenzahlen. Sieke.

Walters, Orville S.: Normal erythrocyte, hemoglobin and packed cell volume standards in young men. A study of 100 subjects. (Normale Erythrocyten-, Hämoglobin- und Blutkörperchenvolumenstandards bei jungen Männern.) (*Dep. of Physiol., Univ. of Kansas, Lawrence.*) J. Labor. a. clin. Med. **19**, 851—864 (1934).

Sorgfältige Bestimmungen an 100 gesunden jungen Männern zwischen 20 und 30 Jahren in Kansas ergaben eine mittlere Erythrocytenzahl von 4,84 Millionen, 15,12 g Hämoglobin pro 100 ccm Blut und 46,5 ccm Erythrocytensäule pro 100 ccm Blut. Wird ein Hämoglobinkoeffizient von 15,59 g und ein Volumkoeffizient von 47,4 ccm als 100proz. Standard zur Anwendung gebracht, so sind Farbe-, Volum- und Sättigungsindex ungefähr 1. Berechnungen auf dieser Grundlage ergeben die folgenden Durchschnittswerte: 96,5 μ^3 für das mittlere Blutkörperchenvolumen, 31,4 $\mu\mu\text{g}$ für den Hämoglobingehalt eines Körperchens und 32,4% für die Hämoglobinkonzentration. Plattner (Innsbruck).

Künstler, W. E.: Beitrag zur Methodik der osmotischen Resistenzbestimmung von Erythrocyten. (*Med. Univ.-Poliklin., Frankfurt a. M.*) Z. exper. Med. **93**, 706 bis 722 (1934).

Kritische Übersicht über die bisher üblichen Methoden der Resistenzbestimmung. Beschreibung eines die Schritprobenmethode nach Lang-Cohnreich modifizierenden „Resistometers“. Einzelheiten im Original. Plattner (Innsbruck).

Arvanitaki, A., H. Cardot et Tai Lee: L'électrocardiogramme du crabe. (Das Elektrokardiogramm von *Carcinus maen*.) (*Stat. Maritime de Biol., Tamaris-sur-Mer.*) J. Physiol. et Path. gén. **32**, 36—43 (1934).

Verff. wenden sich gegen die Anschauung vom oszillatorischen Charakter des Crustaceen-Ekg. Bei vorsichtiger Behandlung und möglichst schonender Präparation erhält man gleichfalls ein einfaches Ekg., das beim isolierten frischen Herzen aus einer schnellen kurzen und einer etwas länger dauernden Erhebung besteht. Schon nach kurzer Zeit in nicht ganz equilibrierten Salzlösungen oder nach Beseitigung mit Seewasser entstehen Oszillationen im Ekg., die auf Koordinationsstörungen hinweisen, bedingt durch Verletzungen im Herzgangliensystem. Als beste Nährlösung erwies sich folgende Salzzusammensetzung: NaCl 26 g; KCl 1,4 g; CaCl₂ 2 g; MgCl₂ 5 g; Na₂SO₄ (10 H₂O) 3,2 g; MgSO₄ (7 H₂O) 3,5 g; NaHCO₃ 0,2 g. Kleinknecht.

Zubkov, A.: Materialien zur vergleichenden Physiologie des Herzens. I. Mitt. Die Anatomie des Herzens der *Helix pomatia*. (*Abt. f. Vergleich. Physiol., Timiriaseff Biol. Inst., Moscow.*) Fiziol. Ž. **17**, 293—298 u. engl. Zusammenfassung 298 (1934) [Russisch].

Die Wand des Ventrikels ist nicht homogen. Die innere Schicht ist für die Automatie stärker befähigt als die äußere. Die Automatie wird ausgelöst in der inneren Schicht des aortalen Endes. Von hier geht der Reiz der inneren Schicht entlang bis zur Ventrikelbasis und geht dann auf die äußere Schicht über; von dort der Aorta entlang. Gordonoff (Bern).

Zubkov, A.: Materialien zur vergleichenden Physiologie des Herzens. II. Mitt. Die Rolle des zentralen Nervensystems in der Herztätigkeit der *Helix pomatia*. (*Abt. f. Vergleich. Physiol., Timiriaseff Biol. Inst., Moscow.*) Fiziol. Ž. **17**, 299—305 u. engl. Zusammenfassung 306 (1934) [Russisch].

Das zentrale Nervensystem hat eine hemmende Wirkung auf die Herztätigkeit der *Helix pomatia* L. Die Impulse sind zentripetaler und zentrifugaler Natur. Genauer wurden untersucht die Reflexe, die vom Herzen zum Bein und vom Bein und Fühlhorn zum Herzen gehen. Die Kontraktion auf dem einen Reflexweg führt zu einer Erschlaffung auf dem anderen. Der Vorhof und der Ventrikel arbeiten nicht koordiniert von sich aus. Die Koordination wird weder durch intra- oder epikardiale Nerven herbeigeführt, sondern entweder mechanisch auf dem Reflexwege oder aber durch die Vermittlung des zentralen Nervensystems. Gordonoff.

Panizza, B.: Beiträge zur Kenntnis der Wirkung des Herznerven. (I. Mitt.) (*Physiol. Inst., Univ. Heidelberg.*) *Z. Biol.* **95**, 117—125 (1934).
Vgl. *Ber. Physiol.* **80**, 650. °°

Stoffwechsel, Wachstum.

Kestner, Otto: Über die Oberflächenregel des Stoffwechsels. (*Physiol. Inst., Univ. u. Allg. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.*) *Pflügers Arch.* **234**, 290—301 (1934).
Vgl. *Ber. Physiol.* **81**, 265. °°

Gelineo, S.: Influence du milieu thermique d'adaptation sur la courbe de la thermoregulation. (Einfluß des gewohnten Wärmemilieus auf den Verlauf der Wärmeregulation.) (*Inst. de Physiol. Gén., Univ., Belgrade.*) *C. r. Soc. Biol. Paris* **117**, 40—42 (1934).

Die Untersuchungen wurden an einem Grünfink (*Chloris chloris*) angestellt, der erst wochenlang in Temperaturen zwischen 14—20° und dann ebenso lange zwischen —31° gehalten worden war. Sogleich nach dem langen Aufenthalt in dem betreffenden Wärmemilieu wurde sein Gassstoffwechsel bei verschiedenen Temperaturen geprüft, und es wurden so 2 Kurven der Wärmeregulation ermittelt, die für das an niedere oder das gleiche an hohe Temperaturen gewöhnte Tier gelten. Die thermische Neutralität liegt im 1. Fall zwischen 30—31°, im 2. zwischen 33—35°. Umgedreht ist es mit dem Umsatz, der im 1. Fall höher ist als im 2. Auch die Temperatur, bei der die thermische Apnoë auftritt, ist verschieden. (33,4 bzw. 36,5°). Der Einfluß der Anpassung an ein bestimmtes Wärmemilieu ist also für die gesamte Wärmeregulation von Bedeutung.

Hans Scharnke (München).

Yagi, Nobumasa, and Jukichi Shimoizumi: On the range of lethal body temperature the rat. (Über den Bereich der tödlichen Körpertemperaturen bei der Ratte.) *J. Rep. Tokyo Bunrika Daigaku B* **1**, 231—242 (1934).

Thermoelektrische Messung, 3 cm tief im Darm vom After aus. Tiere gefesselt. *Rattus rattus alexandrinus*. Die normale Körpertemperatur betrug 37,20° (36,85—37,45°). Bei einer Außentemperatur von —3° lag die Todestemperatur bei den Männchen bei 13,41° (12,45—13,8°), bei den Weibchen bei 13,76° (13,00—14,6°), 3 Tiere. Bei einer Außentemperatur von 40—45° und einer Feuchtigkeit von 43 bis 100% (11 Tiere) lag die Todestemperatur bei 42,31° (41,51—43,98°); in einem zweiten Versuch mit langsam ansteigender Temperatur (22,2—39,3°; 3 Tiere) bei 42,82° (2,42—43,32°); in einem dritten Versuch (4 Tiere) bei 45°, aber freier Bewegung der Tiere bei 42,78° (42,20—43,00°). Bei den weiblichen Tieren liegt die Todestemperatur etwas niedriger (42,19°) als bei den männlichen (42,68°). Es besteht keine Beziehung zum Körpergewicht (54,5—234,0 g).

P. Krüger (Wien).

Bignozzi, Giuseppe: Influenza della alimentazione acida in animali erbivori. (Vorläufige Untersuchungen.) *Atti Accad. Sci. med. e natur. Ferrara*, **II**, s. 10, 17—24 (1934).

Vgl. *Ber. Physiol.* **81**, 249.

Marek, József, Oszkár Wellmann und László Urbanek: Einfluß der mineralischen Zusammensetzung der Nahrung auf den Calcium-, Phosphor- und Kohlendioxydgehalt des Blutes. (*Mat. természett. Értes.* **50**, 115—116 u. dtsch. Zusammenfassung 17—118 (1934) [Ungarisch].)

Vgl. *Ber. Physiol.* **81**, 613.

Horn, Valentin: Knochenuntersuchungen bei Schweinen. (*Agrikulturchem. Inst., Univ. Gießen.*) *Biedermanns Zbl. B* **6**, 213—226 (1934).

Die einzelnen Knochen der Schweine weisen verschiedenen Mineralgehalt auf. Bei niedrigem Kalkgehalt der Kost und gleichzeitigem Vitamin D-Mangel ist die Knochenzusammensetzung eine weit ungünstigere als bei derselben Kostzusammensetzung unter Zusatz von Vitamin D. Bei ausbalanciertem Ca/P-Quotient hat der Vitamin D-Zusatz auf den Mineralgehalt des Knochens keinen Einfluß. Schweine, die auf einer kalkarmen Kost gehalten wurden (Pflanzenkost), zeigten so schwere Störungen in den Extremitäten, daß sie allein nicht mehr

aufstehen konnten. In der chemischen Zusammensetzung waren entsprechende Abweichungen vorhanden. Die Ergebnisse werden mit den bereits bekannten anderer Autoren verglichen. Die einzelnen Analysenwerte sind in übersichtlichen Tabellen zusammengestellt. *Bomskov*

Haydak, Mykola H.: Changes in total nitrogen content during the life of the imagines of the worker honeybee. (Die Veränderungen im gesamten Stickstoffgehalt der Bienenarbeiterin während ihres Imaginallebens.) (*Div. of Bee Culture, Bureau of Entomology, U. S. Dep. of Agricult., Washington.*) J. agricult. Res. **49**, 21—28 (1934).

Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß der Stickstoffgehalt des Bienenkörpers starke Schwankungen unterworfen ist. Die stärkste Zunahme des Stickstoffgehaltes konstatierte er in den ersten 5 Lebenstagen; sie betrug im Kopf 92,6%, im Abdomen 76%, im Thorax 37,5%, im Gesamtkörper der Biene 64,1% durchschnittlich. Die auffallend große Zunahme im Kopf ist auf die starke Entwicklung der Futtersaftdrüse in dieser Lebensperiode zurückzuführen. Nach dem 5. Tage erfolgt durchschnittlich wieder eine Abnahme. Eine Ausnahme macht lediglich der Thorax, dessen Stickstoffgehalt nach dem 20. Tage dank der Entwicklung der Flugmuskulatur eine Zunahme erfährt. Der Stickstoffgehalt des Verdauungstraktes ist am größten bei 6 Tage alten Bienen; er entspricht etwa der im Rectum befindlichen Pollenmenge. Verf. weist zum Schluß darauf hin, daß der Stickstoffgehalt der Honigbiene unter den in seiner Arbeit gegebenen Versuchsbedingungen im allgemeinen in Beziehung steht zur Art ihrer Tätigkeit.

v. Rhein (Celle).

Willecox, J. S.: The nitrogen balance of laying hens. (Das Stickstoffgleichgewicht bei legender Hühner.) (*Dep. of Agricult., Univ., Leeds.*) J. agricult. Sci. **24**, 636—648 (1934).

Zwei Rhode Island Red-Hühner von 2,629 und 2,537 kg. Es wurden bestimmt der N-Gehalt der Nahrung, der mit den Exkreten ausgeschiedene N, das Gewicht der gelegten Eier und ihr N-Gehalt. Die Differenz zwischen den Werten des aufgenommenen und abgeschiedenen N ergibt den Wert des für die Eiproduktion zurückgehaltenen N. Dauer der Versuche 10 Wochen. Auf Grund der starken täglichen Schwankungen scheint eine Beziehung zwischen dem für die Eiproduktion zurückgehaltenen N und dem mit den Eiern abgeschiedenen N oder der Zahl der gelegten Eier zu bestehen. Der gesamte für die Eiproduktion notwendige N kann wohl zur Gänze aus der während der Legeperiode aufgenommenen Nahrung gedeckt werden. Vermutlich findet während einer lebhaften Eilegetätigkeit eine Synthese von N-Konstituenten für die Eier in gleichmäßiger Weise statt, wenigstens kann während der Legeperiode keine Speicherung von N, wie zu Beginn derselben, beobachtet werden. *P. Krüger (Wien).*

Makino, Katashi: Über den Nucleinstoffwechsel. I. Mitt.: Über die fermentative Aufspaltung der Hefenucleinsäure mit Nucleotidase aus Kaninchendarm. (*Inn. Abt. Dairen-Hosp., Dairen.*) Hoppe-Seylers Z. **225**, 147—151 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. **81**, 262.

Makino, Katashi: Über den Nucleinstoffwechsel. II. Mitt.: Über die fermentative Spaltung der Mononucleotide mit Nucleotidase aus Kaninchendünndarm. (*Inn. Abt. Dairen-Hosp., Dairen.*) Hoppe-Seylers Z. **225**, 151—154 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. **81**, 263.

Makino, Katashi: Über den Nucleinstoffwechsel. III. Mitt.: Über die Aufspaltung des Polynucleotids in Mononucleotide mit dem Darmenzym. (*Inn. Abt., Dairen-Hosp. Dairen.*) Hoppe-Seylers Z. **225**, 154—156 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. **81**, 263.

Shen, Tsun-Chee: Studies on the metabolism of ducks (*Anas platyrynchos*, L.). I. Adiposity or gain of body weight through force- and voluntary-feeding. (Stoffwechselversuche an Enten [*Anas platyrynchos*, L.]. I. Fettansatz oder Gewichtszunahme bei Zwangsfütterung und bei freiwilliger Futteraufnahme.) (*Dep. of Physiol., Peiping Union Med. Coll., Peiping.*) Chin. J. Physiol. **8**, 65—74 (1934).

An Enten wird der Einfluß der Zwangsfütterung und der spontanen Futteraufnahme gleichzeitig unter Bestimmung des Stoffwechsels mit dem Apparat nach Benedict-Knippinger verglichen. Die Gewichtszunahme ist abhängig von der Menge des aufgenommenen Futter

ist nicht von der Methode der Fütterung, und beruht vorwiegend auf einer Fettzunahme in Leber, im subcutanen und im subperitonealen Gewebe. *Lenkeit* (Berlin).

Ohlsson, Börje, and Gunnar Blix: On cyclic changes in the lipid content of the liver in the rat. (Über cyclische Änderungen im Lipoidgehalt der Rattenleber.) *Acta. of Med. Chem., Univ., Uppsala.* Skand. Arch. Physiol. (Berl. u. Lpz.) **69**, 182 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. **81**, 625.

Blumenfeld, Charles M.: Weight changes in the suprarenal glands of albino rats on vitamin E deficient and fat deficient diets. (Gewichtsänderungen der Nebennieren bei Albinoratten bei Fett- und Vitamin-E-Mangel.) (*Dep. of Anat., Univ. of Utah, Salt Lake City.*) *Endocrinology* **18**, 367—381 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. **81**, 618.

Spruyt, J. P.: Comparative determinations of the antineuritic vitamin content of rice, made by experiments on the rice bird and by the rat tests. (Vergleichende Bestimmungen des Gehalts von Reis an antineuritischen Vitamin nach Versuchen an Hühnern und Ratten.) (*Chem. Laborat., Med. Univ., Batavia a. Laborat. f. Physiol. Chem., Univ., Amsterdam.*) *Arch. néerl. Physiol.* **19**, 295—300 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. **81**, 254.

Kinoshita, R., and H. Nakamura: The biological activity of carotinoids. (Die biologische Wirksamkeit von Carotinoiden.) (*II. Path. Inst., Univ., Sapporo.*) (*23. gen. Meet., Fukuoka*, 5.—7. IV. 1933.) *Transactions Soc. path. jap.* **23**, 332—340 (1933).

Auf Grund von Fütterungs-, histologischen und biologischen Versuchen, insbesondere Gewebeskultur und Zellstoffwechsel, kamen Verff. zum Schluß, daß sowohl Carotin als auch Anthophyll einen vollwertigen Ersatz für das Vitamin A darstellen. Eine direkte Umwandlung des einen Stoffes in den anderen ist noch zweifelhaft, jedoch dürfte die Leber eine Rolle spielen. Mit großer Wahrscheinlichkeit kommt die biologische Wirksamkeit der gemeinsamen Glyengruppe zu. *Druckrey* (Berlin).

Bertalanffy, Ludwig von: Untersuchungen über die Gesetzmäßigkeit des Wachstums. Allgemeine Grundlagen der Theorie; mathematische und physiologische Gesetzmäßigkeiten des Wachstums bei Wassertieren. (*II. Zool. Inst., Univ. Wien.*) *Roux' Arch.* **1**, 613—652 (1934).

Im wachsenden Organismus überwiegt der Aufbau der Körperbaustoffe den Abbau. Dabei ist der Aufbau der Oberfläche (σ) des Organismus proportional, der Abbau dem Volumen (v). Für das Volumwachstum gilt die Differentialgleichung $\frac{dv}{dt} = \eta \cdot \sigma - \kappa \cdot v$, wobei η den Aufbau und κ den Abbau mißt. Bei proportionalem Wachstum ist für die Wachstumsgeschwindigkeiten $\frac{dv}{dt} \cdot \frac{1}{v} = \frac{d\sigma}{dt} \cdot \frac{3}{l}$. Dies führt auf eine Exponentialkurve für das Längenwachstum und einen S-förmigen Verlauf des Volumwachstums. Damit ist die autokatalytische S-Kurve für den Wachstumsverlauf entbehrlich. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist nicht vom Alter, sondern von der erreichten Größe abhängig; der Endgröße ist der erstrebte Gleichgewichtszustand erreicht. Für einige Tiere wird gezeigt, daß die Stoffwechselkonstanten der Wachstumskurve hinreichend mit den experimentell in Hungerversuchen gefundenen übereinstimmen. *S. Koller.*

Spett, G.: Über das Problem des Insekten-Wachstums. *Zool. Ž.* **13**, 195—205 u. angl. Zusammenfassung 205—206 (1934) [Russisch].

Nach Przibram erfolgt die lineare Größenzunahme der Gliedertiere von Häutungsstadium zu Häutungsstadium um die Größe $1,26$ gemäß der Formel $\sqrt[3]{2} = 1,26$. An 8 Orthopterenarten, die in tunlichst kurzer Zeit auf einem beschränkten Areal gesammelt wurden, wurde der Przibram-Quotient auf seine Gültigkeit nachgeprüft. Untersucht wurden je 5 Männchen und 25 Weibchen von *Blatta orientalis*, *Chorthippus parallelus*, *Ch. albomarginatus*, *Docostaurus maroccanus*, *Locusta migratoria*, *Oedipoda coerulescens*, *Aceridium biunctatum*, *A. subulatum*. Im ganzen wurden fast 10000 Messungen vorgenommen. Außer Längenmessungen an verschiedenen Organen wurde bei *D. maroccanus* auch das Gewicht der einzelnen Organe in den verschiedenen Entwicklungsstadien bestimmt.

Für 3 Arten (*B. orientalis*, *A. bipunct.*, *A. subulat.*) konnte der Quotient *Przi-*

brams in großer Annäherung als richtig bestätigt werden. Bei 5 anderen Arten (*C. paral.*, *Ch. albom.*, *D. marocc.*, *L. migr.*, *Oe. chor.*) wurden erheblich größere Quotienten (1,31—1,44) errechnet. Anscheinend erfolgt hier von Stadium zu Stadium eine Gesamtzunahme um mehr als das Doppelte. Die Gewichtsbestimmungen bestätigen die Annahme. Die Feststellung, daß eine ganze Anzahl von Arten sich mehr als um das Zweifache von Stadium zu Stadium vergrößern, macht Przibram's Annahme recht unwahrscheinlich, daß jeder Häutung eine durch einfache Teilung erfolgende Verdoppelung aller Zellelemente vorausgehe. Auch die Annahme einer zwei- oder mehrmaligen Teilung aller Zellen in jedem Stadium ist nicht recht möglich. Schnelligkeit des Wachstums und Größe des Przibram-Quotienten sind einander direkt proportional. Bestimmte besonders lange Organe wachsen in einer Richtung besonders schnell und ergeben daher bei linearen Abmessungen besonders hohe Quotienten. Wägungen derartiger Organe zeigten, daß ihr Wachstum dem Wachstum der übrigen Organe proportional verläuft. Nur in sehr allgemeiner Fassung ist die These zulässig, daß das Wachstum der untersuchten Orthopterenarten von Stadium zu Stadium unter Beibehaltung einer gleichbleibenden Wachstumsgeschwindigkeit in geometrischer Progression erfolgt. Außer den bereits erwähnten Abweichungen wurde festgestellt, daß das letzte Stadium im Vergleich zu den vorangehenden Stadien im Wachstum zurückbleibt. Eine Abnahme der Wachstumsgeschwindigkeit ist überhaupt für die ganze postembryonale Entwicklung charakteristisch. Sie läßt sich bei gesondeter Betrachtung einzelner Organe besonders gut beobachten und hängt mit dem Grade der Organdifferenzierung zusammen. Werden nur die Gewichte der ganzen Individuen berücksichtigt, so werden die unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten der einzelnen Organe übersehen (vgl. H. Przibram, Form und Formel im Tierreich. 1933 und G. Spett, vgl. diese Ber. 16, 342 u. 19, 112 d. Ref.) v. Knorre (Riga).

Hormonlehre.

Foss, Harold L.: The evolution of our knowledge of the physiology and pathology of the thyroid gland. (Die Entwicklung unserer Kenntnisse über die Physiologie und Pathologie der Schilddrüse.) (*Surg. Serv., Geisinger Mem. Hosp., Danville, Pennsylvania.*) *West. J. Surg. etc.* 42, 536—545 (1934).

Vorliegende Abhandlung bringt in ganz kurzer Übersicht die Tatsachen, welche zu unserer heutigen Auffassung der Schilddrüsenfunktionen geführt haben, und stellt sie in Beziehung zur Pathologie der Schilddrüsenerkrankungen. A. Hartmann.

Képinov, Léon: Recherches sur les relations fonctionnelles entre le pancréas et l'hypophyse. (*Laborat. de Physiol., Inst. Pasteur, Paris.*) *C. r. Soc. Biol. Paris* 110, 833—836 (1934).

Iversen, Poul, und Tage Bjerling: Die Wirkungen des Hypophysen-Hinterlappens-Extraktes auf die Wasserausscheidung durch die Nieren. (*Abt. VII, Städt. Krankenhaus „Kommunehosp.“, Kopenhagen.*) *Naunyn-Schmiedeberg's Arch.* 175, 681—688 (1934). Vgl. Ber. Physiol. 81, 645.

Stehle, R. L.: Der antidiuretisch wirkende Anteil des Hypophysenhinterlappens-Extraktes. (*Dep. of Pharmacol., McGill Univ., Montreal.*) *Naunyn-Schmiedeberg's Arch.* 175, 47 bis 48 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. 81, 645.

Collin, R.: Sur l'origine histologique des hormones hypophysaires. Les cellules cyanophiles de la glande pituitaire sont-elles la source du prolactin? (Über den histologischen Ursprung der Hypophysenhormone. Sind die cyanophilen Zellen der Hypophyse die Quelle des Prolans?) *Anthropologie* 12, Suppl.-H., 9—18 (1934).

Verf. ist der Ansicht, daß möglicherweise die cyanophilen Zellen der Hypophyse den Entstehungsort des Prolans bilden, doch ist dies nicht ganz sicher, da bei Experimenten die Natur der Zellen des Implantats gewöhnlich unbekannt ist. Nach den

utigen Stand unserer Kenntnisse können wir zugeben, daß in den chromophilen Zellen der Hypophyse der Großteil des Prolans entsteht, doch kann vorläufig nicht entschieden werden, ob dies in den eosinophilen oder in den basophilen Zellen geschieht. Wenn man die Hypophysenzellen als fähig ansieht, ihre Eigenschaften oder Prinzipien gleichzeitig oder nacheinander, je nach den gegebenen Umständen, zu manifestieren, so wird man sich für eine breitere Konzeption der Hypophysenphysiologie erklären.

J. A. Valšík (Prag).

Vacek, T.: Influence chalonique du lobe antérieur de l'hypophyse sur les testicules oiseaux. (Hemmende Wirkung des vorderen Hypophysenlappens auf die Ausbildung der Hoden bei Vögeln.) (*Inst. de Physiol., École Vétérin., Brno.*) C. r. Soc. Biol. Paris **7**, 159—160 (1934).

Jungen Leghornhähnen und Turteltauben wurden während 19—42 Wochen alle 7 Tage eine Spritze Vorderlappenhormon, das aus dem Schwein gewonnen worden war, gegeben. Im Vergleich zu Kontrolltieren ergab sich, daß das Wachstum des gesamten Organismus um etwa 18% zurückgeblieben war. Sehr viel stärker war jedoch das Zurückbleiben der Hoden ausgeprägt, die gänzlich unentwickelt blieben. Der Verf. glaubt, daß das eingespritzte Hormon nicht direkt, sondern durch Vermittlung anderer endokriner Organe (vielleicht der eigenen Hypophyse des Tieres) gewirkt habe.

Hans Scharnke (München).

Aff, Helen M., and Leo Loeb: Effect of combination of two antagonistic anterior pituitary hormones on sex organs of guinea pig. (Die Wirkung der kombinierten Zufuhr von zwei antagonistisch wirkenden Hypophysenvorderlappenhormonen auf die Sexualorgane des Meerschweinchens.) (*Dep. of Path., Washington Univ. School of Med., St. Louis.*) Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. **31**, 957—961 (1934).

Der Hypophysenvorderlappen enthält zwei antagonistisch wirkende Hormone, von denen das eine die Follikel zum Wachstum und zur Reife anregt, während das andere eine Atresie der Follikel herbeiführt. Das erste Hormon kommt vorwiegend im Vorderlappen von Kaninchen, Ratten und Meerschweinchen vor. Das zweite findet sich hauptsächlich in der Hypophyse des Rindes und des Schafes. Verf. suchen nun die Frage zu entscheiden, wie sich die beiden Hormone verhalten, wenn sie 1. gleichzeitig und 2. getrennt injiziert werden. Die Versuche wurden an 175—220 g schweren weiblichen Meerschweinchen ausgeführt. Ergebnisse: 1. Durch Injektion wässriger Extrakte aus Rinderhypophysen und gleichzeitige Implantation von Meerschweinchenvorderlappen wird die wachstumsanregende Wirkung des Meerschweinchenvorderlappens auf die Follikel verhindert. 2. Dieselbe Wirkung, d. h. Unterdrückung des Wachstums und der Reife der Follikel, tritt auch dann ein, wenn man den Tieren in ihrer ersten Periode (5 Tage) Extrakt injiziert und ihnen anschließend in einer zweiten Periode (4—7 Tage) täglich Meerschweinchenvorderlappengewebe implantiert. A. Loeser.°°

Voss, H. E.: Beobachtungen über die Wirkung gonadotroper Hormone auf Weibchen mit spontaner Cyclusinsuffizienz. Endokrinol. **14**, 301—309 (1934).

Mäusen mit spontaner Cyclusinsuffizienz wurde Schwangerenurin eingespritzt. Man ließ sich dadurch stets nur ein einziger Brunstgang erzielen, nie eine Dauerwirkung. Die Tatsache, daß bei steigenden Dosen von Schwangerenurin die zunächst positive Unterwirkung (Vaginalabstrich) umschlägt zu negativen Ergebnissen, wird als Stütze für das Vorhandensein zweier Prolane, eines Follikelreifungs- und eines Luteinisierungshormones, angesehen. Der Umschlagspunkt sei bedingt durch das dann in genügender Menge vorhandene Luteinisierungshormon, das die Wirkung des Follikelhormons überwiegt. Spiegel (Tübingen).

Adams, A. Elizabeth: The gonad- and thyroid-stimulating potencies of phyone and hebin. (Das Keimdrüsen und Schilddrüse reizende Vermögen von Phyone und Hebin.) (*Dep. of Zool., Mount Holyoke Coll., South Hadley, Mass.*) Anat. Rec. **59**, 329—361 (1934).

Phyone (aus Rinderhypophyse) und Hebin (aus Schafhypophyse) sind auf Keimdrüsen und Schilddrüse von normalen und hypophysektomierten Triturus viridescens wirksam. Druckrey (Berlin).°

Smith, Philip E., and Earl T. Engle: Gonad-stimulating hormones from the pituitary and from human urine. (Gonadotropes Hormon aus Hypophyse und aus menschlichem Urin.) (*Dep. of Anat., Coll. of Physic. a. Surg., Columbia Univ., New York*) *J. Pediatr.* **5**, 163—176 (1934).

Rosahn, Paul D., Harry S. N. Greene and C. K. Hu: Observations on the treatment on infertile rabbits with antuitrin „S“. (*Rockefeller Inst. f. Med. Research, New York*) *Proc. Soc. exper. Biol. a. Med.* **31**, 1008—1010 (1934).

Vacek, T.: Influence de l'hormone sexuelle femelle sur la croissance, le développement des poulets et de leur appareil génital et la capacité de ponte de la poule. (Wirkung des weiblichen Sexualhormons auf das Wachstum, die Entwicklung der Henne und ihres Genitalapparates und der Legetätigkeit.) (*Inst. de Physiol., École Vétérin. Brno.*) *C. r. Soc. Biol. Paris* **117**, 154—157 (1934).

Injektionen von Ovarienextrakten und von Liq. follicul. verursachten bei 6 bis 7 Wochen alten Hühnern eine Hemmung sowohl des Gewichtswachstums und der Entwicklung des Körpers als auch der Ovarien und innerer Genitalien. Die Legetätigkeit begann später. Reines Hormon, wenn in hoher Dosis appliziert, stimulierte hingegen das Wachstum und die Entwicklung und Reifung des Genitalapparates. Fütterung mit Rind- und Schwein ovarien wirkte ebenfalls sehr günstig. — Die mit Extrakt behandelten Hennen legten weniger Eier, welche aber schwerer waren. Die mit Eierstöcken zugefütterten Hennen gaben mehr und schwerere Eier, wobei aber höchstwahrscheinlich die erhöhte Eiweißstoffzufuhr mitwirkte. *Kříženecký (Brünn)*.

Vacek, T.: Contribution à l'antagonisme des hormones sexuelles. (Ein Beitrag zum Antagonismus der Sexualhormone.) (*Inst. de Physiol., École Vétérin., Brno.*) *C. r. Soc. Biol. Paris* **117**, 157—159 (1934).

Mit weiblichem Geschlechtshormon in verschiedenen großen Mengen behandelte junge Hähne (6—8 Wochen alt) zeigten Hemmung im Wachstum (—29,7%) und Verkleinerung der Hoden bei Behandlung mit großen Gaben; aber Stimulation der Hodenentwicklung bei kleinen Gaben. Verf. ist der Meinung, daß die Wirkung auf dem Umwege über die Hypophyse geht: die Produktion des Wachstumshormons wurde immer unterdrückt, die des Gonadotropenhormons durch hohe Dosis unterdrückt, durch kleinere aber stimuliert. *Kříženecký (Brünn)*.

Catchpole, H. R., and H. H. Cole: The distribution and source of oestrin in the pregnant mare. *Anat. Rec.* **59**, 335—347 (1934).

Eng, Hans: Resorption und Ausscheidung des Follikulins im menschlichen Organismus. I. Mitt. Follikulingehalt der Nahrung. (*Pharmakol. Inst., Univ. Oslo.*) *Biochem. Z.* **271**, 370—377 (1934).

Tokura, Hironori: Tierexperimentelle sowie klinische Studien über die Wirkungen des Ovarialfollikelhormons. (*Frauenklin., Städt. Otuka-Hosp., Tokyo.*) *Mitt. jap. Ge. Gynäk.* **29**, H. 8, dtsh. Zusammenfassung 71—72 (1934) [Japanisch].

Es wurde über ein Ovarialfollikelhormonpräparat namens „Gynandol“ berichtet und zwar über dessen Wirkungen im Tierexperiment sowie über klinische Beobachtungen an der Frau. *H. Siegmund (Graz)*.

Peissachovitch, I.-M.: Hormone de la maturation sexuelle (lutoestrogène), phyto hormone gonadotrope. (Das Hormon der Sexualreife [Lutoestrogen], ein gonadotropes Hormon aus Pflanzen.) (*Inst. Ukrain. d'Endocrinol. et d'Organothérapie, Charkov*) *Rev. franç. Endocrin.* **12**, 205—224 (1934).

Zwiebeln (*Allium cepa*) wurden mit angesäuertem Wasser extrahiert. Dieser Extrakt wurde mit Salz gefällt; mit Alkohol und Äther gewaschen und dialysiert. Bei der kastrierten Maus übte dieses Präparat keine Wirkung aus. In der infantilen Maus und Ratte rief das Präparat Reifungserscheinungen am Ovarium hervor (Follikelreifung und Luteinisierung). Auch beim Kaninchen gelang es, nach intravenöser Injektion diese Reaktionen zu bekommen. Die Extrakte zeigen also eine große Ähnlichkeit mit den gonadotropen Hormonen aus Schwangersenarn. Ob die aktive Substanz in dem Alliumextrakt (Lutoestrogen) mit Prolan identisch

bleibt aber so lange fraglich, als die betreffenden Wirkstoffe noch nicht in chemisch reiner Form dargestellt sind.

P. de Fremery (Oss, Holland).^o

Kabak, J., und M. Kisilstein: Hervorrufen der Lactation bei Schafen und Ziegen mittels endokriner Faktoren. (*Laborat. f. Entwicklungsphysiol., Inst. f. Tierzucht, Zoopark, Moskau.*) *Z. Züchtg B* 29, 297—300 (1934).

Zur Prüfung der Möglichkeiten der Erhöhung der Milchmenge bei Schafen durch endokrinsekretorische Mittel standen 75 Tiere der weißen wallachischen Rasse zur Verfügung. Es wurden 6 Versuchsgruppen von je 10 Tieren gebildet und die restlichen 5 Tiere zur Kontrolle übrig gelassen. Folgende Ergebnisse wurden erzielt: 15 Tage dauernde subcutane Injektion von 10 ccm bzw. 22 ccm Harn einer Schwangeren wirkte hemmend auf die Milchabsonderung. Prolan in 15 Gaben von 100 bzw. 300 ME. stimmte ebenfalls die Lactation. In einer anderen Gruppe wurde nach nur 3maliger 100-ME.-Dosis Prolan eine starke Steigerung der Milchmenge erzielt. Hypophysen- Vorderlappenextrakt zeigte in einem 15tägigen Versuch mit täglichen Gaben von 2 ccm keine Wirkung, während die geringere Dosis von täglich 5 ccm einen günstigen Einfluß hatte.

Lauprecht (Göttingen).

Kabak, J., und M. Kisilstein: Der Einfluß endokriner Faktoren auf die Lactation bei Schafen. (*Laborat. f. Entwicklungsphysiol., Inst. f. Tierzucht, Zoopark, Moskau.*) *Züchtg B* 29, 301—306 (1934).

In der Möglichkeit, eine Lactation mit Hilfe der inneren Sekretion künstlich hervorzurufen, wird von Verff. für die Tierzucht ein großer Vorteil gesehen, um Tiere, die abortiert haben oder unfruchtbar sind, besser auszunutzen. Als Material dienten 17 Schafe und 20 Ziegen, an denen folgende Präparate geprüft wurden: 1. Follikulin, 2. Laugenextrakt aus dem Hypophysenvorderlappen, nach Evans zubereitet; 3. Prolan und 4. Harn einer Frau in der Mitte der Schwangerschaft, bekanntlich Prolan und Follikulin enthaltend. — Die Präparate wurden täglich in folgenden Dosen den Tieren subcutan injiziert: Follikulin 150 und 600 ME., Hypophysenextrakt 5 und 20 ccm, Prolan 100 und 300 ME. und Harn 10 und 20 ccm.

Bei den Kontrolltieren und den Tieren mit Follikulingabe war das Ergebnis einschließlich der Milchabsonderung negativ. Die bei Schafen und Ziegen in Gruppen von 4 Tieren geprüften Mittel Prolan, Hypophysenextrakt und Harn lieferten mit einer Ausnahme in jeder Gruppe Milch. Wenn es auch nicht gelang, eine vollkommene Lactation zu erzeugen, so ist dieser orientierende Versuch doch von großer Bedeutung.

Lauprecht (Göttingen).

Abelin, I.: Nichtschilddrüsenstoffe mit Schilddrüsenwirkung. II. Mitt.: Einfluß der Abbauprodukte des künstlich jodierten Eiweißes (Homothyroxine) auf das Vogelfieder und auf die Körpertemperatur des Meerschweinchens. (*Physiol. Inst., Univ. Bern.*) *Naunyn-Schmiedeberg's Arch.* 175, 146—150 (1934).

Aus künstlich jodiertem Eiweiß lassen sich jodreiche, hochaktive Stoffe isolieren (Homothyroxine), welche dem Thyroxin sehr ähnlich wirken (vgl. diese Ber. 31, 455 u. 183). In vorliegender Arbeit wird der Einfluß dieser Homothyroxine auf das Vogelfieder und auf die Thermoregulation untersucht. — Ebenso wie nach Zufuhr von Schilddrüsenpräparaten kommt es auch nach Injektion von Homothyroxin aus künstlich jodiertem Eiweiß zu einem Federabfall (Mauserung) und zu einer Depigmentierung der Feder. Letzterer Vorgang kann bis zum Albinismus fortschreiten. Als Versuchstiere eignen sich ganz schwarze Hühner besonders gut. — Hyperthyreoidisierte Meerschweinchen reagieren auf eine Injektion von Novocain mit einem tiefen Temperatursturz. Auch nach Einspritzung von Homothyroxin reagieren die Tiere auf Novocain mit einem intensiven Temperaturabfall. Der Parallelismus zwischen der Wirkung der Schilddrüsen- und der Nichtschilddrüsenjodprodukte ist ein sehr weitgehender. — Die Frage der extrathyreoidalen Entstehung derartiger Jodverbindungen, z. B. bei der Jodaufnahme durch das Körpergewebe, wird diskutiert.

Abelin (Bern).^{oo}

Stella, Emilia: Azione della tirossina sulle penne del gallo e del cappone di razza „Golden laced Wyandotte“. (Wirkung des Thyroxins auf die Federn von Hähnen und Kapaunen der Rasse „Golden laced Wyandotte“.) (*Istit. di Zool., Univ., Roma.*) *Monit. zool. ital.* 45, 173—182 (1934).

Thyroxin bewirkt bei einmaliger Injektion von 4—10 mg bei Hähnen und Kapaunen der genannten Rasse die charakteristische Reaktion der Federn auf das Schilddrüsenhormon. Der Einfluß des Thyroxins zeigt sich sowohl in der Struktur wie in der Färbung der Rücken- und der Brustfedern. In der Fahne der Federn erfolgt reichliche Ablagerung des Melanin-

pigments. Die Brustfedern färben sich besonders im mittleren Teil. Bei genügender Thyroxinzufuhr (10 mg) wird das rote Lipochrompigment entfärbt. Die Wirkung des Thyroxins auf die Federn ist vollständig verschieden von jener des Ovarialhormons. Kuen (Wien).^{oo}

Storti, Edoardo: Stimolo ematogeno e propabile meccanismo d'azione degli estratti linfogangliari. (Hämatogene Stimulierung und wahrscheinlicher Wirkungsmechanismus von Lymphdrüsenextrakten.) *Monit. Endocrinologia* 2, 394—396 (1934).

Vgl. *Ber. Physiol.* 81, 681.

Bewegung, Reiz- und Sinnesphysiologie der Tiere.

Allgemeine Muskel- und Nervenphysiologie.

Buchthal, Fr., und T. Péterfi: Die Potentialdifferenzen einzelner lebender Muskelfasern im Ruhezustand und während der Kontraktion. (*Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol. Berlin-Dahlem.*) *Pflügers Arch.* 234, 527—543 (1934).

Mit einem Binantenelektrometer werden die elektrostatischen Verhältnisse an und in einzelnen lebenden Muskelfasern gemessen. Als Objekt diente hauptsächlich die seitliche Bauchwandmuskulatur des Frosches, die, etwas seitlich von der Rectusscheide durchschnitten, über eine Glaskammer gespannt wurde. Abtrennen des Peritoneum parietale, dann Untersuchung im Auflicht mit dem Schräglichtilluminator der Firma Busch. Kontrolle des Fortbestehens der Durchblutung, dabei ständige Berieselung mit physiologischer Lösung. Zur elektrometrischen Untersuchung feinerer Struktureinheiten Präparation einzelner Fasern des *M. obliquus externus*, Benutzung durchfallenden Lichtes. Fasern, deren Fascie abpräpariert ist, verlieren selbst unter den günstigsten Versuchsbedingungen (unbeschädigte Blutversorgung usw.) leicht ihre Lebensfähigkeit (Reizbarkeit), was sich histologisch an einem stärkeren Hervortreten der Querstreifung bemerkbar macht. Anwendung des Mikromaximulators mit unpolarisierbaren Agar-Mikroelektroden (1,5—2% Agar in NaCl oder Ringelektroden in Elektrodenhaltern, welche aus einer Kalomelmikroelektrode und einem mit konzentrierter KCl-Lösung gefüllten Verbindungsstück bestehen. Mündung der Elektroden 15—25 μ , für die Messungen an Struktureinheiten 1,5—2 μ Durchmesser. Beseitigung kapazitiver Störungen durch sorgfältige Erdungen und durch Einschalten von Schutzwiderständen von je 3 Megohm zwischen den Elektroden und dem Binanten. Die Verwendung der Meßelektroden gleichzeitig als Reizelektroden wird ermöglicht durch Einschalten eines Kondensators in den Reizkreis (günstigste Kapazität 170 cm). Dieser verhindert 1. den Ausgleich der Potentiale im Präparat über den Reizkreis, 2. sind die von ihm durchgelassenen Induktionsströme zu kurzdauernd, als daß das Elektrometer auf sie anspricht. In den lebenden quergestreiften Muskelfasern ist stets eine Potentialdifferenz, das sog. Ruhepotential nachweisbar. Dieses verschwindet, wenn die Muskelfaser abstirbt oder direkt narkotisiert wird. Die Potentialdifferenz nimmt bei wachsendem Elektrodenabstand bis zu einem Maximum zu. Sie ist am größten, wenn die Elektroden in die Muskelsubstanz selbst gedrückt werden. Das Sarkolemma hat ein verhältnismäßig geringes Isolierungsvermögen; die große Mehrzahl der Fascien sind jedoch so gut wie vollkommene Isolatoren für die elektrischen Ladungen in den einzelnen Muskelzellen. Ein Verletzungspotential tritt nur beim erstmaligen Anstechen einer Faser auf und verschwindet nach wenigen Sekunden wieder. Beim Einstechen der zweiten Elektrode tritt es nicht mehr in Erscheinung, sondern nur das Ruhepotential, das zu einem langsame, bis zu 1 Minute und mehr konstant bleibenden Ausschlage des Binanten führt. Das Ruhepotential ist nicht an glatten Muskelfasern nachweisbar, sondern nur an quergestreiften. Da seine Größe innerhalb gewisser Grenzen der Anzahl der zwischen den Elektroden liegenden Segmente proportional ist, und da es verschwindet, sobald durch Dehnung die Querstreifen körnig zerfallen, wird angenommen, daß es durch den Aufbau der Faser aus voneinander isolierten Muskelsegmenten bedingt ist. Während und noch einige Zeit nach der Kontraktion erfährt das Potential eine Änderung von 2—5 mV im Sinne einer negativen Aufladung der erregten Stelle gegenüber der unerregten. Auch unerregbare Fasern haben ein Ruhepotential, aber kein Kontraktionspotential. Das Kontraktionspotential ist nicht mehr nachweisbar, wenn geerdete und nicht geerdete Binantenhälfte durch einen Widerstand unter 10 Megohm überbrückt werden. Daraus läßt sich die maximale während der Kontraktion auftretende Stromstärke auf etwa 10^{-10} Ampere bei einer Spannung von 2—3 mV schätzen.

Wachholder (Rostock i. M.).

Szabuniewicz, Bozydar: Untersuchungen über die Polarisierung der Muskeln. *Bull. internat. Acad. pol. Sci., Cl. Méd.* Nr 6/10, 445—480 (1934).

Wenn ein Froschmuskel einer kurzen Einwirkung von lauwarmem Wasser ausgesetzt wird, dann zeigt eine Untersuchung der Potentialverteilung, daß der Muskel in einen für ihn eigentümlichen Polarisationszustand verfallen ist. Werden nämlich unpolarisierbare Elektroden (La piquésche Elektroden, die mit Spitzen aus Birkenschwamm versehen sind) verwendet, so wird, wenn die eine Elektrode an der Achillessehne liegt, die andere längs des Muskels

erschoben wird, eine bestimmte Verteilung der elektromotorischen Kräfte gefunden. Diese Verteilung der elektromotorischen Kräfte ist von der Art des polarisierenden Agens unabhängig, und hat für den Muskel den gleichen Verlauf, ob die Polarisierung durch kurzes Eintauchen in warmes Wasser oder durch Chemikalien, z. B. Quecksilbersalze, Kupfersalze oder besonders ortilhaft durch 5proz. Trichloressigsäure hervorgerufen wird. Wenn die Elektroden auf verschiedene Weise angelegt werden, so werden für das Potential der Muskelpunkte doch gleichartige Resultate erhalten: ob die beiden Elektroden dem Muskel anliegen oder die eine am Muskel, die andere außerhalb, so ist die Potentialdifferenz zweier beliebiger Punkte an der Muskeloberfläche gleich. Es kann durch die polarisierenden Eingriffe entweder der Muskel als Ganzes oder ein Teil des Muskels polarisiert werden: und zwar können longitudinale Abschnitte des Muskels in den Polarisationszustand versetzt werden, wobei die Grenze zwischen dem polarisierten und dem normalen Abschnitt scharf verläuft und längere Zeit erhalten bleibt. Dagegen werden parallel nebeneinander liegende Muskelabschnitte stets durch den Eingriff von der Oberfläche als Ganzes gleichzeitig polarisiert, mit anderen Worten, der Muskel wird stets mit seiner ganzen Dicke gleichzeitig polarisiert. Wenn das polarisierende Agens von der einen Seite des Muskels gewirkt hat, so wird die gegenüberliegende Oberfläche des Muskels ebenfalls und auf gleicher Weise polarisiert gefunden wie diejenige Oberfläche, welche dem polarisierenden Agens unmittelbar ausgesetzt worden ist. Der Polarisationszustand breitet sich also nicht längs der Muskelachse aus, sondern senkrecht dazu. Temporären Muskeln werden bei gleicher Einwirkung, z. B. beim Eintauchen in Ringerlösung von 50° in 15 Sekunden maximal polarisiert, Esculentenmuskeln erst nach 30 Sekunden; die gleiche Beziehung besteht auch in bezug auf das Auftreten der Wärmestarre. Die Elektronegativität einer verletzten Stelle wird durch das polarisierende Agens verringert; wenn ein Muskel maximal polarisiert ist, so kann man die Elektronegativität der verletzten Stellen überhaupt nicht feststellen. Die chemische Untersuchung von polarisierten Muskeln zeigt keine Veränderungen im Gehalt an Milchsäure, Ammoniak, anorganischen Phosphaten, kurz in denjenigen Verbindungen, welche im Zusammenhang mit der Muskelermüdung gebildet werden. Es folgt daraus, daß im Zusammenhang mit dem Auftreten der Polarisation jedenfalls keine tiefer greifenden Veränderungen im Muskel gefunden werden. Das Auftreten der Polarisation kann nur so gedeutet werden, daß die Muskelfasern eine bestimmte Asymmetrie besitzen, deren Sitz wahrscheinlich die Strukturelemente der Muskelfibrillen sind.

I. K. Parnas.

Gianni, Edgardo: Osservazioni sulle modificazioni del muscolo nell'inattività. (Beobachtungen über die Veränderungen des Muskels bei seiner Untätigkeit.) (Istit. di Pat. Chir., Univ., Milano.) Atti e Mem. Soc. lomb. Chir. 2, 1094—1106 (1934).

Kaninchen wird 10—30 Tage lang die eine Hinterextremität in gebeugter Haltung eingegipst. Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß in dem untätigen Glied die Trockensubstanz relativ zunimmt, ferner daß der Wassergehalt pro Gramm N mit steigender Dauer der Untätigkeit im Verhältnis zum anderen Glied stark abnimmt. (Die Tabelle zeigt, daß die Verhältnisse im eingegipsten Beine sich nach 10 Tagen nicht ändern und das Wachsen der Differenz durch eine Abnahme des N im „normalen“ Beine zustande kommt. D. Ref.) Wachholder.

Baeyer, Erich v., und Alexander v. Muralt: Lichtdurchlässigkeit und Tätigkeitsstoffwechsel des Muskels. (Inst. f. Physiol., Kaiser Wilhelm-Inst. f. Med. Forsch., Heidelberg.) Pflügers Arch. 234, 233—249 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. 81, 233.

Wöhlisch, Edgar, und Lothar Wirth: Zur Theorie der Wärmestarre des Skelettmuskels. (Physiol. Inst., Univ. Würzburg.) Pflügers Arch. 234, 466—468 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. 81, 233.

Namiki, Sukeshiro: Über den Kreatin-, Kreatinin-, Eisen- und Fettgehalt der Muskulatur von Fischen. (Biochem. Inst., Med. Fak., Nagoya.) Nagoya J. med. Sci. 7, 206—207 (1934).

Nach Zagami soll die Muskulatur derjenigen Teleostier, die sich viel bewegen und rasch und ausdauernd schwimmen, mehr Kreatinphosphorsäure enthalten als die der langsamer und weniger ausdauernd schwimmenden. Auch andere Autoren haben ähnliche Befunde erhoben und deutliche Unterschiede zwischen der roten und der weißen Muskulatur erhalten. Der Verf. fand in der gewöhnlichen Fischmuskulatur ähnliche Kreatinwerte wie in der weißen Kaninchenmuskulatur, und zwar doppelt soviel wie in der roten Fischmuskulatur. Beim Kreatinin bestanden keine Unterschiede. Die rote Muskulatur enthält dagegen wesentlich mehr Eisen und ebenfalls mehr Fett als die weiße.

Lehnartz (Frankfurt a. M.).

Fenn, Wallace O., und Doris M. Cobb: The potassium equilibrium in muscle. (Das K-Gleichgewicht im Muskel.) (Dep. of Physiol., School of Med. a. Dent., Univ., Rochester.) J. gen. Physiol. 17, 629—656 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. 81, 238.

Umschweif, B.: Sur les purines nucléoprotéïdiques dans le muscle. (Über die Nucleotidpurine des Muskels.) (*Laborat. de Chim., Univ., Łódź.*) Bull. Soc. Chim. biol. Paris **16**, 543—549 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. **81**, 237.

Lapicque, Louis: L'excitabilité propre du muscle sur le gastrocnémien de la grenouille. (Die Erregbarkeit der Muskelsubstanz des Froschgastrocnemius.) (*Laborat. des Physiol. Gén., Univ., Paris.*) C. r. Soc. Biol. Paris **116**, 620—624 (1934).

Die Methode von Mays [Pflügers Arch. **20** (1884)] zur histologischen Darstellung der intramuskulären Nervenverzweigungen läßt sich bei ausgehungerten Fröschen mit dünnen Muskeln auch auf den Gastrocnemius anwenden. Der distale Teil dieses Muskels wird nur von einem in der Tiefe längsverlaufenden Nervenzweig versorgt, der mit Ausnahme der Gegenseite an der Sehne nicht an die Oberfläche kommt. Man kann also nach Ansicht des Verf. hier ebenso wie am Beckenabschnitt des Sartorius die Muskelfaser selbst reizen. Wachholder.

Dale, H. H., and W. Feldberg: The chemical transmitter of vagus effects to the stomach. (Der chemische Überträger der Vaguswirkungen auf den Magen.) (*Nat. Inst. f. Med. Research, London.*) J. of Physiol. **81**, 320—334 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. **81**, 268.

Ara, Giorgio: Il riflesso di Pagano-Hering nel pollo. (Der Pagano-Heringsche Reflex beim Huhn.) (*Istit. di Fisiol., Univ., Milano.*) Arch. di Fisiol. **33**, 332—336 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. **81**, 289.

Roos, J., and S. Koopmans: Studies in the so-called electrical stunning of animals. (Untersuchungen über die sog. elektrische Betäubung von Tieren.) (*Laborat. f. Veterin. Physiol., Univ., Utrecht.*) Vet. J. **90**, 232—245 (1934).

Vgl. Ber. Physiol. **81**, 302.

Zentren.

Chauchard, A., B. Chauchard et Paul Chauchard: Recherches sur la subordination nerveuse. (Untersuchungen über die nervöse Subordination.) (*Stat. Zool., Villefranche-sur-Mer.*) C. r. Soc. Biol. Paris **115**, 1204—1206 (1934).

Bei quantitativen Untersuchungen über die Funktion der nervösen Zentren — Verff. arbeiteten an Krabben — ist es sehr wichtig, daß die chemischen und physikalischen Bedingungen, unter denen sich die Tiere befinden, möglichst den natürlichen gleichen. Ebenso dürfen die Tiere bei der Untersuchung nicht gefesselt sein, sondern müssen so gehalten werden, daß sie in ihren spontanen Bewegungen nicht behindert sind. Die Chronaxiewerte der motorischen Nerven, die man dann erhält, sind brauchbar, während sie bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften bis zum Zehnfachen schwanken können. Kälteschlafende Tiere und solche in schlechtem Zustande weisen lange Chronaxien auf, die von Durchschneidungen unabhängig sind. Brückengefesselte Tiere zeigen anfänglich kurze Chronaxie, die sich aber sehr schnell verlängert. Frische, kaum immobilisierte Krabben haben eine kurze schwankende Chronaxie vor der Durchschneidung der Verbindungsfasern zwischen Cerebral- und Bauchganglien; nach dieser wird die Chronaxie lang und schwankt nicht mehr.

H. Löwenbach (Berlin-Dahlem).

Tuge, Hideomi, and Masayasu Yazaki: Experimental note on the presence of electrically excitable areas in the reptilian cerebral hemisphere: *Clemmys japonica*. (Experimentelle Untersuchung über das Vorhandensein elektrisch erregbarer Gebiete in der Hirnhemisphäre von Reptilien, besonders *Clemmys japonica*.) Sci. Rep. Tôhoku Univ. IV, **9**, 79—85 (1934).

Aus vergleichend-neurologischem Gesichtspunkte verdient die Hirnrinde von Reptilien als Entwicklungsvorstufe des Neopalliums der Säuger und besonders hinsichtlich der Lokalisation motorischer Regionen großes Interesse. Es ist jedoch bisher nicht sicher erwiesen, ob durch elektrische Reizung distinkter Punkte der Hemisphären motorische Erregungen ausgelöst werden können. Hierüber Klarheit zu gewinnen, ist der Zweck der vorliegenden Untersuchung. Schildkröten wurden durch subcutane Injektion von Urethanlösung (1 g 25proz. Urethanlösung für je 50 g Tier) und Einlegen äthergetränkter Baumwollfäden in das Maul narkotisiert. Nach

Freilegung und Trocknung der Hirnoberfläche erfolgte kurzzeitige Reizung mit (eben zungenwirksamen) Induktionsströmen. Als differente Elektrode diente eine Platindrahtelektrode (0,3 mm Durchmesser) nach Sherrington, während die indifferente Elektrode eine dünne Metallplatte, auf der die Beine des Tieres mit feuchten Binden befestigt wurden, war. Von drei unterschiedlich großen Gebieten der Hemisphärenfläche konnten durch die elektrische Reizung motorische Erscheinungen bewirkt werden. Bei Reizung innerhalb eines etwa im Zentrum einer freigelegten Hemisphärenfläche gelegenen Areales erfolgte Kontraktion einer homolateralen Nackenmuskelgruppe und Hebung des Kopfes. Reizung eines etwas kleineren, medial und weiter nasal gelegenen Gebietes, das aber das erst beschriebene um ein geringes überlappt, bewirkte Kopfhebung. Die am meisten überzeugende Reaktion erfolgte bei Reizung eines kleinen, noch weiter nasal und medial gelegenen Abschnittes: die Öffnung des Maules. Dieses Gebiet von etwa 1 mm Durchmesser war aber nicht bei allen Tieren aufzufinden. Die Behauptung Johnstons [J. comp. Neur. 26 (1916)], daß bei Reptilien allein die elektrische Reizung der Lobi olfactorii wirksam sei, wurde nicht bestätigt. Von den Lobi olf. aus war kein motorischer Effekt erhältlich. Daß die von ihnen gesehenen motorischen Reaktionen rein corticalen Ursprungs seien, wagen die Autoren nicht mit Sicherheit anzunehmen, da die subcorticalen Verbindungen der von ihnen gefundenen erregbaren Gebiete unbekannt sind.

Nicolai (Königsberg i. Pr.).

Sinel'nikov, E., und T. Gugel'-Morozova: Eine neue Untersuchungsmethodik der Wirkung der Temperaturveränderungen des Blutes auf die Wärmezentren des Zwischenhirns. Fiziol. Ž. 17, 353—359 u. dtsh. Zusammenfassung 360 (1934) [Russisch].

Die nicht übereinstimmenden Meinungen der verschiedenen Forscher über die Frage, ob die Veränderungen der Temperatur des zum Gehirn zuströmenden Blutes als ein für die Wärmezentren spezifischer Reiz betrachtet werden können, veranlaßte die Verf. zu weiteren Untersuchungen in dieser Richtung, wobei sie von einer neuen Untersuchungsmethode Gebrauch machten (chronische Versuche an Hunden). Versuchsergebnisse: Durch Abkühlung des durch die Halsschlagadern durchströmenden Blutes auf 0,2—0,3° wird ein Herabsinken der Körpertemperatur bewirkt — in der Mundhöhle um 1,4°, im Rectum um 0,4°. Die Erwärmung des durchfließenden Blutes auf 0,2—0,4° führt zu einem Anstieg der Körpertemperatur; die Speichelabsonderung ist dabei vermehrt, die Lungenventilation und die Ausscheidung von Kohlensäure steigen an.

Alexander Lindberg (Leningrad).

Lutterotti, Maria: Kleinhirnexstirpation bei *Hyla arborea*. (I. Zool. u. Tierphysiol. Inst., Histol. Inst. u. II. Anat. Lehrkanzel, Univ. Wien.) Z. Zool. 145, 66—78 (1934).

Beim Laubfrosch ist infolge seines Baumlebens der Bewegungsapparat mehr beansprucht als bei *R. fusca*. Daher war anzunehmen, daß bei jenem Tiere eine Entfernung des Kleinhirnes deutlichere, in Koordinationsstörungen sich äußernde Ausfallerscheinungen verursacht. Diese Erwartung wurde durch die Versuche der Verf. bestätigt. Koordination und Muskeltonus waren nach völliger Entfernung des Kleinhirns (die nach Abschluß der Versuche ebenso wie die Unversehrtheit des benachbarten Mittel- und Nachhirns jedesmal kontrolliert wurde) gestört. Außerdem hat Verf. Kleinhirne von *Hyla arborea* und *R. fusca* mikroskopisch untersucht und miteinander verglichen. Es fand sich bei ersterer eine deutliche Gyrierung, welche bisher bei Amphibien noch unbekannt war, und die Zahl der Purkinjeschen Zellen war nahezu verdoppelt. Auch die Gesamtgröße des Hylakleinhirns übertrifft die des Ranakleinhirns. Die Frage, ob diese verhältnismäßig höhere Entwicklungsstufe des Kleinhirns bei *Hyla arborea* auf die Eigenart der Lebensweise oder auf die Artzugehörigkeit zurückzuführen ist, läßt Verf. offen.

H. Löwenbach (Berlin-Dahlem).

Sinnesorgane.

Frisch, K. v.: Über den Geschmackssinn der Biene. Ein Beitrag zur vergleichenden Physiologie des Geschmacks. Z. vergl. Physiol. 21, 1—156 (1934).

Unter Berücksichtigung der maßgebenden physiologischen Kriterien ist eine Duplizität des chemischen Sinnes der Insekten zu fordern. Untersucht wurde der orale Geschmackssinn der Biene. Einer eingeflogenen Schar wurde die zu prüfende (evtl. mit Schmeckstoffen versetzte) Zuckerlösung geboten und die Annahme und Ablehnung prozentual gewertet. Die Schwelle für eine reine Saccharoselösung liegt bei

$\frac{1}{4}$ mol. Konz., durch Hunger kann sie auf $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{16}$ mol. Konz. gesenkt werden. Unbeeinflusst bleibt der Schwellenwert durch Änderung des osmotischen Druckes, der Viscosität oder der Temperatur. Von 30 uns süß schmeckenden Zuckern werden nur 9 von der Biene als süß angenommen; wobei Glykose, Fructose und Maltose für sie etwa den gleichen Süßungsgrad besitzen wie für uns. Galaktose, Mannose (für die Biene giftig!), Lactose, einige Zuckeralkohole, Methylglykoside und Pentosen erscheinen der Biene geschmacklos oder haben einen unterschwelligen Süßungsgrad; dies ist dann der Fall, wenn ein Zusatz dieser Stoffe zu einer unterschwelligen Saccharoselösung diese „über die Schwelle hebt“. Nur die von der Biene als „süß“ angenommenen Zucker werden von ihr verdaut; die anderen Zucker haben einen geringen oder keinen Nährwert. Eine eindeutige Beziehung zwischen Süßgeschmack und chemischer Konstitution ließ sich nicht finden, zumal der Vergleich mit den Befunden an anderen Insekten zu keiner allgemeingültigen Gesetzmäßigkeit führt; jedoch scheint Ringform den Süßgeschmack zu begünstigen. Uns süß schmeckende Verbindungen, die keine Zucker sind (Saccharin, Dulcin u. a.), erscheinen der Biene nicht als süß. Biologisch interessant ist, daß im Blütennektar nur Zuckerarten enthalten sind, die von der Biene süß geschmeckt werden; die Konzentration ist hier stets überschwellig. — Säuren, Salze und Bitterstoffe wirken als Zusatz zu Rohrzuckerlösung vergärend; eine Bestimmung des wahren Schwellenwertes ist hierbei nicht möglich. Der Vergällungswert der Salzsäure ist $\frac{1}{160}$ n HCl; dies entspricht der Empfindlichkeit des Menschen. Vergleichsversuche mit anderen Säuren ergaben eine Bestätigung der Dissoziationstheorie, wonach die Intensität des Sauergeschmacks bei relativ gleichem H-Ionengehalt abhängig ist vom Dissoziationsgrad der Säure. Der Vergällungswert einer $\frac{1}{80}$ n-Salzsäure ist für die Biene der gleiche wie für eine $\frac{1}{5}$ n-Essigsäure, obwohl die Salzsäure 7 mal mehr freie H-Ionen enthält, jedoch stärker dissoziiert ist. Der Schwellenwert für Kochsalz liegt etwas unter dem des Menschen, wie sich aus dem Grad der Magenfüllung mit durch Kochsalz vergällter Zuckerlösung ergab. Versuche mit Bitterstoffen zeigten, daß die Biene für Chinin weniger empfindlich ist als wir; Zuckerlösung mit einem Zusatz von $\frac{1}{500}$ mol. Chinin hydrochl. wird von manchen Bienen noch getrunken. Für andere Bitterstoffe (Salicin, Arbutin, Colocynthin u. a.) ist die Empfindlichkeit noch geringer; Cocain erscheint jedoch den Bienen wesentlich bitterer als uns. Daß die Biene die vier Geschmacksqualitäten als solche zu unterscheiden vermag, konnte durch eine Reihe sinnreicher Versuche (Summationsmethode) erwiesen werden. Innerhalb des „Bitter“geschmacks dürften sogar zwei getrennte Qualitäten anzunehmen sein. Die umfangreiche Arbeit faßt die Ergebnisse 10 jähriger mühevoller Kleinarbeit vorbildlich zusammen und gibt in Tabellenform eine vergleichbare Übersicht der wichtigsten Befunde.

R. Seifert (Greifswald).

Ludwig, Wilhelm: Seitenstetigkeit niederer Tiere im Ein- und Zweilichtversuch. I. (Lymantria dispar-Raupen.) (Zool. Inst., Univ. Halle a. S.) Z. Zool. 144, 469—495 (1933).

Lymantria-Raupen gelangen durch einen abgedunkelten Laufkanal in einen geräumigen Dunkelkasten, der von 1 oder 2 Lampen erhellt ist. Im Einlichtversuch kriecht die Mehrzahl (19 von 20) der stets positiv phototaktischen Tiere nicht direkt auf das Licht zu, vielmehr schließen ihre anfangs geraden oder nur schwach gekrümmten Bahnen mit der Lichtlinie (= Verbindungslinie Startpunkt—Lampe) einen Winkel (Divergenzwinkel) bestimmter Größe ein, der von der Lampenstellung fast unabhängig ist. Die Kriechbahnen verlaufen also rechts oder links von der Lichtlinie, und diese Seitenstetigkeit, sowie auch die Größe des Divergenzwinkels ist für ein Tier innerhalb einer gewissen Zeitspanne konstant. Innerhalb länger dauernder Versuche aber kann die Divergenz stetig zu- oder abnehmen, einmal wurde sogar kontinuierlicher Übergang zwischen L.- über Gerad- zu R.-Läufigkeit beobachtet. Also kann diese Asymmetrie nicht morphologisch bedingt sein. Vielmehr zeigt sie mit der Lichtkompaßbewegung (Meno-taxis) nahe Verwandtschaft (inzwischen konnte mittels exakterer Apparatur die Identität

beider nachgewiesen werden. Ref.). Im Zweilichtversuch verlaufen die Bahnen eines rechts- (bzw. links-) läufigen Tiers rechts bzw. links von der Resultierenden beider Lichter, so daß z. B. ein rechtsläufiges Tier stets in der Nähe der rechten Lampe landet. Dies kann also Telotaxis (mit Bevorzugung eines der beiden Lichter) vortäuschen, obwohl eine solche gar nicht vorliegt.

Autoreferat.

Schiller, Paul v.: Kinematoskopisches Sehen der Fische. (*Ungar. Biol. Forschungsber., Thihany.*) Z. vergl. Physiol. 20, 454—462 (1934).

Läßt man an 2 verschiedenen Stellen im Raume zwei Lichtpunkte nacheinander aufblitzen, so sieht der Mensch bei sehr schneller Aufeinanderfolge der Reize beide gleichzeitig (Simultanstadium), bei sehr langsamer beide nacheinander aufleuchten (Sukzessivstadium), während bei einer bestimmten, dazwischen liegenden Geschwindigkeit der Abfolge — wobei es nach früheren Untersuchungen des Verf. wesentlich auf das Verhältnis zwischen Expositionszeit der Einzellichter und Unterbrechungsdauer ankommt — etwas völlig Neues auftritt: der uns vom Kino her geläufige „kinematoskopische Effekt“, bei dem nur ein einziger Lichtpunkt gesehen wird, der sich vom Ort des ersten zum Ort des zweiten dargebotenen Lichtreizes bewegt. Obwohl in diesem Falle der Reiz nur zwei nicht benachbarte Netzhautstellen nacheinander trifft, unterscheidet sich die Wahrnehmung in nichts von der eines reell bewegten Lichtpunktes, bei der sämtliche zwischen den beiden Endpunkten gelegenen Netzhautstellen sukzessiv gereizt werden. Da es noch strittig ist, ob dieser Effekt beim Menschen rein peripher oder unter Mitwirkung corticaler Prozesse zustandekommt, schien es dem Verf. von Interesse, sein Auftreten bei Tieren ohne entwickelten Cortex zu studieren. Elritzen wurden zu diesem Zweck in mehreren Versuchsreihen auf je eine von 2 gleichzeitig gebotenen Konstellationen dressiert, wobei als Kriterium immer die menschliche Wahrnehmung diente. Eine für uns optimale kinematoskopische Bewegung wurde dadurch hergestellt, daß jeder der beiden Lichtpunkte etwa 250 σ lang exponiert wurde, während das Intervall nur $\frac{1}{8}$ dieser Zeit, nämlich 31 σ betrug; die übrigen Einzelheiten der Versuchsanordnung müssen im Original nachgelesen werden. Sehr gut gelangen folgende Dressuren: Kinematoskopische Bewegung gegen simultane Konstellation, reelle Bewegung gegen simultane Konstellation, reelle Bewegung gegen sukzessive Konstellation; nach gelungener Dressur konnte die kinematoskopische Bewegung durch reelle ersetzt werden und umgekehrt, ohne daß das Verhalten des Fisches sich änderte. Dressur auf kinematoskopische Bewegung gegen reelle mißlang vollständig, einerlei, ob der Fisch vorher anderweitig dressiert war oder nicht. Damit ist bewiesen, daß die Elritzen eine kinematoskopische Bewegung sowohl von einer sukzessiven, als auch von einer simultanen Konstellation, nicht aber von einer reellen physikalischen Bewegung unterscheiden, daß also auch für niedere Wirbeltiere ohne ausgebildeten Cortex das sukzessive Auftauchen zweier voneinander unabhängiger Lichter in gewisser Zeitfolge genügt, um ein Bewegungsssehen hervorzurufen. Da die Zeitbedingungen für Fisch- und Menschenauge ähnlich zu sein scheinen, dürfte auch die Rezeptionsträgheit der beiden Sehapparate ungefähr übereinstimmen. (Vgl. diese Ber. 29, 492.)

Dora Ilse (München).

McNally, W. J., and John Tait: Function of the utricular maculae of the frog. (Funktion der Maculae utriculi des Froschs.) (*6. réun. scient. du Collegium Oto-Rhino-aryngologicum Amicitiae Sacrum, Prague, 3.—6. IX. 1933.*) Acta oto-laryng. (Stockh.) 40, 73—76 (1934).

Zur Untersuchung der Tätigkeit der Maculae utriculi setzten Verff. bei einer Serie von Fröschen durch Nervendurchschneidung außerhalb des häutigen Labyrinths 7 Rezeptoren auf jeder Seite außer Funktion, während die beiden Nerven zu den Maculae utriculi allein erhalten blieben. Bei einer zweiten Serie von Fröschen wurden nur die beiden Nerven zu den Maculae utriculi durchtrennt. Die Experimente wurden in der Weise ausgeführt, daß die gleichen 2 Operationsarten nur auf einer Seite ausgeführt wurden, während das Labyrinth auf der entgegengesetzten Seite in jedem Fall intakt gelassen wurde. Wird ein Frosch der ersten

Art der beiderseitigen Operation unterworfen, zeigt er sehr schwere und sehr deutliche Gleichgewichtsstörung; bei dem geringsten Versuch einer Bewegung schwankt er heftig in rhythmischer Weise entweder in anteroposteriorer Richtung, in lateraler Richtung oder in diagonaler Richtung. Wenn jedoch nur die Nerven zu den beiden Maculae utriculi durchschnitten wurden, zeigt das Tier weit geringere Gleichgewichtsstörung. Solange der Frosch mit nur 2 Maculae utriculi ruhig bleibt, behält er eine froschartige Haltung bei. Nur wenn er selbst sich zu bewegen anfängt oder wenn er künstlich einer Lageänderung unterworfen wird, tritt die heftige und qualvolle Pendelbewegung seines Körpers ein. Deswegen und auf Grund einer Anzahl anderer analoger Tatsachen glauben Verff., daß die Nerven der Maculae utriculi unter gewöhnlichen Umständen, d. h. wenn der Körper in Ruhe ist, nicht in Tätigkeit treten. Die Maculae utriculi werden nur erregt, wenn irgendeine effektive Lageveränderung des Kopfes eintritt. Das Ergebnis ihrer Tätigkeit ist dann das Aufgeben einer gegebenen Körperhaltung und Wiedereinnahme einer differentiellen Haltung. Normal werden die antikompensatorischen Reaktionen, die als Resultat leichter Berührung der Maculae utriculi hervorgerufen sind, durch die vertikalen Kanäle entgegengesetzt beeinflußt. Vertikalkanäle und Maculae utriculi halten einander eine Art physiologisches Gleichgewicht. Die beiden Vertikalkanäle der rechten Seite arbeiten antagonistisch zu den Maculae utriculi der linken Seite und umgekehrt. Die Maculae utriculi oder eine einzige Macula utriculi reagiert gar nicht auf eine einfache Drehung des Kopfes um eine vertikale Achse; in konsequenter Weise kann man schließen, daß die Maculae utriculi nicht in Übereinstimmung mit den Horizontalkanälen funktionieren. Endlich ist ein Frosch, dem nur die beiden Maculae utriculi entfernt wurden, unfähig, während eines Falles aus geringe Höhe seinen Körper so zu orientieren, daß er wie ein normales Tier zu Boden kommt.

Ittmann (Mainz).^{oo}

Ashcroft, D. W., and C. S. Hallpike: On the function of the sacculus. (Über die Funktion des Sacculus.) (*Ferens Inst. of Otol., Middlesex Hosp., London.*) *J. Laryngol. a. Otol.* **49**, 450—458 (1934).

Ashcroft, D. W., and C. S. Hallpike: Action potentials in the saccular nerve of the frog. (Aktionenströme im Saccularnerven des Frosches.) (*Ferens Inst. of Otol., Middlesex Hosp., London.*) *J. of Physiol.* **81**, 23 P—24 P (1934).

Verff. besprechen zunächst kurz die historische Entwicklung der Anschauungen über die Funktion des Sacculus von 1. Mach, Breuer und Crum Brown, 2. von Parker und v. Frisch, 3. von Magnus und de Kleijn und 4. schließlich von Versteegh, McNally und Tait. Sie eröffnen das Froschlabyrinth nach der Methode von Schrader und McNally von der Mundhöhle aus unter Benutzung eines Mikromanipulators und durchschneiden den Sacculusnerv. Der periphere Stumpf wird auf eine Platinelektrode gelegt, die zweite an der Haut und über einen Verstärker zu einem Kathodenstrahloszillographen abgeleitet. Auf Drehung und Neigung traten keine Aktionsströme auf, hingegen auf Erschütterungen (Fußstampfen, Stimmgabeln). Frequenzen bis 500 werden treu wiedergegeben. Es werden Beweise dafür gebracht, daß es sich um echte Aktionsströme handelt, und deshalb wird geschlossen, daß der Sacculus beim Frosch ein Organ zur Vermittlung von Vibrationen sei. Verff. schließen sich der Vermutung von Tait an, daß der Sacculus beim Menschen an der Tonrezeption über die Knochenleitung beteiligt sei. Die daraus sich ergebenden Folgerungen betreffs des Problems der Knochenleitung und der Tonperzeption im allgemeinen werden erörtert. Man vermutet, daß sowohl der Telephon- wie der Resonanzmechanismus beim psychologischen Vorgang der Tonunterscheidung eine Rolle spielen.

M. H. Fischer (Berlin-Dahlem).

Das Verhalten der Tiere. Vgl. Psychologie.

Subklew, Werner: Reizphysiologisches Verhalten der Larve von *Agriotes obscurus* L. (Zweigstelle d. Biol. Reichsanst. f. Land- u. Forstwirtschaft, Kiel.) *Z. vergl. Physiol.* **21**, 157—166 (1934).

Mit älteren Larven von A. o. wurden einfache reizphysiologische Versuche gemacht. In langen, verschieden stark geneigten Röhren zeigten die Larven deutlich positiv Geotaxis. (Larven von *Athous niger* verhielten sich ebenso.) Bei einseitiger Beleuchtung und im Lichtgefälle waren die Larven negativ phototaktisch. Die Laufgeschwindigkeit war im Hellen größer als im Dunklen. Auf Berührung reagierten die Larven durch Flucht oder Einnahme einer typischen Verteidigungsstellung. Bei Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen rauen Untergründen wurde der rauhere Grund bevorzugt (Sand vor Filtrierpapier und Filtrierpapier vor Glas). Loser Sand wurde festgeklebtem oder festgestampftem vorgezogen. Unter vier verschiedenen groben Sorten festgeklebten Sandes wählten die Larven die rauheste Fläche. Die Tiere sind also stark positiv thigmotaktisch. In einem Luftfeuchtigkeitsgefälle (Liebig-Kühle

it Calciumchlorid an der einen und nasser Watte an der anderen Seite) hatten sich le (25) Larven nach einer Stunde am feuchten Ende angesammelt. K. Herter.

Beecken, Walter: Über die Putz- und Säuberungshandlungen der Honigbiene (*Apis mellifica*). (Zool. Inst., Univ. Kiel u. Schleswig-Holstein. Versuchs- u. Lehranst. Bienenzucht, Bad Segeberg.) Arch. Bienenkde 15, 213—275 (1934).

Verf. schildert zunächst den Reinigungsvorgang und sucht ihn zu analysieren. Sodann weist er nach, welche Umstände die Biene veranlassen, sich zu putzen. Diese bedient sich zur Säuberung des eigenen Körpers niemals der Mundwerkzeuge, sondern ausschließlich der Beine, an denen sich außerordentlich hochentwickelte Putzorgane befinden. Und zwar besitzen: 1. das Vorderbein an der Tibia die Putzscharte, am Metatarsus den Dorn; 2. das Mittelbein ebenfalls einen Dorn, und zwar am Ende der Tibia; 3. das Hinterbein die Fersenbürste. Die allgemeine Säuberung, welche in der Regel von vorne nach hinten erfolgt, geht nach folgendem Schema vor sich: 1. Putzen des Kopfes und seiner Anhänge mittels der Vorderbeine; 2. Abgabe der Schmutzstoffe an die Mittelbeine der entsprechenden Seite; 3. Durchziehen der Mittelbeine zwischen den Metatarsen der Hinterbeine; 4. Aneinanderreiben der Hinterbeinmetatarsen. — Im besonderen putzt sich die Biene folgendermaßen: 1. die Antennen mittels der Putzscharte; 2. die Augen und Maxillen mittels der Vorderbeintarsen; 3. den Thorax (außer Notum) mittels der Mittelbeintarsen; 4. das Abdomen mittels der Hinterbeinmetatarsen; 5. die Vorderbeine durch Aneinanderreiben der Tarsen oder — nach Säuberung der Antennen mittels der Putzscharte — mit dem Dorn des Mittelbeines; 6. die Hinterbeine durch Aneinanderreiben; 7. die Flügel durch Flügelschlagen und mittels der Hinterbeine. — Königin und Drohne nehmen nur eine unvollkommene Selbstsäuberung vor; sie beschränken sich dabei auf Antennen, Augen und Pleurae. — Sexuelle Putzunterschiede bestehen nicht. Individuelle Unterschiede sind selten. — Bei Ausfall eines Körperteiles erfüllen andere Effektoren die Funktion. Nur bei weniger wichtigen Organen unterbleibt unter Umständen die Säuberung. — Die Putzhandlungen sind ebenso zweckmäßig wie einfach. Die Antennen werden als wichtigste Organe vor jeder Tätigkeitsaufnahme zuerst geputzt. Bei einem Berührungs- oder Beschmutzungsreiz geraten sämtliche für die Säuberung notwendigen Organe in Bewegung und zwar ganz unabhängig vom Putzerfolg. Die Putzreflexe sind also zu Ketten verknüpft. — Die Biene wird, außer durch Berührung und Beschmutzung, durch jede Änderung des Mediums (Temperatur, Luftdruck, Luftzusammensetzung und Lichtintensität) zum Putzen veranlaßt. — Eine gegenseitige Säuberung der Bienen findet in der Regel nur statt, wenn die Schmutzstoffe im Stock verwertbar sind, also nach Beschmutzung mit Honig, Zuckerlösung, Pollen und Kittharz. — Die Säuberung des Stockes erfolgt in erster Linie zur Beseitigung der Hindernisse, welche die den Stock verunreinigenden Gegenstände den Bienen beim Ein- und Ausflug bereiten. Körper, die sich nicht hinausschaffen lassen, werden beiseite geschafft. Ist dies nicht möglich, so werden sie, wenn sie verweslich sind, mit Propolis überzogen. v. Rhein.

Grabensberger, Wilhelm: Der Einfluß von Salicylsäure, gelbem Phosphor und weißem Arsenik auf das Zeitgedächtnis der Ameisen. (Zool. Inst., Univ. Graz.) Z. vergl. Physiol. 20, 501—510 (1934).

In Fortführung früherer Versuche über den Einfluß von Temperatur, J. dthreoglobulin und Euchinin auf das Zeitgedächtnis von auf 24-Stunden-Rhythmus dressierten Tieren werden jetzt mit gleicher Methode einige andere Stoffe auf ihren Einfluß auf den zeitlichen Ablauf des Stoffwechsels untersucht. Verfütterte Salicylsäure bewirkt früheres Erscheinen an der Futterstelle, desgleichen 0,001% gelber Phosphor und Arsenik in 0,00085%, 0,001% und 0,002% Konzentration; dagegen bleibt der Zeitrhythmus bei Arsenik 0,0001% und 0,00075% gleich, und verlängert sich bei 0,0005%. Verf. empfiehlt Ameisen als Test zur Feststellung der stoffwechsel fördernden oder -hemmenden Wirkung einer Substanz. (Vgl. diese Ber. 29, 251.)

v. Holst (Frankfurt a.M.).^{oo}

Essen, Jac. van: Das Problem des tierischen Raumgedächtnisses. (Psychol. Inst. Univ. Amsterdam.) Z. Psychol. 132, 335—348 (1934).

Auf Grund von Beobachtungen an nichtdressierten Tauben, die im Freien es

nicht wagen, Futter aufzupicken, das weniger als $\frac{1}{2}$ m vom fütternden Menschen entfernt liegt, werden Betrachtungen über das tierische Raumgedächtnis angestellt. Die Tauben entfernen sich gewöhnlich bis auf 20, ja 50 m, behalten aber den Platz und das Futter im Gedächtnis und kehren sofort dorthin zurück, sobald sich der Mensch entfernt hat. Es wird angenommen, daß der Futterplatz stark lustbetont und dinghaft, alles in der Umgebung vorhandene aber zu unlustbetonten, untergeordneten allerdings ebenfalls dinghaften Ernährungsobjekten degradiert wird und daher eine abstoßende Wirkung ausübt. Als treibende Kraft wirkt die Neigung zum psychomotorischen Abreagieren der Aufregung über das Nichterreichenkönnen der Nahrung. Der Einfluß der Ausweichreaktion gegenüber der negativwirkenden Umgebung nimmt zu. Die Ausweichreaktion ist ein Steuerungsmoment in dem Vorgang des Wiederaufsuchens des Futterplatzes. Es ist, als ob die Umgebung das Tier zurückstoße und der Richtung zum Futterplatz hin, wobei der Raum, wie beim Menschen, für den Vogel stillsteht. Dessen Bewegung im Raum ist raumverantwortet. Alle Momente in der Umwelt des Tieres sind übergeordnete Ernährungsobjekte, die in einem Fond von untergeordneten Erfahrungsmomenten eingebettet sind, deren Funktion ist, so sehr selbstverständlich zu sein, daß das Tier sich ganz auf die übergeordneten Ernährungsobjekte konzentrieren kann. Die Dinghaftigkeit der letzteren ist in ihrem Signalwert für die Förderung des Körperwohlbefindens gelegen, soweit das von äußerlichen Faktoren abhängig ist. Die Lustbetonung verleiht den Dingen einen physiognomischen Wert: sie sind ein Hinweis-auf. Die Dressur der Wegfindung ist zu umschreiben als die künstlich eingeleitete Bildung von neuen übergeordneten Ernährungsobjekten, die in bezug auf ihr eigenes „im Raume-sein“ und das „im Raume-sein“ des Tieres räumlichen Signalwert im Sinne von „Hinweis-auf“ bekommen können. Der Affektzustand, in den das Tier durch das Sehen von Futter kommt, wirkt strukturierend auf seine räumliche Orientierung ein.

Hempelmann (Leipzig).

Doreus, Roy M.: A new device for studying motivation in rats. (Eine neue Anordnung zur Untersuchung der Motivation bei Ratten.) (*Psychol. Laborn., Johns Hopkins Univ., Baltimore.*) *J. comp. Psychol.* **18**, 149—151 (1934).

Beim Studium der Antriebe hat man diese nach dem treibenden Wert verschiedener Reizarten in Rangordnungen zu bringen gesucht. Elektrischer Strom, Kälte, Wärme und Distance sind solchen Antrieben wie Hunger, Durst, Geschlecht und Aktivität gegenübergestellt worden. Während die Triebe natürliche Funktionen des Organismus sind, werden bei den zu vergleichenden Maßzwecken aufgestellten Skalen gewöhnlich Begriffe wie Strafe oder ungewöhnliche Arten von Anreizen benutzt, an die das Tier sich immer erst anpassen muß. Es wurde deshalb eine Apparatur zusammengestellt und beschrieben, die diesen Umstand vermeidet, bei der die natürliche Aktivität so verwendet wird, daß das Versuchstier nur ein Minimum zu lernen hat. Die Summe der spontanen Aktivität der Ratten wird dabei als Maßstab für den relativen Wert der verschiedenen Antriebe benutzt. Es handelt sich im Prinzip um einen Trommelkäfig, der durch die infolge ihrer Aktivität laufende Ratte in Drehung versetzt wird, und um zwei zu dessen Seiten angebrachte Gitterkäfige, mit denen als Antriebe dienenden Reizen, die durch das Drehen des Trommelkäfigs zugänglich gemacht werden. Die einzige Aufgabe, die das Tier zu lösen hat, besteht darin, daß es die Entdeckung machen muß, daß weiteres Laufen in der Trommel ihm das andere Antriebsmittel zur Stelle schafft.

Hempelmann (Leipzig).

Brock, Friedrich: Jahrmarktsdressur wilder Mäuse als Grundlage einer wissenschaftlichen Verhaltensanalyse. (*Inst. f. Umweltforsch., Univ. Hamburg.*) (*36. Jahresvers. d. Dtsch. Zool. Ges. E. V., Greifswald, Sitzg. v. 22.—24. V. 1934*) *Zool. Anz. Suppl.* **Bd 7**, 235—246 (1934).

Nach einer kurzen Kritik der aus der Literatur bekannten zahlreichen Versuche, bei denen die Wirkung des Umfeldes und das Verhalten von Tieren eine Rolle spielt, wird zunächst die Methode beschrieben, nach der ein Jahrmarktschausteller, ein durch keine wissenschaftliche Einstellung vorbelasteter Laie, wilde Hausmäuse zu dressieren pflegt. Der weitgehendste Unterschied zwischen dieser Dressurmethode und den gewöhnlich in wissenschaftlichen Arbeiten angewandten Forschungsweisen besteht darin, daß hier nicht auf Futter dressiert wurde. Vielmehr wird die Aktivität ausgenutzt.

Stelle des Futters aber vertritt der Nestkasten als Heim. Die weitere Dressur, der die geforderten Leistungen sich unmittelbar an biologische Vorgänge anschließen, liegt darin, daß die Tiere mit biologisch bedeutsamen Umweltmarken vertraut gemacht werden, mit einem Unterschlupf, einer Warte, einer Zuflucht. Diese Marken sollten für die Mäuse eine verschiedene „Tönung“, so daß die Tiere ihr Verhalten entsprechend einrichten. Die ganze Methode ist also eine sinnvolle Transposition bestimmter Planzusammenhänge zwischen verschiedenen Umweltmarken der Mäuse in das Experiment.

Hempelmann (Leipzig).

Tellier, Mariette: L'intelligence des singes inférieurs. La vision des formes et la généralisation. (Die Intelligenz der niederen Affen. Das Formensehen und die Verallgemeinerung.) (*Laborat. de Psychol. Animale, Univ. Liège.*) Mem. Soc. Roy. Sci. Liège, III. s. 19, H. 1, 1—76 (1934).

Als Versuchstiere dienten ein männlicher *Macacus sinicus* und ein weiblicher *Macacus rhesus*, die durch Belohnungen in Gestalt eines Mehlwurms oder eines kleinen Stückes einer Banane dazu veranlaßt wurden, unter ihnen vorgelegten geometrischen Figuren, schließlich auch Strichzeichnungen und Bildern von Tieren und Pflanzen die Wahl zu treffen. Wenn der Affe veranlaßt wird, in Beziehung zu einem Objekt seiner Umgebung zu treten, so nimmt er davon zunächst nur den sehr unbestimmten Gegensatz zum umgebenden Rahmen auf und behält ihn. Durch allmähliche Steigerung der Schwierigkeit der Aufgaben läßt er sich dann dahin bringen, geometrische Formen zu unterscheiden und sogar Tiere vor Pflanzen auszuwählen. Aber immer verallgemeinert er zunächst, so daß es den Anschein hat, als sei diese Generalisation etwas sprunghaftes. Psychologisierend könnte man sagen, daß er zunächst von allgemeinen Ideen, dann erst durch Bilder zu seinen Handlungen bestimmt wird. Hempelmann.

Formwechsel.

Physiologie der Fortpflanzung und Befruchtung. (*Erscheinungsformen der Sexualität, Paarung, Zeugung, Befruchtung, Brutpflege.*)

Hartmann, Max: Beiträge zur Sexualitätstheorie. Mit besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse von Fr. Moewus. Sitzgsber. preuß. Akad. Wiss., Physik.-math. Kl. 18/20, 379—400 (1934).

Unter Voranstellung seiner Grundauffassungen der Sexualität, der bisexualen Potenz und der relativen Stärke der Geschlechtsrealisierung bringt der Verf. im 1. Teil seines Vortrags den an Hand von Vitalfärbungen gewonnenen Beweis, daß bei *Ectoparus alliculosus* stets nur Gameten verschiedener Pflanzen miteinander kopulieren, daß also auch hier stets 2 Gametensorten auftreten und nicht der „Reifezustand“ der Kopulation entscheidet. Im 2. Teil werden von Moewus durchgeführte Kreuzungen von *Chlamydomonas*-Arten besprochen, deren Ergebnisse für die Sexualitätstheorie des Verf. von außerordentlicher Wichtigkeit sind. Bei der Art *Chl. paupera* treten in jedem Geschlecht 3 Rassen genotypisch bestimmter Stärke auf, von denen die starken und die schwachen innerhalb desselben Geschlechts untereinander Gruppen bilden, ein augenfälliger Beweis für relative Sexualität. Artkreuzungen waren möglich einerseits zwischen *Chl. paradoxa* und *pseudoparadoxa*. Bei dieser Kreuzung gibt es freie Aufspaltung von Form des Flagellaten, Form der Zygote und Art des Geschlechts. Bei der Kreuzung zwischen *Chl. paupera* und der subdiözytischen Rasse von *Chl. eugametos* tritt ebenfalls freie Umkombination einer Reihe von Faktoren (Form des Chromatophoren, Auftreten von Pyrenoid und Augenfleck) auf, wobei bemerkenswert ist, daß das Geschlecht von *eugametos* stets mit dem Auftreten des Augenflecks verknüpft ist. Da jeweils 2 der 4 Abkömmlinge einer Zygote gleich sind, erfolgt die Reduktion im 1. Teilungsschritt. Ganz abweichende Ergebnisse ergab die Kreuzung zwischen *paupera* und der subdiözytischen Rasse von *eugametos*. (Diese Rasse ist ebenfalls genotypisch getrennt geschlechtlich, doch er-

folgen Kopulationen innerhalb der Klone jeden Geschlechts. Stets bleiben aber Resameten des jeweils erblich festgelegten Geschlechts übrig.) Hier gehen aus jeder Zygote immer nur 2 unter sich gleiche Flagellaten hervor, die bei Berücksichtigung aller Zygoten der gleichen Kreuzung zwar morphologisch 16 Typen bilden (freie Kombination von 4 morphologischen Faktoren), bei allen aus derselben Kreuzung aber das gleiche Geschlecht aufweisen. Dasselbe Verhalten zeigen die F_2 - und F_3 -Haplonten. Erst in der F_4 tritt plötzlich eine Aufspaltung ein, wobei je nach der Stärke der in den verschiedenen Generationen eingekreuzten Rassen aus derselben Kreuzung eine große Mannigfaltigkeit von Geschlechtsstärken auftritt. Sowohl genetisch wie cytologisch ließ sich der Nachweis führen, daß dies seltsame Verhalten auf einer Sammelchromosomenbildung der Geschlechtschromosomen beruht: Die Geschlechtschromosomen bleiben bei der 1. Zygotenkernteilung vereinigt, der Kern, der keines bekommen geht zugrunde. Durch die 2. Teilung entstehen 2 gleiche Flagellaten. In den folgenden Generationen treten erst 3, zuletzt 4 Geschlechtschromosomen zusammen, und erst in diesem letzten Fall erfolgt eine Aufspaltung, bei der alle Verteilungskombinationen (0:4, 3:1, 2:2 Geschlechtschromosomen) möglich sind. Die Geschlechtsstärke ist nun jedesmal gleich der Summe der Stärke der einzelnen Realisatoren (z. B. $+^3-^1-^1=+^1$). Dieses Ergebnis trifft für alle verschiedenen Kreuzungen zu. Bemerkenswert ist es, daß Kombinationen, die ± 0 ergeben, phänotypische Geschlechtsbestimmung zeigen (z. B. $+^3-^2-^1=0$). Für weitere wichtige Einzelheiten muß auf die Abhandlung und die späteren Originalmitteilungen verwiesen werden.

H. Bauer (Berlin-Dahlem).

Drew, Kathleen M.: Contributions to the cytology of Spermothamnion Turneri (Mert.) Aresch. I. The diploid generation. (Beiträge zur Cytologie von Spermothamnion Turneri [Mert.] Aresch. I. Die diploide Generation.) (*Cryptogamic Research Laboratory, Univ., Manchester.*) *Ann. of Bot.* 48, 549—573 (1934).

Gleich dem von Schussnig und Odle unlängst untersuchten *Spermothamnion roseolum* trägt auch das auf anderen Algen epiphytisch wachsende *Sp. Turneri* Sexualorgane und Tetrasporangien auf ein und derselben Pflanze nebeneinander und erschließt deshalb für eine cytologische Untersuchung besonders interessant; zur Bearbeitung eigneten sich vor allem losgerissene Zweigstücke, bei denen die räumliche Nähe von Tetrasporangien und Gametangien oft so weit geht, daß bisweilen ein Tetrasporangium sich aus einer Zelle des Prokarpis entwickelt. Antheridien tragende Äste sind hingegen an sicher als diploid erkannten Pflanzen nur selten zu finden. Obwohl die Tetrasporen an sich leicht keimen, sind ausgewachsene haploide Pflanzen im Freien nicht zu finden. Es ist daher nicht feststellbar, ob diese — wie die diploiden Pflanzen — beiderlei Fortpflanzungsorgane tragen können. Im einzelnen ergab die cytologische Untersuchung der somatischen Kerne die für Florideen außergewöhnlich hohe Chromosomenzahl von 60 (diploid). Die Cytologie der Tetrasporangien zeigt einwandfrei, daß der Tetrasporenbildung eine Reduktionsteilung vorangeht. Versuche, im Laboratorium haploide größere Pflanzen zu erhalten, schlugen fehl, da die Keimlinge meist auf dem 3- oder 4-Zellstadium stehenbleiben. Die an den Prokarpasten zur Entwicklung gelangenden Karpogonien sind diploid, eine Reduktionsteilung geht ihrer Bildung nicht voraus. Dementsprechend entstehen bei der Fusion des Eikernes mit dem Spermakern tetraploide Gonimoblasten; ganz ausnahmsweise werden auch triploide gefunden! Für die Existenz eines regelmäßigen Generationswechsels zwischen haploider und diploider Generation, etwa wie bei *Polysiphonia*, sind bisher keinerlei Anhaltspunkte vorhanden. Dagegen wird von der Verf. die Möglichkeit eines Alternierens zwischen tetraploider und diploider Generation offen gelassen. Es handelt sich also um durchwegs diploide Pflanzen, welche zweierlei Sporen produzieren — einerseits haploide Tetrasporen und andererseits tetraploide Karposporen. Die Tatsache, daß in seltenen Fällen haploide Kerne in den diploiden Trichogynen eines Karpogonastes gefunden werden und ebenso zu jenen seltenen triploiden Karpogonästen führten, sind neben den erwähnten wenig

igen Keimlingen die einzigen Hinweise dafür, daß doch auch eine haploide Genera existieren muß. Noch unklarer ist das Schicksal der keimenden tetraploiden Perisporien und die cytologische Struktur etwaiger an ihnen entstandener Sexualorgane und Tetrasporangien. Die bei Moosen und Farnen gelegentlich auftretenden künstlich herstellbaren diploiden Gametophyten wären also bei Spermothamnion eher das Normale, vorausgesetzt, daß die cytologischen Befunde der Verf. sich an anderem Material immer wieder bestätigen. (Schussnig u. Odle, vgl. diese Ber. 1935.)

E. Esenbeck (München).

Moreau, Fernand, et C. Moruzi: Sur les réactions sexuelles entre Ascomycètes espèces différentes. (Über Geschlechtsreaktionen zwischen verschiedenen Ascomyceten.) C. r. Acad. Sci. Paris **198**, 1533—1535 (1934).

Stämme von *Neurospora sitophyla* wurden untereinander gekreuzt; es traten Gruppen auf, die untereinander Perithezien bildeten, in sich aber nicht. Ein Stamm von *Neurospora tetrasperma* gab mit einer dieser Gruppen keine geschlechtliche Reaktion, mit der anderen wurden Sklerotien gebildet, die man als Perithezien, deren Entwicklung stehengeblieben ist, betrachten kann. In Kombination mit einem amerikanischen Stamm von *N. tetrasperma* traten richtige Perithezien auf.

Han Huizinga (Berlin-Dahlem).

Biraghi, A.: Sul significato biologico dei presunti „appressori“ nel gen. *Gloeosporium*. (Über die biologische Bedeutung der vermutlichen Appressoren im Genus *Gloeosporium*.) Boll. Staz. Pat. veget., N. s. **14**, 202—210 (1934).

Vielfach wurde an *Gloeosporium*-Arten beobachtet, daß die Conidien bei der Reifung einen hyalinen Schlauch bilden, der am Ende eine meist birnenförmige Erweiterung aufweist, die eine dicke Wand bildet und braun erscheint. Biraghi ist auf Grund seiner Untersuchungen der Ansicht, daß die braunen Organe den Chlamydsporien analog sind.

P. Justus Kalkschmid.

● **Chouard, Pierre: La multiplication végétative et le bourgeonnement chez les plantes vasculaires.** (Actualités scient. et industr. Nr. 134. Exposés de biologie végétale. publiés par L. Blaringhem. I.) (Die vegetative Vermehrung und die Knospenbildung bei den Gefäßpflanzen.) Paris: Hermann & Cie. 1934. 48 S. u. 51 Abb. Frs. 10.—

Nachdem Verf. zunächst den Begriff der vegetativen Vermehrung und des Knospenbüßens geklärt hat, bespricht er unter Aufzählung der jeweils in Frage kommenden Gymnophyten die verschiedenen Arten der vegetativen Vermehrung an Sprossen, Wurzeln und Blättern, sei es, daß die Knospen spontan auftreten, sei es, daß sie künstlich erzeugt worden sind. Ein weiteres Kapitel behandelt die Bildungszonen der verschiedenen Knospenarten und die Hypothesen, die die Entstehung und die Polarität dieser Triebe zu erklären versuchen.

Siegfried Lange (Greifswald).

Matsuda, Hideo: Experimental pollination with giant pollen grains of *Petunia*. (Experimentelle Bestäubung mit Riesenpollenkörnern bei *Petunia*.) (*Gifu Imp. Coll. Agric.*) Botanic. Mag. (Tokyo) **48**, 552—557 (1934).

In 3 verschiedenen Jahren wurden Versuchsserien von *Petunia*-pflanzen, aus denen, welche unter natürlicher Hitzeeinwirkung in größerem Prozentsatz diploide Riesenpollenkörner bilden, mit ausgelesenen solchen bestäubt. Die erzielten Nachkommen waren jedoch ausnahmslos diploid und muttergleich. Weder diese noch die Folgenerationen zeigten einen Einfluß des väterlichen Pollens; eine Befruchtung trat also gar nicht stattgefunden. Diese Feststellung ist sehr bemerkenswert mit Bezug auf die Entstehung von Polyploiden, wenngleich eine Verallgemeinerung gewiß noch nicht zulässig ist. Von verschiedenen Erklärungsversuchen des Ursprungs der erhaltenen Nachkommenschaft wird unter dem Einfluß der Fehlbestäubung stimulierte polyploide Parthenogenese als wahrscheinlichster angesehen. Die Ursache für das Nichtstandekommen einer regulären Befruchtung, die eine polyploide Folgenereration erzeugen müßte, wird im Mißverhältnis der Cytoplasmamenge der normalen Eizelle zum Caryoplasma der diploiden männlichen Gamete gesucht.

von Berg (Wien).

Mathias, Paul, et Marguerite Bouat: Observations sur l'accouplement chez *Branchipus stagnalis* L. (crustacé phyllopode). (Zur Begattung von *Branchipus stagnalis* L.) (*Laborat. de Zool. et de Biol. Gén., Univ., Montpellier.*) *Bull. Soc. zool. France* **59**, 327 bis 333 (1934).

Die Begattung der im Titel genannten Art verläuft ähnlich wie bei konchostrake Phyllopoden (*Cyzicus*), dauert nur 6—30 Sekunden und findet bei etwa 20° im hellen Sonnenlicht statt. Das ♂ liegt kreuzweise über dem ♀. *Grimpe* (Leipzig).

Mani, M. S.: A case of ovoviviparousness in adult gall midges (Itonididae). (Ein Fall von Ovoviviparie bei erwachsenen Gallmücken [Itonididae].) (*Entomol. Section, Zool. Survey of India, Indian Museum, Calcutta.*) *Current Sci.* **3**, 109 (1934).

Ovoviviparie war innerhalb der Gallmücken bisher nur bei *Pachydiplosis oryzae* bekannt. Verf. fand das Abdomen eines ♀ von *Thuraia chilkaensis* nov. spec. gefüllt mit länglichen Larven, die zuerst für parasitische Hymenopterenlarven gehalten wurden. Später ergab sich, daß echte Itonididenlarven vorliegen, die innerhalb des Muttertieres die Eischale verlassen und zu ungefähr 1 mm langen Larven heranwachsen. Diese wurden auf faulende Pflanzenteile abgelegt. Einzelne Exemplare verpuppten sich sofort, andere lebten noch ungefähr 1 Monat als Larve. Die Puppenruhe dauerte 5 Tage. Verf. nimmt an, daß durch die Viviparie die Gefahr eines Befalles durch Parasiten herabgesetzt sei. *Wilhelm Kühnelt* (Wien).

Miyazaki, Hoshimaro: On the relation of the daily period to the sexual maturation and to the moulting of *Zosterops palpebrosa japonica*. (Über die Beziehungen der Tagesperiode zu der sexuellen Reife und den Mauserverhältnissen bei *Zosterops palpebrosa japonica*.) (*Biol. Inst., Univ., Sendai.*) *Sci. Rep. Tôhoku Univ.* **IV**, 9, 183—203 (1934).

Die Methode, die Sangeslust einiger Vögel künstlich vorzeitig dadurch zu erregen, daß man sie im Winter über die normale Tageszeit hinaus 3—4 Stunden bei künstlichem Licht hält, ist in Japan alter Volksbrauch. Etwa ein Monat nach Einsetzen dieser „Yogai“ genannten Periode der Lichtverlängerung beginnen die Vögel mit ihrem Gesang, gleichgültig ob sie in den vorhergehenden Wochen sehr aktiv gewesen waren oder die Verlängerung der Lichtperiode schlafend überstanden haben. In exakt durchgeführten Versuchsreihen im Laboratorium stellte der Verf. die Wirkungsweise der verlängerten Lichtzeit auf die Hoden fest, die (man vergleiche die entsprechenden Resultate von Bissonett, Rowan usw.) unter solchem Einfluß den Reifezustand erreichten. Es gelingt durch geschickte Versuchsanordnung leicht, die Vögel im Jahr mindestens 3mal zur Maturität zu bringen und damit zur Sangeslust zu veranlassen. Enge Beziehungen bestehen auch zwischen der Tagesperiode und der Mauser, denn zeigte sich, daß plötzliches Abbrechen des Yogai zum Federverlust und -ersatz führt. Experimentelle Untersuchungen, die kurz vor Beginn der normalen Mauserzeit angestellt wurden, ergaben, daß diejenigen Vögel, denen im Yogaiversuch die kürzeste Lichtzeit zugestanden war, am zeitigsten mit der Mauser begannen. Dabei ist es lediglich die Zeit der Belichtung, nicht die kürzere oder längere Möglichkeit der Futteraufnahme, die als Faktor in Frage kommt. Auch die positive Wirkung der verlängerten Tagesperiode hängt lediglich von der Lichtperiode ab, nicht von der Futterzeit, der Temperatur oder anderen Faktoren. *Hans Scharnke* (München).

Watt, Lucy J.: Frequency distribution of litter size in mice. (Die Häufigkeitsverteilung der Wurfgröße der Maus.) *J. Mammal.* **15**, 185—189 (1934).

Bei 431 Würfen mit insgesamt 2638 Jungen war die mittlere Wurfgröße 6,1 mit einer Standardabweichung von 2,32. Verf. erörtert kurz die Ursachen der Verschiedenheiten bei den Ergebnissen anderer Autoren. *Spiegel* (Tübingen).

Hain, A. M.: The effect of suckling on the duration of pregnancy in the rat (*Wistar albino*). (Der Einfluß des Saugens auf die Schwangerschaftsdauer bei der Ratte [Wistar Albino].) (*Inst. of Animal Genet., Univ., Edinburgh.*) *J. of exper. Biol.* **11**, 279—282 (1934).

Die Schwangerschaftsdauer der Ratte wird verlängert, wenn das gravide Tier Junge e

urt. Nur wenn der Wurf aus 4 oder weniger Jungen besteht, bleibt dieser Effekt aus. Ver-
 bört man die Zahl der Jungen, die durch das schwangere Muttertier gestillt werden künstlich
 fortgeschrittener Gravidität, dann tritt keine Verlängerung der Schwangerschaft auf. Es
 te kein Zusammenhang zwischen Verlängerung der Schwangerschaftsdauer und Zahl der
 en, die gestillt wurden, gefunden werden. Auch die Anzahl von Jungen, die das Muttertier
 Ende des Versuches warf, stand nicht in Korrelation mit der Verschiebung der Geburt.
 einer Zuchtreihe, in der Mikrophthalmie auftrat, wurde kein Zusammenhang zwischen Ver-
 ung der Abweichung und Verlängerung der Schwangerschaftsdauer festgestellt.

P. de Fremery (Oss, Holland).

**Hall, V. E., and G. N. Pierce jr.: Litter size, birth weight and growth to weaning
 the cat.** (Anzahl der Jungen in einem Wurf, Geburtsgewicht und Wachstum bis
 Entwöhnung bei der Hauskatze.) (*Laborat. of Physiol., Stanford Univ., Stanford
 University.*) *Anat. Rec.* **60**, 111—124 (1934).

33 Würfe mit 128 Jungen wahllos zusammengekommener Hauskatzen gaben das
 tersuchungsmaterial ab. Die Durchschnittszahl der Jungen in einem Wurf ist 3,88.
 größeren Mütter haben meist mehr Junge. Das durchschnittliche Geburtsgewicht
 bei Fünfer-Würfen deutlich höher als in Würfen mit mehr oder mit weniger Jungen;
 scheint eine Eigentümlichkeit der Katze zu sein. Das Geburtsgewicht der Kinder
 einer Mütter ist deutlich größer als jenes von Kindern großer Mütter; diese Beziehung
 entgegengesetzt jener, die bei Nagetieren gefunden wurde. — Die Wachstumskurve
 Jungen bis zum 50. Lebenstag ist fast linear. Die Gewichtszunahme ist am stetigsten
 Jungen, die ein Geburtsgewicht unter dem Durchschnitt hatten, sie scheint aber
 keiner deutlichen Beziehung zur Wurfzahl oder zum Gewicht der Mutter zu stehen.

Otto v. Wettstein (Wien).

ysiologie der Entwicklung, Wachstum. (*Entwicklungsmechanik, Embryophysiologie,
 embryonales Wachstum, larvales Leben, Metamorphose, Regulationen, Mißbildungen.*)

**Skoog, Folke, and Kenneth V. Thimann: Further experiments on the inhibition
 the development of lateral buds by growth hormone.** (Weitere Versuche über die
 twicklungshemmung von Seitenknospen durch Wuchsstoff.) (*William G. Kerckhoff
 borat. of the Biol. Sciences, California Inst. of Technol., Pasadena.*) *Proc. nat. Acad. Sci.*
S. A. **20**, 480—485 (1934).

Die früher von den Verff. vertretene Auffassung, daß die Seitenknospen an de-
 pitierten Sprossen von *Vicia Faba* durch Wuchsstoffzufuhr von der Schnittfläche
 an ihrer Entwicklung gehemmt werden, wird an *Pisum*-Sprossen weiter verfolgt.
 rwendet werden nunmehr mit Erfolg krystallisiertes Auxin B, Heteroauxin und ein
 s *Rhizopus*-Kulturflüssigkeit gewonnenes unreines Wuchsstoffpräparat, während
 s außerdem benutzte Auxin A-Präparat keine Wirkung hatte, aber auch am Hafer-
 t versagte. Da bei den verwendeten ziemlich hohen Konzentrationen die Hemmung
 r Seitenknospen nicht von einem Längen- und Dickenwachstum der Stengel be-
 itet war, wird auf eine direkte Wirkung der Wuchsstoffpräparate auf die Seiten-
 ospen geschlossen.

F. Laibach (Frankfurt a. M.).

Botwinowsky, W.: Über die photoperiodische Reaktion bei *Perilla oeymoides* L.
st. Ž. **19**, 5—10 u. dtsh. Zusammenfassung 10 (1934) [Russisch].

Die jungen Pflänzchen von *Perilla* wurden 14 Tage hindurch einem nur zehn-
 ndigen Tag ausgesetzt. Das Untersuchungsmaterial war in 4 Gruppen eingeteilt.
 i der ersten Gruppe fing der Kurztag schon 3 Wochen nach der Keimung an, bei
 r zweiten 14 Tage später, bei der dritten 4 Wochen später. Die 4. Gruppe diente
 s Kontrolle. Es zeigte sich, daß schon durch eine so kurzfristige Einwirkungs-
 s Kurztages die Pflanzen umgestimmt werden, indem sie von der vegetativen in die
 produktive Phase übergehen. Bei abermaligem Wechsel der täglichen Belichtungs-
 idet sofort eine zweite Umstimmung statt, wenngleich die zweite vegetative Phase
 mmend auf die Entwicklungsstadien der ersten reproduktiven wirkt. Eine photo-
 riodische Nachwirkung besteht also bei dieser Pflanze im eigentlichen Sinne nicht.
 er Ort der größten Empfindlichkeit ist der apikale Vegetationspunkt. *R. Stoppel.*

Michel-Durand, E.: Sur les constantes de comparaison utilisées dans les recherches relatives aux variations de substance dans les feuilles. (Über die bei den Untersuchungen über die Änderung der Blattsubstanz gebräuchlichen Vergleichskonstanten.) *Rev. gén. Bot.* **46**, 449—469 (1934).

Für vergleichende Untersuchungen der Lebensvorgänge in den Blättern der höheren Pflanzen lehnt Verf. im allgemeinen den Einzelgebrauch sowohl der Sachsscher Blatthälftenmethode als auch der Ausstanzmethode von Stahl ab. Erstere führt wegen der meist verschiedenen Größe der beiden zu vergleichenden Blatthälften sowie auch wegen der durch den Schnitt im stehenbleibenden Blatteile hervorgerufenen traumatischen Störungen, die stets erst nach längerer Zeit behoben werden, leicht zu falschen Ergebnissen. Bei letzterer macht es sich unangenehm bemerkbar, daß auch in ein und demselben Blatt die Dicke und das Trockengewicht der einzelnen Partien variieren und daß diese Größen ebenso wie die Blattoberfläche je nach Alter und Lebensbedingungen verschieden sein können. Verf. schlägt vor, die beiden Methoden insofern zu vereinigen, als die Versuchs- und Vergleichsstücke an entsprechenden Stellen der Blätter rechts und links der Mittelrippe zwischen den Nerven ausgestanzt werden sollen. Auf einer Reihe von Messungen an Blättern von *Catalpa*, *Aesculus* und *Laurocerasus* legt er den Einfluß der obengenannten Faktoren auf die Ergebnisse der Versuche dar.

Siegfried Lange (Greifswald).

Bungenberg de Jong, H. G., and J. Ph. Hennemann: Preliminary experiments on the influence of neutral salts on the germination of lathyrus-pollen. (Vorläufige Untersuchungen über den Einfluß von Neutralsalzen auf die Keimung von Lathyrus-pollen.) (*Inst. f. Med. Chem., Univ., Leyden.*) *Rec. Trav. bot. néerl.* **31**, 743—750 (1934).

Verff. haben frisch geernteten Lathyruspollen keimen lassen und festgestellt, daß die Keimung optimal bei 21° in 15proz. Saccharoselösung (vgl. mit 0,5, 10, 15, 20, 25 und 30%) war, während sie durch minimale Neutralsalzkonzentrationen (es wurde mit BaCl_2 , KCl und $\text{La}(\text{NO}_3)_3$ experimentiert) herabgedrückt wurde. Ein unterschiedliches Verhalten zeigten BaCl_2 und CaCl_2 , von denen das Ba die Keimprozent herabsetzte, während das Ca keine derartige Wirkung aufwies. In Lösungen mit Salzen gemischen von KCl bzw. NaCl mit verschiedenen Konzentrationen von CaCl_2 zeigte sich, daß bereits geringe Mengen CaCl_2 die Lösung von NaCl oder KCl „entgifteten“ konnten. Verff. schlagen vor, diese Untersuchungen mit niedrigeren CaCl_2 -Konzentrationen fortzusetzen und auch noch das Verhalten der Chloride von Li, NH_4 , Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr und Ba weiter zu verfolgen. Außerdem halten sie es für wünschenswert, den Einfluß von Kationen und Anionen höherer Valenz zu untersuchen, wobei allerdings Aluminium- und Thoriumsalze möglichst zu vermeiden seien.

Behrens (Hamburg).

Leukel, R. W., and T. R. Stanton: Effect of seed treatments on yield of oats. (Der Einfluß einer Samenvorbehandlung auf den Ertrag von Hafer.) (*Div. of Cereal Crops and Diseases, Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of Agricult., Washington.*) *J. amer. Soc. Agronomy* **26**, 851—857 (1934).

Die Untersuchungen gelten der Lösung der Frage, ob durch die Beizung des Körnermaterials eine Erhöhung der Ernte erzielt werden kann. Zu den Versuchen dient brandfreies Getreide, und zwar Hafer. Die Früchte wurden 1931 in Sowa geerntet. Als Beizmittel finden Anwendung: Ceresan (1,6—2%), Smittox, Corona oadust, Ansul dust (4—6% Formaldehyd enthaltend), ferner Formol. Die Staubbeize (dust) werden in einer Menge von 3 Unzen per Scheffel benutzt. Die Trockenbeizung erfolgt 10 Tage vor der Ernte, die Naßbeize kurz vor derselben. Es werden genaue Wägungen der Ernte ausgeführt. Bei der Bewertung der Ergebnisse ist die Fehlerausgleichrechnung zugrunde gelegt. In keinem einzigen Fall kann durch die Beizung ein höheres Erntegewicht erzielt werden. Die vorliegenden Versuche zeigen, daß durch die Beizung des Körnermaterials nicht immer eine Erhöhung der Erntemasse bedingt ist.

Niethammer (Prag).

Kekwick, Ralph Ambrose, and E. Newton Harvey: The effect of anaerobic conditions on the permeability of the egg of *Arbacia punctulata* to water. (Der Einfluß anaerober Verhältnisse auf die Permeabilität des Eies von *Arbacia punctulata* für Wasser.) (*Marine Biol. Laborat., Woods Hole a. Physiol. Laborat., Univ., Princeton.*) *J. Cellul. a. comp. Physiol.* 5, 43—51 (1934).

Es wird eine Anordnung beschrieben, mit deren Hilfe die Volumzunahme des *Arbacia*-Eies in verdünntem Seewasser unter anaeroben Verhältnissen studiert werden kann. Der anaerobe Zustand wurde durch Einleiten von Wasserstoff hergestellt. Die Geschwindigkeitskonstante des Wassereintritts ist niedriger unter anaeroben als unter aeroben Verhältnissen. Das nach Eintritt des Gleichgewichts erreichte Volumen ist aber in beiden Fällen gleich.

J. Runnström (Stockholm).

Motomura, Isao: Über die Exogastrulabildung beim Seeigelkeim durch Auxin, Glykogen und KClO_3 . (*Biol. Inst., Univ. Sendai.*) *Sci. Rep. Tōhoku Univ.* IV, 9, 23—130 (1934).

Befruchtete Eier von *Strongylocentrotus pulcherrimus* wurden der Wirkung von Auxin (Wuchsstoff), Glykogen, Traubenzucker und KClO_3 ausgesetzt. Auxin, Glykogen und KClO_3 bewirken Exogastrulation; Traubenzucker hat keine derartige Wirkung.

Chr. P. Raven (Amsterdam).

Montalenti, G.: La partenogenesi sperimentale dell'uovo di Lampreda. Analisi cytologica dell'attivazione semplice. (Die künstliche Parthenogenese des Eies von *L. lampreda*. Cytologische Untersuchungen nach einfacher Aktivierung.) (*Istit. di Zool., Univ., Roma.*) *Atti Accad. naz. Lincei*, VI. s. 20, 54—56 (1934).

Die durch Chloroformdämpfe künstlich zur Parthenogenese angeregten Eier (vgl. Ber. 23, 642) werden cytologisch untersucht. Die Erscheinungen vollziehen sich auf einen Punkt genau so wie bei normal befruchteten Eiern, über deren Entwicklung ebenfalls eine ausführliche Beschreibung gegeben ist. Hieraus sei nur hervorzuheben, daß normalerweise von dem hyalinen Plasma, welches sich zunächst am animalen Pol bei der Befruchtung bildet, eine Art Pseudopodium gebildet wird; längs dieses Pseudopodiums wandert der weibliche Vorkern zum männlichen. Die Ausbildung des Ps. unterbleibt jedoch bei den künstlich zur Parthenogenese angeregten Eiern. Nachdem der weibliche Kern seine beiden Richtungskörper abgeschnürt hat, wandert er jetzt auch allein in das Eizentrum und beginnt eine monozentrische Mitose. Wenn außer den Chloroformdämpfen noch eine Nachbehandlung mit hypertonen Lösungen erfolgt, ist die Entwicklung in jeder Hinsicht normal. Man kann also in der Entwicklung 2 Vorgänge unterscheiden: 1. Die Aktivierung, die hier durch Chloroform erzielt wird und Bildung des Polplasmas, Abschnürung des 2. Richtungskörpers und Wanderung des weiblichen Vorkerns zur Folge hat. 2. Die Ausbildung des Pseudopodiums und das Entstehen einer dizentrischen Mitose, hier bedingt durch die Einwirkung der hypertonen Lösung.

W. Nümann (Münster i. W.).

Teissier, Georges: Colorations vitales et réaction ionique du protoplasme. Étude de l'œuf de „*Pleurobrachia pileus*“. (Vitalfärbungen und Ionenreaktion des Protoplasmas. Untersuchung am Ei von *Pleurobrachia pileus*.) (*Stat. Biol., Roscoff.*) *Hommage Mém. Cantacuzène* 713—719 (1934).

Ausgehend von Speks kurz mitgeteilten Ergebnissen über Vitalfärbung des Eies von *Pleurobrachia pileus* (vgl. diese Ber. 1, 100), bestätigt Verf. die Färbungsergebnisse für die ganze Entwicklung. Die ektoplasmatischen Mikromeren färben sich z. B. mit Neutralrot gelblich, die Makromeren rot. Die spätere Folgerung von Spek, es handle sich um eine nach der Befruchtung einsetzende Trennung alkalischer und saurer Plasmakomponenten, und hiermit vollziehe sich ein wichtiger Determinationsschritt des Eies, wird jedoch abgelehnt. Die Eier von *Beroë cucumis* zeigen keine solche Substanzverteilung, die also trotz dem gleichen Furchungsmodus nicht allgemein verbreitet ist. Ein Vergleich der Wirkung von 10 Vitalfarbstoffen auf *Pleurobrachia*-eier zeigt nach dem Verf., daß das Entoplasma nach den verschiedenen Farbstoffen

ein sehr unterschiedliches p_H besitzen müsse. Da sich die Färbungsunterschiede von Ekto- und Entoplasma einerseits auch nach Formol- oder Sublimatfixierung erhalten und auch fixierte Eier die gleiche Färbung ergeben, wobei eine Erhaltung der p_H -Unterschiede nicht angenommen werden kann, während andererseits vorher impermeable Indikatoren (z. B. Phenolrot) nach der Fixierung nur eine gleichmäßige Einfärbung ergeben, entstehen Widersprüche zu der Erklärung, daß die Farbunterschiede auf dem p_H der verschiedenen Plasmateilchen beruht. Verf. meint, daß sie durch Metachromasie oder spezifischer Lipoidfärbung zu erklären sind. *H. Bauer.*

Strasburger, Eduard H.: Über die Zellbewegungen bei der Eifurchung der Fliege *Calliphora erythrocephala* Meigen. (Zool. Inst., Univ. Göttingen u. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Hirnforsch., Berlin-Buch.) Z. Zool. 145, 625—641 (1934).

Der Eikern wandert zu Beginn der Furchung von seinem konstanten Ort nahe dem Hinterende des Eies an der dorsalen Mediane (Schalenrinne) in das Eizentrum, wobei die ersten 3 Mitosen durchgemacht werden. Auf dem 16-Kern-Stadium ordnen sich die von ihrem Hofplasma umgebenen Kerne zu einer kugeligen Sphäre an, die sich mit weiterer Zunahme der Kernzahl zu einer der Eiform kongruenten Ellipse vergrößert. Die Kerne liegen in ihrem Hofplasma stets nach der zur Eioberfläche gerichteten Peripherie hin verlagert. An der nach außen gerichteten Kernoberfläche liegen die Centriolen. Die konstante Lage der Kerne wird dadurch erreicht, daß in der Anaphase die Spindeln nach innen eingeknickt werden. Trotz der Zunahme der Kernanzahl bleiben die Hofplasmen anfangs gleich groß. Dies wird durch Aufnahme des den Dotter durchziehenden Netzplasmas erreicht, daß daher innerhalb der Sphäre fast völlig fehlt. Das Keimhautblastem bleibt während der Furchungsteilungen gleichmäßig dünn und wird erst durch Eintritt der Kerne und Hofplasmen verstärkt. Durch Setzung kleiner Brenndefekte mit dem Mikrokauter wird die Sphäre von der Brennstelle weg verlagert. Dadurch treten die Kerne an einem Eiende früher in das Blastem ein als am anderen Ende, dessen Blastem daher dünn bleibt. Es ist aber ungeschädigt, wie sich aus dem später doch erfolgenden Kerneintritt ergibt. Aus seinen Beobachtungen vermutet Verf. daß die Wanderung der Kerne aktiv erfolgt. *H. Bauer (Berlin-Dahlem).*

Galliard, H.: Rôle de la mue embryonnaire des réduvidés hématophages dans le processus d'éclosion. (Über die Rolle der Embryonalhaut der blutsaugenden Reduviiden beim Schlüpfungsvorgang.) (Laborat. de Parasitol., Univ., Paris.) Ann. de Parasitol. 12, 345—349 (1934).

Verf. weist auf die Bedeutung der Embryonalhaut bei blutsaugenden Wanzen Cimex und den Reduviiden, hin. Von dieser Haut, die ein cuticulares Sekret des Embryos und keine amniotische Membran ist, befreit sich der Embryo vor dem Schlüpfen (z. B. Triatoma) oder erst hinterher (Wasserwanzen). Auf der Hülle des Embryos sind in bestimmter Anordnung Dornen und Stacheln befestigt. Bei anderen Insekten (Forficuliden, Locustiden u. a.) haben ähnliche Bildungen die Bedeutung von Einsprengern. Diese Erklärung trifft in vorliegendem Falle nicht zu, denn die Eier sind hier gedeckelt, eine besondere Membran ist nicht zu durchstoßen; außerdem entsprechen die Dornenreihen nicht der Öffnung des Chorions des Eies. Nach der Meinung des Verf. ist die Bedeutung dieser Stacheln noch nicht geklärt.

Albrecht Hase und Vera Wellborn (Berlin-Dahlem).

Keilbach, Rolf: Über asymmetrische Flügellage bei Insekten und ihre Beziehungen zu anderen Asymmetrien. (Zool. Inst., Univ. Halle a. d. S.) Z. Morph. u. Ökol. Tiere 29, 1—44 (1934).

Verf. stellt sich als Aufgabe, eine weit verbreitete Asymmetrie (Flügelüberkreuzung bei Insekten) an umfangreichem Material (32000 Insekten, größtenteils lebend) vom Standpunkte des Rechts-Links-Problems zu untersuchen. Viele Insekten besitzen noch inkonstante Flügellage, legen also bald den rechten Oberflügel über den linken, bald umgekehrt. Wo konstante Flügellage auftritt, verhält sich stets eine ganze Gruppe gleichartig (Grillen und Wasserwanzen rechts über links, Locustiden und Schaben

gekehrt). Alle diese Tiere zeigen das Gemeinsame, daß sie entweder flugunfähig sind oder daß das Fliegen nicht mehr ihre Hauptbewegungsart darstellt. Auch muß diese Konstanz polyphyletisch, an verschiedenen Stellen unabhängig, herausgebildet worden. Arten indes, wo die individuell konstanten Tiere einer Art zur Hälfte rechts-, die Hälfte linksflüglig sind, wurden nirgends gefunden. Einen Sonderfall stellt *Pyrococcus* (Fortsetzung der Versuche von Ludwig) dar, wo überall die Rechtser über die Linkser im Verhältnis 4:1 bei den ♀, 3:1 bei den ♂ überwiegen (24000 Tiere). Züchtungsversuche führten wegen der schwierigen Aufzucht zu keinem eindeutigen Ergebnis. Ein zweiter Sonderfall ist *Drosophila*, wo sich im Laufe der ersten Lebensstunden ein Teil der Tiere an R- oder L-Lage „gewöhnt“, während der Rest (30%) lebenslang inkonstant bleibt. Bemerkenswert ist, daß unter den konstant werdenden Tieren die Rechtser über die Linkser stets (etwa 5:3) überwiegen (55000 Beobachtungen), eine Eigentümlichkeit, die sich nicht mendelnd vererbt. Durch Kältewirkung konnte das RL-Verhältnis nicht verschoben werden. Die Lage der Unterflügel ist nur in 2 Fällen konstant und dann konform mit der Oberflügelanlage. — Tiere mit konstanter Oberflügelanlage zeigen häufig morphologische Asymmetrien an den Flügeln; die unwesentlichen von ihnen sind meist paratypisch, die wesentlichen aber erblich (z. B. dickerer Flügel heller und dünner). Bei experimenteller Flügellageumkehr während des Schlüpfens aus der letzten Haut wird diese Asymmetrie nicht invertiert, der jetzt liegende Flügel bleibt hell und dünn. Einzelne Inversionen oder inverse Arten wurden erwartungsgemäß gefunden. Genauer studiert wird auch die Flügelrandasymmetrie der Käfer, wo sich eine große (weiteren Studiums wert) Mannigfaltigkeit ergibt. — In einem zweiten Teil wird die Ab- oder Unabhängigkeit verschiedener am selben Individuum vorhandener Asymmetrien untersucht. Physiologisch zusammengehörige Asymmetrien sind stets gekoppelt, andere (z. B. Mundteile, Darmkanal, Flügellage, Genitalkomplex) voneinander unabhängig. Durch genaues Studium der Populationsapparate, Paarungsgewohnheiten sowie eines zufällig gefundenen inversen Exemplars kann gezeigt werden, daß die *Macrocorixa*-Gruppe aus der *Microcorixa*-Gruppe (jene links-, diese rechtsasymmetrisch) durch genotypische Inversion entstanden ist. Versuche an Grillen zeigten weiter, daß nach Flügellageumkehr bei älteren Tieren (mehrwöchentliche Fesselung) diese trotz Bemühens zirpunfähig waren, während nach Umkehr im Moment des Schlüpfens die Tiere die (sehr verwickelten) Zirpbewegungen fortan invers ausführten. In jedem Tier müssen also die „beiderseitigen“ zum Zirpen notwendigen Bewegungskoordinationen vorgebildet sein, wenn auch die inversen normalerweise latent bleiben. Eine Diskussion allgemeiner Art schließt die Arbeit.

W. Ludwig (Halle a. d. S.).

Thompson, J. H., and Julian S. Huxley: Retardation of growth in axolotls resulting from parathyroid extract administration. (Wachstumshemmung bei Axolotln als Folge der Verabreichung von Parathyreoidextrakten.) (*Physiol. a. Zool. Laborat., King's Coll., Univ. a. Roy. Coll. of Surg., London.*) *J. of exper. Biol.* **11**, 273—278 (1934).

4 junge Axolotl wurden 10 Wochen lang mit Parathyreoidextrakten injiziert, die sich bei Ratten als wachstumshemmend erwiesen hatten (Robinson und Thompson, 1932). 8 Kontrollen wurden mit den gleichen Extrakten behandelt, die durch CO_2 inaktiviert worden waren. Die ursprünglich leichteren Kontrollen überholten darauf in ihrem Gewichtswachstum die Versuchstiere. Nun wurden die 8 Kontrollen mit wirksamen Extrakten behandelt und die 4 ursprünglichen Versuchstiere mit unwirksamen Auszügen, worauf erneut eine Überschneidung der Wachstumskurven eintrat. Stärkere Dosierung des Extraktes wirkte hemmender als ein schwächerer Auszug. Als weitere Folge der Extraktwirkungen wird eine erst im Laufe von mehreren Wochen auftretende leichte Ballung des Melanophorenpigments bei aktiven Extrakten beschrieben. (Vgl. diese Ber. **25**, 542.)

Friedrich-Freksa (Tübingen).

Alphonse, P., et G. Baumann: La perforation de l'opercule branchial des têtards de *Bufo vulgaris* dans la métamorphose accélérée par la thyroxine. (Die Perforation

des Operculum bei den Kaulquappen von *Bufo vulgaris*.) (*Laborat. d'Anat., Univ. Genève.*) C. r. Soc. Biol. Paris **116**, 1277—1279 (1934).

Nach den Anschauungen verschiedener Autoren soll die Perforation des Operculum bei Anurenlarven durch Substanzen aus den degenerierenden Kiemen ausgelöst werden. Die Verff. untersuchten die Verhältnisse an Krötenlarven, bei denen die Metamorphose durch Thyroxin ausgelöst wurde. Eine genauere histologische Untersuchung zeigte, daß die Arterie, welche das Operculum versorgt, aus dem 5. und 6. Arterienbogen entspringt. Diese beiden Bogen degenerieren während der Metamorphose und damit auch die Arterie des Operculum. Nach der Verödung der Arterie lösen die Endothelzellen der Arterie diese auf, und darauf folgt auch die Degeneration der übrigen Gewebe des Operculum. Die Verff. betonen, daß durch die Thyroxinwirkung im vorliegenden Falle eine vorzeitige Metamorphose des Gefäßsystems stattgefunden habe, und daß der dadurch hervorgerufene Durchbruch des Operculum vom normalen Mechanismus abweiche. *F. E. Lehmann (Bern).*

Kagiyama, S., und T. Masumoto: Die geschlechtlichen Unterschiede des Oxydations- und Reduktionsvermögens in der Embryonalzeit. (*Physiol. Laborat., Univ. Nagasaki.*) (12. ann. meet. of the Japan. Physiol. Soc., Kanazawa, 10.—12. VII. 1933.) *Jap. J. med. Sci., Trans. III Biophysics* **3**, 11* (1934).

Die Verff. untersuchten mittels des Vernonschen und des Ahlgrenschen Verfahrens das Oxydations- und Reduktionsvermögen des Hühnerembryos während der Entwicklung. Der geschlechtliche Unterschied des Oxydationsvermögens wurde erst am 13. Tage der Bebrütung beobachtet, und das männliche Geschlecht überwiegt das weibliche. Der geschlechtliche Unterschied des Reduktionsvermögens wurde am 12. Bebrütungstage bemerkt, und das weibliche übertrifft dabei das männliche. Diese geschlechtseigenümlichen Verhältnisse haben wahrscheinlich eine innige Beziehung mit den Geschlechtsdrüsen. *Autoreferat.*

Glaser, Otto, and Edmund Piehler: The mobilization of calcium during development. (Wie das Calcium im Laufe der Entwicklung zugänglich gemacht wird.) (*Biol. Laborat., Amherst Coll., Amherst.*) *Biol. Bull.* **66**, 351—356 (1934).

Versuche werden mitgeteilt, die das Abgeben von Calcium aus der Schale im Laufe der Bebrütung beleuchten. In 6 Fällen wurden Stücke von den Schalen am 1. und 19. Tage der Bebrütung entnommen und auf Calcium analysiert. Der prozentische Gehalt an Calcium ist derselbe in beiden Studien. Da die Schalen im Laufe der Bebrütung an Gewicht verlieren, muß dies bedeuten, daß Calcium aus der Schale heraustritt und dem Embryo zugänglich gemacht wird. Die Schalen werden in alkoholischer Phenolrotlösung behandelt. Eine gewisse Erosionsstruktur in der Eierschale tritt nun hervor, die dem Verlauf der unterliegenden Blutgefäße entspricht. *J. Runnström (Stockholm).*

Zahl, Paul A.: The hormonie inhibition of a somatic character in the cyprinodont fish, *Rivulus urophthalmus*. (Die hormonale Hemmung eines somatischen Merkmals bei dem Zahnkarpfen *Rivulus urophthalmus*.) *Amer. Naturalist* **68**, 475—478 (1934).

Bei geschlechtsreifen *Rivuli urophthalmi* kann man die Geschlechter im Phänotyp unterscheiden. Das Weibchen besitzt nämlich im dorsalen Teil des Schwanzstiels einen schwarzen Fleck, der dem Männchen fehlt. Potentiell ist diese Eigenschaft in beiden Geschlechtern vorhanden; denn im Jugendstadium tragen sämtliche Individuen dieses Merkmal. Mit zunehmender Geschlechtsreife verliert sich der Fleck bei den Männchen. Die Ursache dafür ist nach der Meinung des Verf.s das testiculäre Cholesterin, das die Ausbildung dieser Eigenschaft hemmt und zurückdrängt. Das geschlechtskontrollierende Merkmal ist somatisch bedingt, das durch ein ovarielles Hormon, wenn nicht gefördert, so doch erhalten bleibt, während ein testikuläres Hormon die entgegengesetzte Wirkung hat. Auf dieses Erkenntnis aufbauend, hat Verf. verschiedene Versuche (Kastration, Implantation, Transplantation) gemacht, über deren Ergebnisse bisher noch keine Mitteilungen vorliegen. *Hans Breider (Braunschweig).*

Tabei, Torakichi: Experimentelle Studien über die Sexualeyelen bei der Ovarial-
nsplantation an weißen Ratten. (*Frauenklin., Kais. Univ. Tokyo.*) Mitt. jap. Ges.
näk. 29, H. 7, dtsh. Zusammenfassung 58—59 (1934) [Japanisch].

Der Verf. hat gesunde geschlechtsreife weiße Ratten kastriert und gleich darauf
tototransplantationen sowie Homoiotransplantationen infantiler Ovarien versucht.
Die Ergebnisse entsprechen im allgemeinen den in der Literatur festgelegten Beob-
achtungen. Autotransplantationen erwiesen sich wirksamer als Homoiotransplanta-
tionen. Wo der Oestrus auftrat, konnten Follikel und Gelbkörper histologisch nach-
gewiesen werden. Bei Transplantationen infantiler Ovarien von geschlechtsreifen
kastrierten Ratten kam das Transplantat von 5 Fällen nur einmal zur Funktion.
Am Schluß geht der Verf. noch auf Versuche ein, bei denen er die Einwirkungen
von reifen Ovarien auf reife Ratten, die in einer anderen Cyclushase standen, als es
an transplantierten Ovarien entsprach, ein.

H. Siegmund (Graz).

Cheval, Max: Les greffes d'ovaires et d'utérus. (Implantation von Ovarien und
Uterus.) Ann. Soc. sci. Brux. Nr 5/6, 145—196 (1933).

Einleitend sehr ausführliche Literaturübersicht zum Thema Ovarialfunktion nach
Uterusexstirpation, wobei sowohl die bisher vorliegenden klinischen wie experimentellen
Arbeiten hinreichend gewürdigt werden. Überblickt man die Literatur, so liegen ebenso
viele Angaben vor, daß nach Uterusexstirpation in situ belassene oder implantierte
Ovarien noch funktionieren, als Angaben, die eine weitere Wirksamkeit verneinen.
Die Verff. haben selbst eine Reihe experimenteller Untersuchungen an Hündinnen
angestellt. 1. Versuchsreihe: Implantation von Ovarien in die Bauchdeckenmuskulatur
nach doppelseitiger Ovariumexstirpation. Jedes Implantat erfährt in sehr kurzer Zeit
greifende Strukturveränderungen. Die zentralen Partien des Implantates sklero-
sieren, während an der Peripherie Follikel erhalten bleiben. Diese weisen häufig Degera-
tionserscheinungen auf. Die Implantate wurden in verschiedenen (allerdings sehr
kurzen; Ref.) Zeiträumen nach der Implantation untersucht. Im 4. Monate konnten
reifende, wohl erhaltene Follikel nachgewiesen werden. 2. Versuchsreihe: Auto-
plantation von Ovarien nach Entfernung von Uterus und beiden Eierstöcken. Hier
gibt die Untersuchung der Implantate nach 4 Monaten die Bildung atresierender
Follikel, während wohlerhaltene reifende Follikel nicht gefunden wurden. 3. Versuchs-
reihe: Implantation von Uterusstücken und Ovarium nach Entfernung von Uterus
und Ovarien. In verschiedenen Zeitabständen konnte festgestellt werden, daß die
Drüsen des implantierten Uterusstückes in der ersten Zeit cystisch entarten, sich aber
nach 4 Monaten wieder ein wohlausgebildetes Endometrium nachweisen läßt. Auf
Grund klinischer Erfahrungen bei 47 Frauen wird festgestellt, daß Frauen mit erhal-
tenem Uterus und implantiertem Ovarium noch für einige Monate genitale Blutungen
aufweisen können. Bei einigen Frauen wurde neben Ovarium auch Uterus in das sub-
cutane Gewebe implantiert. Bei einer dieser Frauen wurde das Implantat, da es Schmer-
n verursachte, nach 6 Monaten entfernt. Die histologische Untersuchung ergab das
Vorhandensein einer hohen, drüsenreichen Uterusschleimhaut, in der Blutpigment
nachgewiesen wird.

C. Kaufmann (Berlin).

Dworzak, Hans, und Kurt Podleschka: Über die Funktion autoplastisch in die
Hugenvorderkammer verpflanzter Stücke der Uteruswand des Kaninchens. (*Dtsch.*
Univ.-Frauenklin., Prag.) Arch. Gynäk. 157, 229—249 (1934).

Die zuerst in Amerika angewandte Methodik der autoplastischen Verpflanzung
von Uterusstückchen in die vordere Augenkammer von Kaninchen wurde von den
Autoren reproduziert, und es gelang ihnen wie den Voruntersuchern, eine gute Anheilung
zu erreichen. Im einzelnen werden Ausführungen über Material, Operationstechnik und
postoperativen Verlauf gemacht, wobei 29 Tiere Verwendung fanden. Um die Be-
ziehungen zwischen Uterus und Ovar genau verfolgen zu können, wurden daneben
auch Ovarialfragmente überpflanzt, und zwar in der Mehrzahl der Fälle in das 2. Auge.
In einzelnen Fällen wurden die Tiere kastriert, so daß die transplantierte Ovarial-

substanz die einzige des Körpers war. Die Funktion des Ovarientransplantates konnte an der Größen- und Farbveränderung des Uterustransplantates abgelesen werden. Nach intravenöser Injektion von Hypophysenhinterlappenpräparaten erblaßte wenige Sekunden später das Uterustransplantat und verkleinerte sich, was als Folge einer Kontraktion der miterhalten gebliebenen Uterusmuskulatur aufgefaßt wird. Künstliche Zufuhr von Ovarialhormon setzte makroskopisch und mikroskopisch feststellbare Veränderungen ebenso wie der Eintritt einer Gravidität. Pituitrininjektion hatte auch bei entsprechender Gravidität ein Erblassen des Uterustransplantates zur Folge. Künstliche oder durch Kopulation hervorgerufene Corpus luteum-Bildung veranlaßte ein starkes Wachstum des Uterustransplantates, das auch in diesem Zustand auf Pituitrininjektion mit Erblassen (also Kontraktion) reagierte, während der in situ verbliebene Uterus desselben Tieres keine Kontraktion zeigte. Die Verff. ziehen daraus den Schluss, daß der die Pituitrinerregbarkeit aufhebende Wirkstoff des Corpus luteum wohl am normal gelegenen Uterus, nicht aber am Uterustransplantat angreifen kann, was nur den veränderten nervösen Verhältnissen des Transplantates erklärt wird. Die Einspritzung von Corpus luteum-Extrakt veranlaßte prägravidem Schleimhautaufbau sowohl in situ wie im Transplantat. Die Methode als solche schafft einen brauchbaren Indicator zum Nachweis bestimmter am Uterus angreifender Hormone, ohne allerdings die Möglichkeit genauer quantitativer Feststellungen an die Hand zu geben, da die Ansprechbarkeit der Tiere individuell zu sehr schwankt. *P. Caffier (Berlin).*

David, Lore: *La contribution du matériel cartilagineux et osseux au blastème et à la régénération des membres chez les amphibiens urodèles.* (Die Beteiligung von Knorpel- und Knochenmaterial am Regenerationsblastom der Extremitäten bei Urodelen.) (*Laborat. d'Anat. et d'Histol. Comp., Univ., Paris.*) *Archives Anat. microsc.* **30**, 221 bis 234 (1934).

Es wurde der Regenerationsvorgang an Extremitäten von Axolotln verschiedener Alters genauer cytologisch untersucht. Mit Hilfe konzentrierter Lösungen von Neutralrot konnte in den Knorpelzellen ein Depot von Neutralrot erzeugt werden, das bis zu 14 Tagen erhalten blieb und es ermöglichte, mit Hilfe der fixierten Neutralrotfärbung das Schicksal dieser Zellen auf Schnitten genauer zu verfolgen. Es zeigte sich, daß unmittelbar nach der Operation eine bedeutende Anzahl von Knorpelzellen sich vom Knorpel ablöst und direkt in das Regenerationsblastem einwandert. Weiterhin werden während der ganzen Entwicklungsdauer des Blastems, Zellen aus dem in Abbau befindlichen Knorpel frei, die ins Blastem einwandern. Beim Abbau des Knochens in den Extremitäten älterer Tiere treten Osteoklasten auf, deren Teilungsprodukte sich ebenfalls ins Blastem einfügen. Der vom Blastem neugebildete Knorpel fügt sich genau an den noch vorhandenen Knorpelstumpf an, der demnach einen direkten Einfluß auf die Formbildung des neuentstandenen Knorpels auszuüben scheint. Diese Befunde sprechen gegen die Anschauung, welche die Differenzierungsprozesse im Regenerationsblastem ausschließlich den indifferenten Mesenchymzellen zuschreibt.

F. E. Lehmann (Bern).

Vladimirova, E.: *Gehalt an Aminosäuren in den regenerierenden Extremitäten des Axolotls auf verschiedenen Stufen der Regeneration.* *C. R. Acad. Sci. URSS.* **478** u. dtsh. Text 479 (1934) [Russisch].

An Axolotlextremitäten, abgeschnitten am Karpalgelenk, wird der Gehalt an Aminosäuren nach Folin ermittelt und verglichen mit dem in den regenerierten, die in verschiedenen Entwicklungsstadien wiederum amputiert werden. Die einzelnen Stadien sind: Stadium der Wundheilung, Blastemstadium, Stadium des Kegels, Stadium des Plättchens, Dreifingerstadium, Stadium der ausgebildeten Extremität. Die Werte steigen von 31,2 mg% des Aminostickstoffes (normale Extremität) bis 41,1 mg% (Kegelstadium, 15. bis 17. Tag der Regeneration) an und gehen dann wieder bis beinahe zur Norm 32,7 mg% (Stadium der gut ausgebildeten Extremität, 75. Tag der Regeneration) zurück. Die Frage, ob die mit den Stadien der größten Intensität

on Differenzierung und Wachstum der Gewebe zusammentreffenden hohen Aminosäuremengen von einem gesteigerten Eiweißumsatz oder von einem Abnehmen der oxydierenden Prozesse herrühren, läßt sich nur durch Bestimmung der Atmungs-
fähigkeit der regenerierenden Gewebe klären.

Luy (Hannover).

Woitkewitsch, A.: Das Problem der Inkretion beim Regenerationsprozeß des Geyeders. (*Inst. f. Exp. Morphogenese, Univ. Moskau.*) Biol. Ž. 3, Nr 1, 30—40 u. engl. Zusammenfassung 40 (1934) [Russisch].

Durch zahlreiche Versuche wurde die Frage geklärt, ob in der Haut von gerupften Tauben, deren Federn gerade neu zu wachsen beginnen, sich Stoffe finden, die stimulierend auf die Federbildung wirken. Injiziert wurden Extrakte aus der Haut gerupfter Tauben den Versuchstieren (ebenfalls Tauben), nachdem letzteren vorher einige Deckfedern ausgerupft worden waren. Es konnte nicht nur ein bedeutend schnelleres Wachstum der neugebildeten Federn festgestellt werden, sondern es fand sich gleichzeitig eine erhebliche Hyperplasie der Schilddrüse. Die Beeinflussung von Federwachstum und Schilddrüsenhyperplasie verlief ganz unabhängig davon, ob die gleiche Menge Hautextrakt in verhältnismäßig kurzer Zeit injiziert wurde oder die Injektionen auf einen längeren Zeitraum verteilt wurden. Im Gegensatz zu Zawadowski u. a., die die Hyperplasie der Schilddrüse für die Ursache des Eintritts der Mauser halten, konnten trotz einwandfrei festgestellter Schilddrüsenhyperplasie bei den Versuchstieren keinerlei Anzeichen von Mauserung festgestellt werden. An den Geschlechtsdrüsen konnte nach Injektion der Hautextrakte eine erhebliche Gewichts-
zunahme beobachtet werden.

v. Knorre (Riga).

Mitzkewitsch, M. S.: Regeneration und Ontogenese. I. Der Regenerationsprozeß bei den Mäuseembryonen. (*Timiriasev-Inst. f. Biol., Univ. Moskau.*) Biol. Ž. 3, Nr 1, 20—27 u. dtsh. Zusammenfassung 28—29 (1934) [Russisch].

Um die Regenerationsfähigkeit bei Säugetieren auf frühen Entwicklungsstadien zu prüfen, wurden Operationen in situ an Mäuseembryonen am 12. bis 19. Schwangerschaftstage vorgenommen. An zweckmäßigsten erwies es sich, die in Frage kommenden Operationen mit feinen scharfen Nadeln vorzunehmen. Ohne wesentliche Beschädigung der Gebärmutter und unter Vermeidung von Fruchtwasserabfluß konnten auf diese Weise 189 Embryonen operiert werden. In 2 Serien, in welchen entweder ein Teil des Schwanzes oder eine Extremität amputiert wurden, konnten keinerlei Anzeichen von Regeneration festgestellt werden. In einer 3. Serie, die besonders junge Embryonen betraf, gelang es, in 2 von 61 Fällen eine einwandfreie Regeneration sowohl der Weichteile als auch der Wirbel des Schwanzes festzustellen. Auch fanden sich Anzeichen regenerativer Prozesse an den Extremitätenstümpfen.

v. Knorre.

Vererbungslehre. (*Allg. Genetik: allg. Faktorenlehre, Letalfaktoren, Geschlechtsvererbung, Chromosomenlehre; spezielle Genetik: Faktorenanalyse spezieller Merkmale, Züchtungskunde, Vererbung beim Menschen.*)

Quintanilha, A.: Sur la possibilité de résoudre des problèmes cytologiques par des méthodes génétiques. (Über die Möglichkeit, cytologische Fragen mit genetischen Methoden zu lösen.) (*Inst. Botan., Univ., Coïmbra.*) (28. réun. de l'Assoc. des Anatomistes et 1. réun. de la Soc. Anat. Portugaise, Lisbonne, 10.—12. IV. 1933.) Bull. Assoc. Anatomistes 28, 532—538 (1933).

Unter diesem allgemeinen Titel werden die Grundlagen der Methode der Tetradenanalyse und deren Wert für die Frage Prä- oder Postreduktion dargelegt. Bei Coprinus fimetarius findet der Verf. bei der Analyse der beiden Paare von „Geschlechtsfaktoren“ in 65—80% der Basidien 4 verschiedene Sporen und schließt daraus auf gleichzeitige Prä- und Postreduktion verschiedener Chromosomenpaare in einer Basidie. Die Möglichkeit der Beeinflussung des Ergebnisses durch Faktorenaustausch wird nicht berücksichtigt.

E. Knapp (Berlin-Dahlem):

Timoffeff-Ressovsky, N. W.: The experimental production of mutations. (Die experimentelle Erzeugung von Mutationen.) (*Genet. Abt., Kaiser Wilhelm-Inst. f. Hirnforsch., Berlin-Buch.*) Biol. Rev. Cambridge philos. Soc. 9, 411—457 (1934).

Eine ausführliche Darstellung des gesamten Gebietes der experimentellen Mutationsauslösung. Die methodologischen Kriterien der Experimente finden nicht nur bei der Besprechung der mit den verschiedenen Behandlungsarten (Kurzwellen, Hitze usw.) gewonnenen Ergebnisse, sondern auch in einem eigenen Kapitel ihre besondere Würdigung. Den Hauptteil des Referates nimmt dem Stoff gemäß die durch Strahlung ausgelöste Mutation ein; den mit anderen Methoden (Hitze, Chemikalien) gewonnenen Resultaten spricht Verf. keine Endgültigkeit bzw. Schlüssigkeit überhaupt zu. Neben den die Hauptmasse der vorliegenden Arbeiten einnehmenden Drosophila-Arbeiten wird auch die Literatur aller anderen Objekte der experimentellen Mutationsauslösung in die Darstellung referierend einbezogen, zumindestens kurz zitiert, so daß dieses die letzten Ergebnisse berücksichtigende Referat neben seiner kritischen Note wegen der erschöpfenden Behandlung der stark angewachsenen Literatur begrüßt werden wird.

Eugen Schwarz (Berlin-Dahlem).

Hoffstadt, Rachel E., and Guy P. Youmans: The genetic significance of the dissociants of *Staphylococcus aureus*. (Die genetische Bedeutung der Abspaltungen von *Staphylococcus aureus*.) (*Dep. of Bacteriol. Univ. of Washington, Seattle, Washington.*) J. Bacter. 27, 551—560 (1934).

Durch fortgesetzte Züchtung von 2 Stämmen von *Staphylococcus albus* und 4 Stämmen von *St. aureus* in Lithiumchloridbouillon und gewöhnlicher Bouillon wurde die Fähigkeit der Abspaltung von Varianten untersucht. Abgesehen von einem Albus-Stamm ergaben sich überall Abspaltungen, die sich in kultureller und biochemischer Hinsicht unterschieden. Weiße Varianten wurden von allen gelben Stämmen erhalten, Gonidialformen nur von einem Aureus-Stamm nicht. Verlust der Virulenz und Farbstoffproduktion ging bei den Aureus-Stämmen nur bei 1 Stamm nicht zusammen. Die Zunahme der fermentativen Fähigkeiten gegenüber verschiedenen Zuckerarten ließ sich insbesondere an den Abspaltungen eines Aureus-Stammes bis zum Auftreten der Gonidialform genetisch verfolgen. F. W. Bach (Beuthen, O.-Schl.).

Shimotomai, N., und K. Kimura: Geschlechtschromosomen bei zwei Laubmoosen. Botanic. Mag. (Tokyo) 48, 629—635 (1934) [Japanisch].

In der Arbeit sind die Geschlechtschromosomen von zwei Laubmoosen, nämlich *Polytrichum attenuatum* und *Ceratodon purpureus* untersucht. Ihre Chromosomenformeln sind die folgenden:

	Gametophyt		Sporophyt
	♀	♂	
<i>Polytrichum attenuatum</i>	6 + X	6 + Y	12 + X + Y
<i>Ceratodon purpureus</i>	12 + X	12 + Y	24 + X + Y

Autoreferat.

Spier, Jane D.: Chiasma frequency in species and species hybrids of *Avena*. (Chiasmahäufigkeit bei Arten und Artbastarden von *Avena*.) (*Dep. of Botany, McGill Univ., Montreal, Quebec.*) Canad. J. Res. 11, 347—361 (1934).

Verf. stellte die Chiasmahäufigkeit in der meiotischen Metaphase bei folgenden Spezies und Spezieskreuzungen fest: *Avena strigosa*, *A. brevis*, *A. Wiestii*, *A. barbata*, *A. abyssinica*, *A. sterilis*, *A. sativa* var. Radnorshire Sprig (triploider Bastard), *A. barbata* × *A. strigosa*, *A. abyssinica* „naine“ × *A. sterilis maxima* (pentaploider Bastard) und *A. sterilis* (weiß) × *A. sativa* var. Radnorshire Sprig (hexaploider Bastard). Die untersuchten Formen weisen mehr oder weniger große Unterschiede in der Chiasmahäufigkeit auf. Es lassen sich gewisse Parallelen zwischen der Ähnlichkeit der Chiasmabildung bei verschiedenen Arten und ihrer Verwandtschaft zueinander erkennen. So weisen die nahe verwandten Arten *A. brevis* und *A. strigosa* große Ähnlichkeit in bezug auf die Chiasmabildung auf, während sie sich darin von der entfernter stehenden *A. Wiestii* erheblich unterscheiden. Bei den tetra- und hexa-

den Arten treten keine solchen Unterschiede auf. Die Ähnlichkeiten in der Chiasmabildung verwandter Arten erklärt Verf. aus dem Vorhandensein von Genen, die Synapsis und Chiasmabildung in ähnlicher Weise beeinflussen. Die Untersuchung der Kreuzungen ergab, daß bei den triploiden und hexaploiden Bastarden enge, bei den pentaploiden Kombinationen lose Paarung vorliegt. Entsprechend dem Verhalten der Elternspezies wird die enge Paarung bei dem triploiden Bastard *A. strigosa* × *A. barbata* als Ausdruck naher Verwandtschaft der Eltern angesehen, während die niedrige Chiasmahäufigkeit bei dem pentaploiden Bastard *A. abyssinica* × *A. sterilis* auf geringe Homologie der Chromosomen und damit geringe Verwandtschaft der Elternarten deutet.

Schmidt (Müncheberg, Mark).

Müntzing, Arne: Hybrid incompatibility and the origin of polyploidy. (Unverträglichkeit der Bastarde und der Ursprung der Polyploidie.) *Hereditas* (Lund) **18**, 1–55 (1933).

Verf. setzt sich kritisch mit den Theorien von Thompson, Watkins und Kihara und Nishiyama über die Ursachen der größeren oder geringeren Kreuzungssterilität zwischen Polyploiden und ihren diploiden Ausgangsrassen auseinander und begründet die schon früher geäußerte Theorie, nach der das geänderte Verhältnis der Chromatiningungen von Embryo, Endosperm und Mutterpflanze bei solchen Kreuzungen die Ursache der herabgesetzten Fruchtbarkeit ist. Dann wird gezeigt, wie diese Unfruchtbarkeit zwischen den verschiedenen Polyploidstufen von Wichtigkeit ist für die Erhaltung der Polyploidie. Endlich wird das häufige Vorkommen der Polyploidie bei den Angiospermen in ursächliche Verbindung gebracht mit der doppelten Befruchtung. Durch diese und die Endospermbildung werde der komplizierte, gegen quantitative Veränderungen des Chromatins so empfindliche Apparat geschaffen, der die zygotische Letalität bei Kreuzungen zwischen verschiedenen Polyploidstufen vermindert. Diese Letalität ist aber die Voraussetzung für die Erhaltung der Polyploiden.

E. Knapp (Berlin-Dahlem).

Webber, J. M.: Cytogenetic notes on cotton and cotton relatives. (Cytogenetische Notizen über Baumwolle und ihre Verwandten.) (*Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of Agric., Washington.*) *Science* (N. Y.) **1934 II**, 268–269.

Eine kurze Mitteilung bringt schlagwortartig wichtige Angaben über die Cytologie der *Gossypium*-Kreuzungen. Bastarde zwischen kultivierten ($n=26$) und wilden ($n=13$) amerikanischen Baumwollen zeigen bei den Reifeteilungen $13_{II}+13_{I}$, wie von Hybriden der 26-chromosomigen Arten mit asiatischen Spezies ($n=13$) bekannt. Der Bastard der amerikanischen Kulturarten mit dem australischen *G. sturtii* ($n=13$) bildet hingegen 39_{I} bis zu $4_{II}+31_{I}$. Bastarde zwischen amerikanischen Wildarten mit $n=13$ und *G. sturtii*, sowie zwischen der verwandten *Thurberia thespisoides* $n=13$ und *G. sturtii* entwickeln nur 26 Univalente. Es wird daraus der Schluß auf Allopolyploidie der 26-chromosomigen Arten gezogen. von Berg (Wien).

Lammerts, W. E.: Derivative types obtained by back-crossing *Nicotiana rustica-paniculata* to *N. paniculata*. (Nachkommenschaftstypen aus der Rückkreuzung von *Nicotiana rustica-paniculata* mit *N. paniculata*.) *J. Genet.* **29**, 355–366 (1934).

Durch fortgesetzte Rückkreuzungen des Bastards aus *Nicotiana rustica* (Chromosomenzahl $2n=48$) und *N. paniculata* ($2n=24$) erhielt Verf. eine Anzahl von Typen, welche die gleiche Chromosomenzahl wie *N. paniculata* besaßen, sich jedoch morphologisch von dieser Art deutlich unterschieden. Einige von diesen Typen wurden mehrere Generationen hindurch geselbstet, und eine Reihe davon züchtete rein weiter. Diese Typen wurden mit der normalen Art *N. paniculata* gekreuzt. Hierbei erwies sich der *N. paniculata*-Abkömmling als recessiv. Ferner wurde dann der F_1 -Bastard mit den recessiven Typen rückgekreuzt. In diesen Kreuzungen mendelten die meisten untersuchten Merkmale unifaktoriell. Es ist bemerkenswert, daß die Merkmale, in denen sich die Nachkommen aus den Rückkreuzungen von *N. paniculata* unterscheiden, bei keinem der beiden Eltern angetroffen werden. Verf. nimmt an, daß die sich in der

R. T. des F_1 -Bastards paarenden Chromosomen von *N. rustica* und *N. paniculata* infolge teilweise unterschiedlicher Anordnung ihrer Chromomeren nicht ganz homolog sind. So ist öfter die Möglichkeit zu crossing-over und deficiencies und somit zur Entstehung von abweichenden Typen mit gleicher Chromosomenzahl wie *N. paniculata* gegeben. Einige Rückkreuzungstypen wiederum können aus dem Zusammenwirken von *rustica*-Genen mit einem normalen *paniculata*-Komplex erklärt werden.

Schmidt (Müncheberg, Mark).^{oo}

Oehler, Ernst: Die Ausnutzung von Art- und Gattungsbastarden in der Weizenzüchtung. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Züchtungsforsch., Müncheberg, Mark.) Züchter 205—211 (1934).

Alle Arten der 4 Gattungen *Triticum*, *Aegilops*, *Secale* und *Haynaldia* lassen sich miteinander kreuzen. Der verschiedene Ansatz ist in erster Linie durch die verschiedenen Blütezeit der Eltern bedingt. Eine geringere Rolle dagegen spielen verwandtschaftliche Stellung, Chromosomenzahl und Spezifität der Genome. Auch Arten mit nicht homologen Genomen lassen sich kreuzen. Die Gattungsbastarde sind pollensteril und im weiblichen Geschlecht schwach fertil. Die Fertilitätsstörungen sind die Folgen gestörter Reduktionsteilung. Die fertilen weiblichen Gameten sind entweder unreduziert oder haben Chromosomenzahlen, die von der unreduzierten Zahl nur wenig abweichen. Da durch die Bastardierung die Möglichkeit gegeben ist, fertile, additive, konstante intermediäre Typen zu erhalten, so ist die Ausnutzung von Art- und Gattungsbastarden für die praktische Züchtung durchaus möglich. Hinzu kommt, daß sich die Merkmale beider Gattungen auch auf dem Wege über Rückkreuzungen, die zu fertilen Neukombinationen führen, vereinigen lassen. Alle wertvollen Typen treten naturgemäß sehr selten auf, daher ist zu fordern, daß diese Versuche in größtem Maßstabe durchgeführt werden, wenn in kurzer Zeit praktische Resultate erzielt werden sollen. Stubbe.

Dusseau, A.: Un hybride particulier de deux blés tendres: *Triticum haplodurum* (Ein eigenartiger Bastard aus zwei Weichweizen.) (57. sess., Chambéry, 24. VII. 4. VIII. 1933.) Assoc. Franç. Avancement Sci. 281—282 (1933).

In der 3. Generation eines Bastardes zwischen 2 *Triticum vulgare*-Rassen wurde eine Pflanze gefunden, die morphologisch zu *Triticum durum* zu rechnen ist. Die cytologische Untersuchung ergab 14 Chromosomen in somatischen und 7 Gemini in den Pollen- und Embryosackmutterzellen. Die Reduktionsteilung verläuft ganz normal. Dieser Fall ist einzigartig und widerspricht allen bisherigen Erfahrungen bei Weizen.

H. Bleier (Quedlinburg).

Harrington, J. B., and J. B. Marshall: F_2 endosperm development in relation to breeding technique with inter-specific wheat crosses. (Die F_2 -Endospermentwicklung in ihrer Beziehung zur Zuchttechnik bei Weizenartkreuzungen.) Canad. J. Res. 11 333—346 (1934).

Es sollte festgestellt werden, ob und inwieweit Zusammenhänge zwischen der Endospermentwicklung und dem Pflanzenhabitus in der F_2 -Generation von Weizenartkreuzungen bestehen. Die Untersuchungen wurden an 3 Kreuzungen durchgeführt: Jumillo (*T. durum*) $\times$ Marquis (*T. vulgare*), Marquis $\times$ Black Persian (*T. persicum*) und Vernal (*T. dicoccum*) $\times$ Marquis. Die F_2 -Samen jeder der 3 Kreuzungen wurden nach ihrer Beschaffenheit in 3 Klassen eingeteilt. Klasse A enthält die prallen Körner, zu Klasse B gehörten die leicht geschrumpften Körner, und die geschrumpften bildeten Klasse C. Es wurde festgestellt, daß aus den prallen Körnern wüchsiger Sämlinge wurden als aus den anderen. Ferner zeigte sich, daß in allen Kreuzungen die Pflanzen aus prallen Körnern weniger vulgare-ähnlich wurden als die aus leicht geschrumpften Körnern und die Pflanzen aus leicht geschrumpften Körnern wieder weniger vulgare-ähnlich als die aus geschrumpften. Die Kreuzung Jumillo $\times$ Marquis zeigte in der Verteilung der Samen auf die 3 Klassen Ähnlichkeit mit der Kreuzung Marquis $\times$ Black Persian. Bei der erstgenannten Kreuzung war die Sämlingswüchsigkeit bei Körnern der Klasse A sehr gering, bei der 2. Kreuzung jedoch hoch und bei der

Kreuzung Vernal $\times$ Marquis ziemlich hoch. Das vergleichende Studium einer größeren Zahl von morphologischen Merkmalen in der F_2 ergab u. a., daß die Kreuzung Juquillo $\times$ Marquis sich von den beiden anderen Kombinationen durch einen höheren Prozentsatz an vulgare-ähnlichen Merkmalen deutlich abhob. Im Hinblick auf das Bestreben, zu vulgare-ähnlichen Bastarden mit einem oder einigen Merkmalen von F_4 -chromosomigen Arten zu gelangen, lassen die Versuchsergebnisse einige Rückschlüsse auf die einzuschlagende Methodik zu. So wird man bei der Kreuzung von *T. persicum* $\times$ *T. vulgare* besser die prallen F_2 -Samen zur Weiteraussaat verwenden, während man bei den Kreuzungen *T. durum* $\times$ *T. vulgare* und *T. dicoccum* $\times$ *T. vulgare* keine Rücksicht auf die Körnerbeschaffenheit zu nehmen braucht. *M. Schmidt.*

Straib, W.: Untersuchungen zur Genetik der Gelbrostresistenz des Weizens. (*Inst. Landwirtschaftl. Botanik, Braunschweig-Gliesmarode.*) *Phytopath. Z.* 7, 427—477 (1934).

In weit größerem Ausmaß als bei anderen Rostarten wird das Resistenzverhalten gegen Gelbrost durch mannigfache Außenfaktoren, insbesondere durch die Temperaturverhältnisse beeinflusst. Um einen Einblick in die Gesetzmäßigkeiten der Vererbung von Resistenz und Anfälligkeit bei Weizenkreuzungen zu gewinnen, um ferner Aufschluß über die absolute und relative Resistenz bzw. Immunität der Kreuzungsnachkommenschaften zu erhalten, sind daher die vorliegenden umfangreichen Untersuchungen ausschließlich unter genau kontrollierten Gewächshausbedingungen an Keimpflanzen durchgeführt. Die vorgenommenen Weizenkreuzungen wurden bis zur F_4 -Generation verfolgt, von den bisher isolierten Gelbrostrassen wurden 18 Rassen in die Resistenzprüfungen einbezogen. In sämtlichen Kreuzungen stellt absolute Immunität gegenüber den verschiedenen Gelbrostrassen ein dominantes Merkmal dar, das monofaktoriell vererbt wird. Das Anfälligkeitsverhalten des anderen Elters ist dabei ohne Bedeutung. Absolute und relative Resistenz sowie relative Immunität werden je nach Kreuzung und geprüfter Gelbrostrasse dominant, intermediär oder rezessiv durch einen oder mehrere Faktoren vererbt. Immunität und Resistenz gegenüber zahlreichen Gelbrostrassen können in derselben Kreuzung durch ein und denselben Faktor vererbt werden. Die verschiedenen Gelbrostreaktionen einer Kreuzung gegenüber einer größeren Anzahl von Rassen ermöglichen daher hinsichtlich der Vererbung von Resistenz oder Immunität eine gruppenweise Zusammenfassung der Rostrassen. Diese Feststellung bedeutet naturgemäß für die praktische Resistenzzüchtung einen großen Gewinn, weil durch die Prüfung mit nur wenigen Rassen das Resistenzverhalten gegen alle anderen bisher bekannten Gelbrostformen klargestellt werden kann. Zwischen Gelbrostverhalten und anderen Eigenschaften der Weizenpflanze bestehen — wenigstens bei Kreuzungen der Vulgare-Gruppe — keine Korrelationen. *Hassebrauk* (Braunschweig).

Lunden, Aksel P., und Ivar Jørstad: Investigations on the inheritance of immunity to wart disease (*Synchytrium endobioticum* (Schild.) pere.) in the potato. (Untersuchungen über die Vererbung der Widerstandsfähigkeit gegen Kartoffelkrebs [*Synchytrium endobioticum* (Schild.) pere.].) (*Botan. Museum, Oslo.*) *J. Genet.* 29, 375—385 (1934).

Verff. prüften ihr ursprünglich für züchterische Zwecke bestimmtes Material auf die Aufspaltung in krebswiderstandsfähige und krebsanfällige Sämlinge. Die Prüfung wurde in der Weise durchgeführt, daß von jeder Pflanze 2—3 Knollen in mit Krebskompost versetztem Sphagnum zum Austreiben gebracht wurden. Von den nicht befallenen Pflanzen wurden in den darauffolgenden Jahren nochmals 2—3 Knollen geprüft, so daß die Ergebnisse wohl als recht sicher gelten können. Geprüft wurden im wesentlichen Kreuzungen mit Centifolia, Jubel, Hindenburg, Dukker, Golden Lass und Flourball. Die Selbstungen aller anfälligen Sorten ergaben nur anfällige, die Selbstungen der widerstandsfähigen Sorten in allen Fällen Spaltungen im Verhältnis 3 widerstandsfähige und 1 anfällige. Aus den Kreuzungen „widerstandsfähig $\times$ anfällig“ ergaben sich Spaltungen 1:1 und Spaltungen 5 widerstandsfähige:3 anfällige.

Die Kreuzungen der Widerstandsfähigen untereinander ergaben wechselnde Spaltungen im Verhältnis „widerstandsfähig:anfällig“ wie 30:1, 3:5, 7:1, 15:1. Die Kreuzung Irish Cobbler $\times$ Jubel ergab nur widerstandsfähige. Verff. nehmen 4 Faktoren für die Widerstandsfähigkeit gegen Krebs an: X' und X'' , 2 dominante Faktoren, die unabhängig voneinander, jeder für sich, Krebswiderstandsfähigkeit bedingen; Y und Z , 2 ebenfalls dominante Faktoren, die nur zusammen Widerstandsfähigkeit bedingen. Diese Formulierung stimmt nicht ganz überein mit der von Salaman, bei dem 3 Faktoren — X , Y , Z — komplementär wirken. Schick (Müncheberg, Mark).^{oo}

Philip, Ursula: Die Paarung der Geschlechtschromosomen von *Drosophila melanogaster*. Untersucht an Translokationen des langen Armes des Y -Chromosomes, nebst einem cytologisch-genetischen Beweis der Morganschen Theorie des Faktorenaustausches. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol., Berlin-Dahlem.) Z. indukt. Abstammungslehre 67, 446—476 (1934).

Genetisch-cytologische Untersuchungen an $\sigma\sigma$ und $\varphi\varphi$ mit überzähligen Geschlechtschromosomen oder Teilen von ihnen auf den Einfluß, den diese auf die Paarung und Verteilung der Geschlechtschromosomen ausüben. $\widehat{XY}YY \sigma\sigma$ müssen bei gleicher Wahrscheinlichkeit der Paarung zwischen X und jedem der beiden YY und zwischen diesen unter sich $\widehat{XY}Y$ - und Y -Gameten doppelt so häufig gehen, wie $\widehat{XY}$ - und YY -Gameten. Bei Kreuzung mit normalen Weibchen ist also ein Nachkommenverhältnis von $1 \widehat{XXY}^- \varphi : 2 \widehat{XXY}Y^- \varphi\varphi$ und von $2 XY-\sigma : 1 XYY-\sigma$ zu erwarten. Für die $\sigma\sigma$ wurde ein entsprechendes Verhältnis gefunden (1:2,05), für die $\varphi\varphi$ dagegen anstatt 1:2 1,85:1. Diese Umkehrung beruht auf geringerer Vitalität der $\widehat{XXY}Y^- \varphi\varphi$; 30% der Eier dieser Kreuzung entwickeln sich nicht. Gleiche Versuche mit $\widehat{XY}Y''Y''-\sigma\sigma$ ergaben statt der den obigen entsprechenden Ergebnisse, daß die Paarung nicht zufallsgemäß erfolgt, sondern daß die Affinität der $Y''Y''$ zueinander verringert ist. In $X^pX^dY-\sigma\sigma$ erfolgte die Paarung stets zwischen X^p und Y . X^d wird zufallsmäßig verteilt. Genau so verhielten sich $\widehat{X^pY}X^dY-\sigma\sigma$. Geringe Abweichungen vom erwarteten Zahlenverhältnis werden mit dem vitalitätsvermindernden Einfluß der überzähligen Chromosomen erklärt. Aus diesen Versuchen ergibt sich, daß der lange Arm des Y eine einem Teil von X^p homologe Paarungsregion besitzt und daß es keinen Einfluß auf die normale Reduktion der übrigen Geschlechtschromosomen ausübt. Über die Ursachen der verringerten Affinität der $Y''Y''$ wird die Untersuchung von anderer Seite fortgesetzt. — In $\widehat{XXX}^p-\varphi\varphi$ zeigte sich ein hoher Prozentsatz von Nondisjunktion (im Mittel 5,42%). Dagegen trat in $\widehat{XXX}^pY^-$ - und $\widehat{XXX}^p-\varphi\varphi$ nur ein niedriger, dem normalen Stamme entsprechender Prozentsatz auf. Die Ursache liegt also in dem Auftreten eines freien X^p -Fragmentes. Dieses ist zu kurz, um sich stets mit der $\widehat{XX}$ -Gruppe zu paaren (d. h. mindestens ein Chiasma zu bilden); es bleibt dann ungepaart und wird zufallsgemäß auf die Pole verteilt. Ist es an Y' angeheftet, so paart sich dieses mit einem X , so daß normale Reduktion möglich wird. — Ein dem von Stern entsprechender Beweis für den Chromosomenstückeaustausch ergab sich aus den Kreuzungen mit $\widehat{XXX}^p$ - und $\widehat{XXX}^pY^- \varphi\varphi$. Durch Austausch zwischen $\widehat{X}$ und X^p entstehen die neuen Chromosomen $\widehat{XX}^p$ und X bzw. $\widehat{XY}'$. Dieses wurde genetisch durch Markierungsgene ($y+^B$ bzw. $sc w+^B$ in jedem der beiden $\widehat{XX}$ und B in X^p) bewiesen und cytologisch in allen (52) Fällen an den Ausnahmestadien oder ihren Töchtern bestätigt. Der Austauschprozentsatz zwischen B und bb (als dem genetisch rechten Ende) ist in allen Kreuzungen sehr niedrig (0,15—0,53 statt 13%). was wohl wieder mit der geringeren Paarungsmöglichkeit für das kurze X^p -Fragment zusammenhängt. In Kreuzungen der Austauschstöchter ($\widehat{XX}^pX$) wurden ebenfalls durch Austausch wieder $\widehat{XXY}^- \varphi\varphi$ erhalten, was gleicherweise genetisch und cytologisch verfolgt wurde.

H. Bauer (Berlin-Dahlem).

Gowen, John W., and E. H. Gay: **Chromosome constitution and behavior in transporting and mottling in *Drosophila melanogaster*.** (Chromosomenkonstitution und Verhalten von Mosaikmerkmalen bei *Drosophila melanogaster*.) (*Rockefeller Inst. f. Med. Research, Princeton.*) *Genetics* **19**, 189—208 (1934).

Drei Fälle von mosaikfarbigen Augen (Mottled 1, Mottled 2 und Mottled 3) werden beschrieben. Alle 3 Fälle beruhen scheinbar auf komplizierten genetischen und cytologischen Änderungen, da sie partielle Letalität und Sterilität (besonders bei Männchen), Doppelung mit mehreren Chromosomen (Mottled 1 ist mit den Chromosomen I, II und III, Mottled 2 — mit den Chromosomen I und IV, und Mottled 3 mit den Chromosomen I, II und III gekoppelt) und eine Reihe von cytologischen Abnormitäten aufweisen. Eine klare Entscheidung über die Ursachen der Mosaikbildungen konnte bisher noch nicht getroffen werden. Die ausführliche Beschreibung und die theoretische Berechnung dieser und auch anderer, aus der Literatur bekannter Fälle muß im Original nachgelesen werden. Alle drei hier beschriebene Mottleds wurden durch Röntgenstrahlung hervorgerufen. *N. Timoféeff-Ressovsky* (Berlin-Buch).

Patterson, J. T., and Meta L. Suche: **Crossing over induced by X-rays in *Drosophila* males.** (Durch Röntgenbestrahlung hervorgerufener Faktorenaustausch bei *Drosophila*-Männchen.) *Genetics* **19**, 223—236 (1934).

Ähnlich wie in den Versuchen von Friesen, die den Verff. zur Zeit der Durchführung und Drucklegung ihrer Arbeit scheinbar noch nicht bekannt waren, ist es den Verff. gelungen, durch Röntgenbestrahlung unreifer Spermien Faktorenaustausch in II-Chromosom von *Drosophila melanogaster* zu induzieren. Im ganzen wurden 77 Austauschfälle unter 8371 darauf geprüften Fliegen gefunden, die sich auf die Strecke von roughoid (0,0) bis claret (100,7) verteilen. *N. Timoféeff-Ressovsky*.

Patterson, J. T., Wilson Stone, Sarah Bedichek and Meta Suche: **The production of translocations in *Drosophila*.** (Hervorrufung von Translokationen bei *Drosophila*.) *amer. Naturalist* **68**, 359—369 (1934).

In 10000 F₂-Kulturen von *Drosophila melanogaster*-Männchen, die mit 4450 röntgenbestrahlt wurden, fanden die Verff. 1992 Translokationen zwischen verschiedenen Chromosomen. Die meisten dieser Translokationen wurden auf Lebensfähigkeit in homozygotem Zustande, Fertilität, Lebensfähigkeit der hyperploiden Kombination und Stellen der Chromosomenbrüche geprüft. Relativ viele von den Translokationen (vor allem die I—IV) haben sich als homozygot lebensfähig und fertil erwiesen. Besonders häufig traten II—III-Translokationen auf. Die Brüche finden am häufigsten in der Nähe der freien und der Spindelfaserenden der Chromosomen statt. Dadurch erklärt sich wohl die Häufigkeit der II—III-Translokationen, da jedes von diesen Chromosomen zwei freie und zwei Spindelfaserenden hat. Einzelheiten müssen im Original dieser Arbeit, die ein sehr großes Material zur Frage über Translokationsentstehung bei *Drosophila* enthält, nachgelesen werden. *N. Timoféeff-Ressovsky*.

Moore, W. G.: **A comparison of the frequencies of visible mutations produced by X-ray treatment in different developmental stages of *Drosophila*.** (Vergleich der Häufigkeiten sichtbarer Mutationen, induziert durch Röntgenstrahlen in verschiedenen Entwicklungsstadien von *Drosophila*.) *Genetics* **19**, 209—222 (1934).

Es wurden die Raten der sichtbaren, geschlechtsgebundenen Mutationen verglichen, die nach Bestrahlung von Weibchen und Männchen im Larven- und im Imagostadium mit gleicher Röntgendosis bei *Drosophila melanogaster* auftreten. Die beiden Geschlechter haben keinen statistisch reellen Unterschied gezeigt. Bei Weibchen werden auch in allen Entwicklungsstadien gleiche Mutationsraten ausgelöst. Bei Männchen werden nach Bestrahlung im Larvenstadium etwas weniger Mutationen gefunden, als nach Bestrahlung im Imagostadium. Verf. führt aber diesen Unterschied nicht auf verschiedene Labilität der Gene in reifen und unreifen Spermien, sondern hauptsächlich auf differentielle Fortpflanzung mutierter und nichtmutierter, unreifer Geschlechtszellen beim Männchen zurück. *N. Timoféeff-Ressovsky* (Berlin-Buch).

Zarapkin, S. R.: Analyse der genotypisch und durch Außenfaktoren bedingten Größenunterschiede bei *Drosophila funebris*. II. Verhältnis zwischen Körpergröße und Zellenzahl. (*Genet. Abt., Kaiser Wilhelm-Inst. f. Hirnforsch., Berlin-Buch.*) Z. indukt. Abstammungslehre 68, 163—171 (1934).

In der I. Mitteilung war dargestellt worden, wie aus einer wilden Population von *Drosophila funebris* durch Selektion 2 Rassen isoliert waren, welche sich genetisch im Merkmal der Körpergröße — gemessen an der Flügellänge — unterschieden. Der Verf. nimmt nach Kreuzung dieser beiden Rassen und Vergleich von Eltern, F_1 und F_2 an, daß die gemessenen Eigenschaften polymer durch einige Gene bedingt sind. Es folgt jetzt eine entwicklungsphysiologisch-statistische Untersuchung der Beziehungen zwischen Zellengröße und -zahl und der Körpergröße. Dabei stellt sich heraus, daß der genotypische Unterschied in der Größe zwischen den beiden Rassen auf einen Unterschied in der Zellenzahl zurückgeht, während die durch verschiedene Außenfaktoren hervorgerufenen modifikatorischen Größenunterschiede auf verschiedene Zellgrößen zurückgehen. Der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen ist aber auch in erster Linie von der Zellgröße abhängig, wenn auch bis zu einem geringen Grade Verschiedenheiten in der Zellenzahl hinzukommen können. Innerhalb der gleichen Rasse besteht keine Korrelation zwischen Eiergröße und Körpergröße. Die Eier der beiden Rassen verhalten sich gerade umgekehrt wie die Körpergrößen: aus genotypisch kleinen Eiern entstehen große, aus großen kleine Fliegen. Der Verf. nimmt an, daß Eiergröße und Körpergröße durch verschiedene, unabhängige Gene bestimmt werden. Diese sind zufällig bei der Selektion so verteilt worden, daß Gene für große Eier mit Genen für geringe Zellenzahl, d. h. kleine Fliegen, und umgekehrt, in eine Rasse zusammengekommen sind. (I. vgl. diese Ber. 31, 572.) G. Melchers (Berlin-Dahlem).

Zarapkin, S. R.: Analyse der genotypisch und durch Außenfaktoren bedingten Größenunterschiede bei *Drosophila funebris*. III. Dauer der individuellen Entwicklung in der Plus- und Minus-Kultur. (*Genet. Abt., Kaiser Wilhelm-Inst. f. Hirnforsch., Berlin-Buch.*) Z. indukt. Abstammungslehre 68, 172—184 (1934).

In der III. Mitteilung wird nun noch über die Beziehung der Entwicklungsdauer zur Zellenzahl und -größe berichtet. Unterschiede werden vor allem in der Larvenentwicklung gefunden, während die Puppenzeit ziemlich konstant ist. So beträgt der Unterschied zwischen der großen und der kleinen Rasse in der Larvenzeit im Mittel 2,5 Tage, während in der Puppenzeit kein statistisch gesicherter Unterschied gefunden wird. Und zwar entwickeln sich die großen Fliegen langsamer als die kleinen. Der Verf. kann in seinen Kulturen keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern im Puppenstadium finden. Nur in der großen Rasse wird im Larvenstadium eine etwas langsamere Entwicklung der Weibchen festgestellt, während in der kleinen Rasse auch in diesem Stadium kein Unterschied zwischen den Geschlechtern besteht. Auch die modifikatorischen Einflüsse von Außenfaktoren greifen hauptsächlich im Larvenzustand und kaum im Puppenzustand an. Übervölkerung bewirkt eine längere Entwicklung und kleinere Fliegen; bei tiefen Temperaturen entwickeln sich die Larven ebenfalls langsamer, die Fliegen werden aber größer. Länge der Larvenzeit und Länge der Puppenzeit sind nur ganz schwach positiv miteinander korreliert (große Rasse Korr.-Koeff. = + 0,47; kleine Rasse + 0,1344). G. Melchers (Berlin-Dahlem).

Buck, A. de, E. Schoute und N. H. Swellengrebel: Crossbreeding experiments with Dutch and foreign races of *Anopheles maculipennis*. (Kreuzungen zwischen niederländischen und fremden Rassen von *An. maculipennis*.) (*Swellengrebel's Zool. Laborat. Dep. of Trop. Hyg., Roy. Colon. Inst., Amsterdam.*) Riv. Malariol. 13, 237—263 (1934).

Holländischer atroparvus ♂ und messeae ♀ sowie messeae ♂ × atroparvus ♀ sind miteinander in jeder Weise steril, weil die Nachkommenschaft auf dem Larvenstadium zugrunde geht. Kreuzungen zwischen italienischen messeae, typicus, labbranchiae, elutus ♀ und atroparvus ♂ aus Holland waren fruchtbar, ebenso die Kreuzung atroparvus Holland Weibchen und labbranchiae Italien Männchen. (Die Männchen von elutus,

typicus, messeae begatten nicht in der Gefangenschaft.) Bei den fruchtbaren Kreuzungen sind die Männchen der F_1 -Generation steril, nur bei der Kreuzung labbranchiae atroparvus kommt anscheinend eine kleine Zahl nichtsteriler Männchen vor. Sonst lassen sich die Bastarde mit atroparvus zurückkreuzen, nur nicht typicus, da die weiblichen der Kreuzung (atroparvus ♂ $\times$ typicus ♀) auch steril sind. In einigen Merkmalen dominiert atroparvus fast vollkommen, doch nicht in allen. Es kommt auch intermediäres Verhalten von Merkmalen vor. Die Nachkommen einer reinen Rasse haben die gleiche Art Eier wie ihre Eltern.

Martini (Hamburg).

Taylor, Lewis W.: Creeper and single-comb linkage in the fowl. (Krüper- und Einfachkamm zwischen Kopplung beim Huhn.) *J. Hered.* **25**, 205—206 (1934).

Die Kopplungsprüfung ergab für die Gene Krüper und Einfachkamm (Allel zum Rosenkamm) den durchschnittlichen Austauschwert von 0,5%. Verf. hatte in dem ersten Jahre seiner Untersuchungen einen viel höheren Austauschwert gefunden, da die Bestimmung des Merkmals Krüper allein nach dem Aussehen der Beine vornahm; erst die genaue Untersuchung der Fibula- und Tibiastruktur bei Embryonen nach Landauer (vgl. diese Ber. **23**, 346 u. **25**, 201) gibt eine exakte Einordnung in die richtigen Klassen und beseitigt den auch von Serebrowsky und Petrow verzeichneten Überschuß an Tieren der Klasse Einfachkamm-Normal.

Eugen Schwarz.

Manen, E. van: Culling of poultry. I. Body conformation. (Auslese bei der Geflügelzucht. I. Körperform.) *J. S. afric. vet. med. Assoc.* **5**, 115—119 (1934).

Es werden kurz die Körperformen charakterisiert, die die guten Legehennen von schlechten Legerinnen unterscheiden. Die Angaben dienen dem Züchter nur zur groben Orientierung bei seiner Auslese der wahrscheinlich guten Legerinnen.

Eugen Schwarz.

Manen, E. van: Culling of poultry. II. Pigmentation and moulting. (Auslese in der Geflügelzucht. II. Pigmentierung und Mauser.) *J. S. afric. vet. med. Assoc.* **5**, 122—186 (1934).

Die Gelbfärbung der Schnäbel und Läufe der Hennen ist ein Gradmesser ihrer Legeleistung; je stärker die Legeleistung war, um so weniger Gelb enthalten Schnabel und Lauf am Ende der Legeperiode. Es kann also vom Züchter dieses Merkmal bei der Auslese herangezogen werden. Weiterhin wird die Bedeutung des verschiedenartigen Mauserablaufes für die Legeleistung und für die Leistungstierauslese unter tierärztlichen Gesichtspunkten erörtert.

Eugen Schwarz (Berlin-Dahlem).

Grothkopp, H.: Erblichkeit bei Lippen- und Gaumenspalten. *Vox (Hamburg)* **20**, 51—54 (1934).

Um das vorwiegend aus chirurgischen Kliniken und von Medizinern stammende und bearbeitete Material zu ergänzen, will der Verf. aus dem Arbeitsbereich der Sprachheilschule einen Beitrag zur Vermehrung des Materials von Ahnentafeln beibringen. Derartige Angaben „zeigen je nach der Methode der Statistik und der Art und Größe des Materials abweichende Verhältniszahlen“. Eine Anzahl von Tabellen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, müssen im Original eingesehen werden. Gutzmanns Bezeichnung („wo vermöge der örtlichen Verhältnisse eine sorgsame Untersuchung in Bezug auf die erbliche Belastung bei Lippen- und Gaumenspalten vorgenommen werden kann, da treffen wir auch höhere Zahlen“) wird bestätigt. Der Verf. versucht durch Familienforschung, namentlich unter Berücksichtigung der gesunden Verwandten, Beobachtungen über die Erblichkeit der Lippen- und Gaumenspalten zu sammeln. Untersucht wurden die Familien der Schüler der beiden Hamburgischen Sprachheilschulen und die der Patienten aus der Sprechstunde für Sprachleidende. In welcher Weise die erforderlichen Auskünfte erhoben wurden und wie sie zu bewerten sind, wird ausführlich auseinandergesetzt. Es folgt eine Reihe der auf Grund der Untersuchungen aufgestellten Ahnentafeln. Der Verf. kommt zu dem Ergebnis: „Ein genaueres Bild über die Art des Erbganges bei Lippen- und Gaumenspalten ließ sich aus dem bisher aufgenommenen Material nicht gewinnen“, schließt sich aber der Fetscherschen

Annahme an, „daß es sowohl recessive als auch dominante Faktoren für die verbreitete Anlage zu Lippen- und Gaumenspalte gebe.“ Ein Literaturverzeichnis beschließt die Arbeit.

Hans Bremner (Berlin-Wilmersdorf).⁰⁰

Albrecht, W.: Die erblichen Ohrleiden und das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. (14. Jahresvers. d. Ges. Dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte [e. V.], Würzburg, Sitzg. v. 17.—19. V. 1934.) Z. Hals- usw. Heilk. 36, Kongr.-Ber., 2. Tl, 262—272 (1934).

Zwei grundsätzlich verschiedene Auffassungen über Genese und Entwicklung der erblichen Ohrleiden stehen sich in scharfem Gegensatz gegenüber: Hammerschlag, Bau und Stein vertreten die Ansicht, daß sämtliche Erbleiden des inneren Ohres von einer einzigen Noxe verursacht werden, daß aber je nach der Art der Vererbung die Krankheit als Otosklerose, Taubstummheit oder Innenohrschwerhörigkeit auftritt; Lenz, Hanhart und Albrecht sehen in jeder dieser Krankheiten ein selbständiges, in sich geschlossenes Leiden mit der ihm eigenen Genese und Vererbung und der ihm eigenen Pathologie. Verf. läßt nun die Hammerschlagschen Thesen der Heredopathia acustica Revue passieren. Von der klinischen Seite läßt sich die These Hammerschlags nicht beweisen, von der erbtheoretischen Seite muß zu ihrer Erklärung die Hypothese der Polyallelie zu Hilfe genommen werden, was Verf. für unnötig und unberechtigt hält, da die Tatsache des rezessiven Erbgangs der Otosklerose im Gegensatz zum partiell-dominanten der labyrinthären Schwerhörigkeit für verschiedene Erbanlagen der verschiedenen Ohrleiden spricht und nach Meinung des Verf. „weiterer gekünstelter“ Erbformeln nicht bedarf. Eine wesentliche Stütze findet Hammerschlag in den Ergebnissen der pathologischen Anatomie durch häufiges kombiniertes Vorkommen von Otosklerose und hereditärer Taubstummheit, eine von zahlreichen Autoren bestätigte Beobachtung. Verf. hält auch dieses Argument nicht für stichhaltig und will die gehäufte Kombination damit erklären, daß sich seit Jahrhunderten Schwerhörige und Taube aus äußeren Gründen gegenseitig heiraten. Verf. unterscheidet daher nach alter Tradition 4 selbständige Krankheitsbilder: 1. Die Otosklerose, für die nach Meinung des Verf. eine Zwangssterilisierung nicht in Frage kommt, für die er aber eine freiwillige Sterilisierung zur Aussprache stellt. 2. Die kretinische Schwerhörigkeit und Taubheit (Typus Siebenmann), für die, entsprechend der geltenden Anschauung von der vorwiegenden Umweltbedingtheit des Kretinismus eine Zwangssterilisierung nicht in Frage kommt. 3. Die hereditäre Innenohrschwerhörigkeit und Taubheit (Typus Mondini) soll entsprechend ihrer einwandfrei geklärten Erbbedingtheit in allen schweren Fällen, die praktisch einer Taubheit gleich zu setzen sind, sterilisiert werden. 4. Die sporadische oder rezessive Taubstummheit (Typus Scheibe) muß sterilisiert werden, wodurch zweifellos die gefährlichsten Erbträger gefaßt werden; selbstverständlich ist die Zahl der latenten Erbträger erheblich viel größer als die der manifesten. Das Mittel zur Verhütung einer Verbreitung der Taubstummheit durch diese latenten Erbträger sieht Verf. nur in der Verhinderung der Verwandtenehen, gegen die er eine lebhaft propagandistische Aufklärungstätigkeit empfiehlt. Die Zahl der erblich Taubstummen wird in Deutschland auf 13000—18000 geschätzt. Die Gesamtzahl der Taubstummen in Deutschland beträgt 45000, demnach ist das Verhältnis der Ertaubten zu den erblich Tauben 2:1. Thummes

Pincus, Gregory, and Priscilla White: On the inheritance of diabetes mellitus. II. Further analysis of family histories. (Die Erblichkeit beim Diabetes mellitus. II. Weitere Analysen von Familienvorgeschichten.) (Laborat. of Gen. Physiol., Harvard Univ., George F. Baker Clin. a. New England Deaconess Hosp., Boston.) Amer. J. med. Sci. 188, 159—168 (1934).

Von etwa $4\frac{1}{2}$ Tausend Diabetikern war in 6,7% der Fälle eine eindeutige familiäre Belastung nachzuweisen, während bei rund 1300 Nichtdiabetikern nur 1,2% eine erbliche Belastung mit Diabetes nachzuweisen war. Auf Grund der Untersuchungen kamen die Autoren zu dem Ergebnis, daß für die Lebensversicherungsmathematik die Mendelschen Erwartungen völlig ausreichen. Es ist höchstwahrscheinlich, daß die Entwicklung von Diabetes in der Hauptsache auf der Übertragung eines einzigen recessiven Gens beruht. (I. vgl. diese Ber. 31, 473.) Strieck (Würzburg).⁰

Vogt, E.: Die Bedeutung der erblichen Bedingtheiten in der Geburtshilfe und Gynäkologie. (Frauenklin., Staatl. Krankenstift, Zwickau i. Sa.) Med. Klin. 1934 I, 921—924.

Ritter, A.: Erbpathologie und Chirurgie. (Thurgau. Kantonsspit., Münsterlingen Schweiz.) Med. Klin. 1934 II, 985—987.

Artbildung. (*Biometrik, Konstitutionslehre, Anthropologie.*)

Biraghi, A.: Variazioni in due ceppi di „Gloeosporium olivarum“ Alm. di provenienze diverse. (Variationen in 2 Reihen von Kolonien von „Gloeosporium olivarum“ Alm. verschiedener Herkunft.) Boll. Staz. Pat. veget., N. s. 14, 223—253 (1934).

Gloeosporium olivarum ist in Portugal und in Spanien verbreitet, fehlt in Frankreich und Italien, ist häufig auf Korfu. Formen aus Griechenland und aus Portugal wurden in Reinkulturen gezogen und vielfach Änderungen im Substrat vorgenommen. Chlamydosporenbildung konnte nur an der portugiesischen Form festgestellt werden. Auffallend war bei beiden die Neigung zur Bildung von Variationen, was die Annahme berechtigt, daß der Pilz auch in der Natur die Fähigkeit hat, sich in eine Anzahl von Formen zu spalten, von denen jede bestimmten Bedingungen der Ernährung und des Standortes entspricht.
P. Justus Kalkschmid.

Hunter, A. W. S.: A karyosystematic investigation in the gramineae. (Eine karyosystematische Untersuchung bei Gramineen.) (*Dep. of Genet., McGill Univ., Montreal.*) Canad. J. Res. 11, 213—241 (1934).

Nach einem Überblick über die historische Entwicklung der Gramineensystematik wird das System von Avdulov eingehend betrachtet. Im wesentlichen schließt sich Verf. diesem System an und berichtet noch über eigene Untersuchungen von Chromosomenzahlen. Hierbei wurden die Bambuseae, Festuceae, Chlorideae, Hordeae, Agrostideae, Phalarideae, Melinideae, Paniceae, Andropogoneae und Maydeae erfaßt. Im einzelnen wurden nicht wesentlich neue Ergebnisse bei den Zählungen gefunden.
Propach (Müncheberg, Mark).

Robson, W. S.: The seedling characters of some cultivated Brassicae. (Die Sämenseigenschaften einiger kultivierter Brassica-Arten und Varietäten.) (*Dep. of Agricult. Botany, Univ., Reading.*) Ann. appl. Biol. 21, 418—429 (1934).

Verf. hat zur Auffindung von Unterscheidungsmerkmalen den Habitus folgender Brassica-Sämlinge untersucht: Brassica Napo-brassica D. C., B. Rutabaga L., B. Napus oleifera L., B. Napus annua L., weiß- und gelbfleischiger Turnips (B. Rapa L.), B. campestris oleifera L., B. campestris annua L. Die Sämlinge werden ausführlich beschrieben. Im Gegensatz zu Gorman und Lafferty stellt Verf. fest, daß zwischen Brassica Napo-brassica, B. Rutabaga, B. Napus oleifera, B. Napus annua untereinander einerseits und den weiß- und gelbfleischigen Turnips, B. campestris oleifera, B. campestris annua untereinander andererseits im Sämlingsstadium keine konstanten Merkmalsunterschiede bestehen. [*Scient. Proc. of the Royal. Dubl. Soc.* 20, 11, 119 (1931).]
Ufer (Berlin).

Moritz, Otto: Über serologische Verwandtschaftsforschung. (*Botan. Inst., Univ. Kiel.*) Züchter 6, 217—221 (1934).

In diesem vor Pflanzenzüchtern gehaltenen Vortrag zeigt der Verf., daß durch die von ihm in die Botanik eingeführte serologische Methode auch Probleme, die dem praktischen Pflanzenzüchter am Herzen liegen, weitgehend gefördert werden können. So greift der Verf. z. B. die Frage nach der Herkunft der Kulturpflanzen auf und führt unter anderem auch zur Erläuterung seiner Methodik die Erfahrungen an, die er bei seinen Versuchen zur serologischen Differenzierung eines Bastardes zwischen Aegilops ovata und Triticum dicoccoides gemacht hat. Die von ihm verwertete Methode besteht in der Beobachtung und Aufzeichnung von Muskelzuckungen, welche die Uterushörner vorbehandelter Meerschweinchen erkennen lassen, wenn sie mit Eiweiß in Berührung kommen, das dem Vorbehandlung entspricht oder ihm serologisch nahesteht. Wurden nun Meerschweinchen gegenüber dem Eiweiß eines der Elternpflanzen des „Aegilotriticum“-Bastardes immunisiert, so konnte jedes der Eltern-Antisysteme durch den Extrakt aus dem Bastard restlos abgesättigt werden. Andererseits ließ sich das gegenüber dem Bastard erzeugte Antisystem durch die nacheinander zur Anwendung

gebrachten Extrakte aus den beiden Elternpflanzen restlos absättigen. Daraus geht hervor, daß sich die Eiweißmerkmale bei Kreuzungen einfach summativ verhalten. Demnach entstehen bei der Bastardierung keine neuen Merkmale. Für den hier speziell untersuchten Bastard konnte ferner noch gezeigt werden, daß seine Eiweißgarnitur weitgehend mit der von *Aegilops ovata* übereinstimmte. Auch auf die Klärung der anderen Fragen, deren Inangriffnahme der Verf. ankündigt, darf man nach den schonem bisher erzielten Ergebnissen gespannt sein. *Karl Silberschmidt* (München).

Sousa, O. Machado de: Studium über die Möglichkeit allgemeiner Anwendung der menschlich typologischen Methoden und über die Übereinstimmung der Klassifikationen. Die morphologischen Typen bei den Indochinesen und Malgachen. Die Wechselbeziehung: Rasse-Konstitution. (*Inst. Anat., Univ., Toulouse.*) Ann. Fac. Med. São Paulo 10, 33—58 (1934) [Portugiesisch].

Bei 100 untersuchten Indochinesen war die Häufigkeit der morphologischen Typen nach der Klassifikation von Viola folgende: *Megalosplanchnicos* 9%, *Normosplanchnicos* 36%, *Mikrosplanchnicos* 16%, Gemischte 39%. Bei 50 Malgachen war die Verteilung der Typen nach Manouvrier folgende: *Brachyskelicos* oder *Macrocrimicos* 66%, *Mesoskelicos* oder *Metriokormicos* 12%, *Macrokelicos* oder *Brachykormicos* 22%. Bei den Indochinesen ist die Form des Schädels unabhängig von dem morphologischen Typus, die Form des Gesichtes dagegen nicht. Zwischen den Rassen- und den Konstitutionstypen besteht keine Beziehung. *Voss* (Leipzig).

Macieszka, A.: Das Individuum als Gegenstand anthropologischer Studien. Warszawa Czas. lek. 9, 1—9 (1934) [Polnisch].

Verf. nimmt an, daß bestimmten anthropologischen Typen eine spezifische Korrelation der inkretorischen Drüsen entspricht und wünscht, eine Individualanthropologie aufzustellen, damit endlich klar wird, welche Merkmale erblich und welche durch äußere Einflüsse bedingt sind. Wir werden die jetzige Richtung in der Anthropologie, die Mittelwerten, Indexen und statistischen Erhebungen an großen Populationen huldigt, verlassen müssen, um nach Matuzsak und Szapowalnikow uns der deskriptiven Methode und der Registration physiologischer Eigenschaften am Individuum zuzuwenden. *J. A. Valšík* (Prag).

Muzj, E.: Zur Anthropologie des Gesichts und des Kauapparats. Dtsch. Zahn- usw. Heilk. 1, 152—158 (1934).

Für den Orthodontisten ist die Kenntnis der anthropologischen Betrachtung des Kopfes von Wichtigkeit. Der Verf. stellt daher auf Grund des Längen-Breiten-Index des Kopfes, des Gesichtsindezes und des Campersehen Gesichtswinkels zwei primäre Formen auf, eine brachycephale, leptoprosope, orthognathe und eine dolichocephale, chamäprosope, prognathe Form, wobei er leider nur gänzlich veraltete anthropologische Literatur benutzt und nicht in ganz richtiger Weise auswertet. Aus der Kombination dieser beiden Primärformen entstehen verschiedene sekundäre oder gemischte Formen, die für den Orthodontisten von besonderer Bedeutung sind, weil unter ihnen Varianten vorkommen, die „in bezug auf eine bestimmte Rasse die Grenzen der Eurhythmie verlassen und zu den Mißbildungen gerechnet werden müssen“. *Josef Weninger* (Wien).

Wells, L. H.: A further note on human skeletal remains from the Natal coast. (Ein weiterer Bericht über menschliche Skeletreste von der Küste von Natal.) (*Dep. of Anat., Univ. of Witwatersrand, Johannesburg.*) Trans. roy. Soc. S. Africa 22, 235 bis 243 (1934).

In Tinley Manor an der Nordküste von Natal wurden in einem Abfallhaufen, der verzierte Keramik enthielt, also zeitlich dem Post-Smithfield-Horizont von Karridene gleichzustellen ist, die Überreste von 2 menschlichen Skeletten (ein Adulter und ein Kind von 6—7 Jahren) gefunden, die aus der Zeit dieser Ablagerung zu stammen scheinen. Beide Skelete waren in einem schlechten Erhaltungszustande. Von dem Adulten waren Teile des Calvariums, der Mandibula und einige Röhrenknochen, von dem kindlichen Skelet nur der Schädel und die Mandibula verwendbar. Die Bearbeitung des Fundes ergab, daß sowohl der Erwachsene als auch das Kind nicht nur boskopoide und Buschmannmerkmale zeigen, sondern auch starken Bantueinfluß verraten. Da der Fund von Karridene aus dem Smithfield-Horizont noch keine Bantumerkmale zeigt, nimmt der Verf. an, daß die Eisen und verzierte Keramik verwendende Post-Smithfield-Kultur von Tinley Manor mit der Einwanderung der Bantu zusammenhängt. Dafür spricht auch die Begräbnisform (sitzende Stellung) des Erwachsenen von Tinley Manor. Die einwandernden Bantu vertrieben aber nicht die ansässigen Buschmann-Boskop-Leute, sondern vermischten sich mit ihnen; die Skelete stellen ja Mischtypen dar. Das Boskoplelement erhielt sich, ebenso wie in Kapland, auch in Natal weiterhin. *Josef Weninger* (Wien).

Jäger, J.: Die Rassengeschichte Franks (mit Beiträgen zur Wendenfrage in Deutschland). (Saller, K.: Beiträge zur deutschen Rassengeschichte III.) (*Anat. Inst., Univ. Göttingen.*) Z. Konstit.lehre 18, 381—414 (1934).

Für die Rassengeschichte Franks wurde ein Material von über 1500 Schädeln von Ausgrabungen, Museen und Beinhäusern und von 1670 lebenden Erwachsenen bearbeitet. Unter den germanenzeitlichen Funden lassen sich im einzelnen die älteren Langschädelformen, aber auch Rundkopfformen nachweisen. Zwischen Germanen und Slawen besteht dabei in Franken ebenso wenig wie in anderen deutschen Gebieten ein grundsätzlicher Unterschied. Auch die Slawen waren damals vorwiegend Langschädel. Bis zur Gegenwart wird die Kopfform in Franken stetig runder. Heute erscheinen bei allen sonstigen Unterschieden sämtliche fränkischen Gruppen als Rundköpfe. Das Tempo, das von den Langschädeln der Germanen- und Slawenzeit zur deutschen Rundschädlichkeit führt, ist allerdings in den verschiedenen Gebieten verschieden. Im Osten Franks erfolgte die Verrundung schneller als im Westen, Stadtfunde des Mittelalters zeigen eine stärkere Verrundung als Landfunde. Die Wandlung des Längenbreitenindex ist dabei nur ein Ausdruck für die Wandlung der ganzen Schädelform im Verlauf der deutschen Geschichte; die Wandlung führt immer mehr zu jenen Formen hin, die man für die Gegenwart als dinarisch oder ostisch zu bezeichnen pflegt. Zur Klärung der Ursachen der Wandlung bleibt beim heutigen Stand der Forschung nur die Annahme möglich, daß die Rassen weder in ihrem Erscheinungsbild noch in ihren Veranlagungen fest und starr sind. Änderungen der Ernährungsbedingungen und Unterschiede der Bodenformationen, die gerade in Franken besonders hervortreten, könnten einen Einfluß geübt haben. (II. vgl. diese Ber. 29, 733.) K. Saller (Göttingen).

● **Saller, K.:** Rassenkunde des Eichsfeldes. (Unser Eichsfeld. Jg. 29, Nr. 8.) Buderstadt: Aloys Mecke 1934. 26 S., 4 Taf. u. 5 Abb. RM. 1.50.

Verf. berichtet über das Ergebnis von anthropologischen Untersuchungen an 865 Männern und 963 Frauen aus dem nördlichen Eichsfeld und vergleicht die Messungen mit denen anderer deutscher Gebiete. Köster (Braunschweig).

Münter, Heinrich: Untersuchungen über die süddeutsche Brachycephalie. IV. Leibeine aus dem Kloster Reichenau. Z. Morph. u. Anthropol. 34, 286—302 (1934).

Die Arbeit befaßt sich mit den 1930—1933 im Münster zu Reichenau gehobenen Skelettfunden. Es sind im ganzen die Reste von 18 Individuen, darunter 15 mehr oder weniger gut erhaltene Schädel, die zum Teil durch Namen belegt, zum Teil wenigstens durch das Niveau der Böden in ihrer Zeitstellung bestimmt sind. Mit Ausnahme von 3 Schädeln, die aus dem 11. Jahrhundert stammen und den Reihengräbertypus zeigen, kommt als Zeit das 14. bis 17. Jahrhundert in Betracht. Das Vergleichsmaterial für diese letztere Reichenauer Gruppe bilden die 3 frühen Schädel, vermehrt um 19 Reihengräberschädel aus der Sammlung des Heidelberger Anthropologischen Institutes. Die beiden Gruppen unterscheiden sich deutlich voneinander. Die Reichenauer sind durchwegs brachykran und ortho-hypsikran, die Reihengräberschädel dolicho-mesokran und chamä-orthokran. Ferner haben die Reichenauer eine beträchtlichere größte Stirnbreite, kürzere Parietalbogen und -seihen und ein kürzeres reites flaches Occipitale. Alle in der Mediansagittalen genommenen Maße sind bei den Reichenauern von geringerer Ausdehnung. In den Gesichtsmaßen sind die Unterschiede geringer, doch zeigen sich auch hier bei den Reichenauern größere Breiten- und geringere Höhenmaße. — Die Arbeit ist ein Beitrag zum Problem der süddeutschen Brachycephalie. Eugen Fischer konnte bei seinem Lorscheider Material feststellen, daß die brachykranen Schädel in der Mehrzahl breit gewordene Langschädel seien. Für das Reichenauer Material trifft das nicht zu; denn aus den Maßzahlen für die Längenausdehnungen ergibt sich ein großer Unterschied zwischen den Reichenauern und den Reihengräberschädeln. (III. vgl. diese Ber. 26, 786.) Josef Weninger (Wien).

Shanklin, William M.: The anthropology of Transjordan Arabs. (Die Anthropologie der Transjordanischen Araber.) (*School of Med. a. Centr. Inst. f. Brain Research, Amsterdam.*) Psychiatr. Bl. 38, 544—553 (1934).

Ein Bericht über Kopfmessungen an 791 Arabern transjordanischer Stämme und Dorfschaften. Die mittlere Kopflänge beträgt 186,94 mm, die mittlere Kopfbreite 144,57 mm und der mittlere Kopfindex 77,3. Erfast wurden die Angehörigen 13 verschiedener Stämme und 7 verschiedener Dorfschaften. Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit denen aus der Literatur bekannten Untersuchungen über die anthropologischen Verhältnisse bei Arabern vervollständigt diese Studie. Göllner (Berlin).

Kossovitich, N.: Recherches séro-anthropologiques chez quelques peuples du Sahara français. (Seroanthropologische Untersuchungen bei einigen Völkern der französischen Sahara.) (*Inst. Pasteur, Paris.*) C. r. Soc. Biol. Paris **116**, 759—761 (1934).

Anlässlich einer Forschungs Expedition in die französische Sahara wurden 1750 Personen anthropometrisch und serologisch untersucht. Für 11 verschiedene Volksstämme werden anthropologische und serologische Daten mitgeteilt. Das Studium der Blutgruppen ergibt „daß sich unter den Nomadenstämmen des französischen Saharagebietes die einen den europäischen, die anderen den asiatischen und afrikanischen Völkern annähern“. Beispiele: 73 Tuareg aus Tamanrasset: O 56,1; A 34,2; B 8,2; AB 1,4. Haratin (arabisierte Berber aus El Golea, In Salah, Gao und Kidal): O 29,0; A 35,9; B 28,0; AB 4,7. *F. Schiff* (Berlin).

Matson, G. Albin: A procedure for determining distribution of blood groups in mummies. (Eine Methode zur Blutgruppenbestimmung bei Mumien.) (*Dep. of Bacteriol., Washington Univ. Med. School, St. Louis.*) Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. **31**, 964—968 (1934).

Untersucht wurde Muskelgewebe von 12 Mumien aus Peru, Arizona und Grönland. Absorptionsversuche mit O-Serum (Agglutinine α und β) fielen negativ aus. Da das Ergebnis sowohl durch die Zugehörigkeit des Materials zur Gruppe O wie auch durch nachträglichen Schwund der Merkmale A oder B erklärt werden könnte, wurden auch Absorptionsversuche mit Serum-Anti O (absorbiertem Rinderserum nach Schiff) angesetzt. Das Anti O wurde wie auch in Kontrollversuchen mit bekanntem Material, absorbiert, wodurch die Diagnose O bei dem Mumienmaterial wahrscheinlich gemacht wird. *F. Schiff* (Berlin).

Hallauer, C.: Beitrag zur Blutgruppenbestimmung kleiner Mengen menschlichen Trockenblutes. (*Hyg. Inst., Univ. Basel.*) Dtsch. Z. gerichtl. Med. **23**, 206—210 (1934).

Ökologie, Biogeographie.

Allgemeines.

Iwanov, L. A.: Zur Frage vom Einfluß des Windes auf den Baumwuchs. Bot. Z. **19**, 211—219 u. dtsch. Zusammenfassung 219 (1934) [Russisch].

Wind hemmt den Höhenwuchs und verstärkt die Abholzigkeit. Hauptursache der Wuchsstörungen ist die Hemmung des absteigenden Saftstromes infolge Biegens der Triebe im Winde. *Kemmer* (Bremen).

Hulbert, H. W., H. L. Spence and L. V. Benjamin: The eradication of *Lepidium draba*. (Die Entwurzelung von *Lepidium draba*.) (*Dep. of Agronomy, Idaho Agricultural Exp. Stat., Moscow.*) J. amer. Soc. Agronomy **26**, 858—864 (1934).

Lepidium draba ist ein lästiges Unkraut im Gebiete von Idaho. Die Möglichkeit eines chemischen Bekämpfung dieser Pflanze wird hier erörtert. Chlorcalcium und Schwefelkohlenstoff erweisen sich als ganz brauchbar. Die chemischen Agenzien werden unter Druck auf die Pflanzen verteilt. Die Versuchsflächen betragen 9—30 Fuß. Zweckmäßiger führt man zweifache Behandlungen durch, und zwar innerhalb von 10 Tagen. Das erstmalig gibt man 1 Pfund und das zweitemal 4—5 Pfund. Eine dritte Behandlung erweist sich nicht als zweckmäßig. Wählt man nur eine einmalige Behandlung, so muß man 6 Pfund reichen. Die beste Zeit ist während der Blüte. Schwefelkohlenstoff in einer Tiefe von 6—8 Zoll bewährt sich bei einer Menge von 2 Unzen ganz gut. Durch die chemischen Agenzien wird eine Entwurzelung der Pflanzen ausgelöst. Entsprechende Kulturbehandlungen zur Unterdrückung des Unkrautes sind billiger. Am besten wechselt man von Jahr zu Jahr die Verfahren ab. *Niethammer*.

Krohn, Väinö: Kurzer Bericht über *Cuscuta halophyta* Fr. Phytopath. Z. **7**, 505 bis 514 (1934).

Verf. macht auf *Cuscuta halophyta* Fr. aufmerksam, die, in Finnland erstmalig 1923 beobachtet, sich schon zu einem gefährlichen Schmarotzer zu entwickeln beginnt. Der nur in seltenen Fällen verzweigte Stengel wird im Stadium des Keimlings, der vollentwickelten Pflanze mit Haustorien und als alter, tief gefurchter Stengel nach äußerem und innerem Bau beschrieben. Die meistens rosa gefärbten Kronblätter tragen alternierend vor den Staubblättern stehende gefranste Schüppchen, die teils breit, teils schmal und geteilt sind. Die Wirtspflanzen werden in drei verschiedene Ordnungen eingeteilt: 1. die ausgesprochenen bevorzugten Wirtspflanzen (*Solidago virgaurea*, *Cornus suecica* und *Galium verum*); 2. solche Wirtspflanzen, die in der Regel beim Wandern nur als Stütze dienen und auf denen die Seide nur dann in schwachem Maße Haustorien bildet, wenn Pflanzen der 1. Ordnung fehlen; 3. Pflanzen, die nur als Stütze dienen, auf denen die Seide ohne Haustorienbildung auf Kosten ihrer

rückliegenden Teile weiterwächst. Höchstens im Reifestadium der Seide kann sie einige dieser Nebenwirselpflanzen angreifen. *Radeloff (Hamburg).*

Vettel, F., und P. Pelschenke: Können wir ertragreiche Qualitätsweizen züchten? *Landwirtschaftswirtschaft Ferd. Heine, Kloster Hadmersleben u. Inst. f. Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung, Univ. Halle a. d. S.)* Züchter **6**, 193—199 (1934).

Die Verf. untersuchten Weizenstämme aus 5 verschiedenen Kreuzungen auf ihre Kleberqualität und Klebermenge. Für die Qualitätsprüfung wurde die Quellprüfung von Berliner und Koopmann benutzt, die Klebermenge wurde durch maschinelle Auswaschung des Klebers als Feuchtkleber bestimmt. Wertvolle Kombinationen wurden mit dem Farinographen geprüft, wobei die Ausmahlung mit dem Mahlautomaten besonders gute Dienste leistete. Untersucht wurden Stämme aus folgenden Kreuzungen: 1. Heines Kolben × Marquis, 2. Heines Kolben × Garnet, 3. Garnet × Peragis, 4. Garnet × von Rümkers, früher Sommerbackkopf, 5. Garnet × Heine III. Von diesen Stämmen wurden 1931—34 1301 Einzelanalysen und 472 Stammprüfungen und Qualitätsprüfungen von 718 Kornproben durchgeführt. Die Auslese der Stämme erfolgte sehr streng, so daß nur 10% des anfänglichen Materials erhalten blieben. Das Ergebnis der Prüfung läßt klar erkennen, daß eine Kombination von Klebergüte und Ertrag einerseits, von Klebermenge und Ertrag andererseits durchaus möglich ist. Ferner brachten einige Stämme den Beweis, daß bei hoher Klebermenge auch gute Kleberqualitäten erzeugt werden können. Das Ziel weiterer Arbeit ist, Kreuzungen mit extrem kleberreichen Sorten durchzuführen, die auch in unserem Klima ein hohes erblich bedingtes Eiweißspeicherungsvermögen besitzen. *Stubbe (Müncheberg, Mark).*

Nijkamp, J. A., und N. H. Swellengrebel: Beobachtungen, wie Anopheles maculipennis in den neuen Wieringer Seepolder eingedrungen ist. (*Zoöl. Laborat. en Afd. v. Trop. Hyg., Koloniaal Inst., Amsterdam.*) *Nederl. Tijdschr. Geneesk.* **1934**, 3427—3443 [Holländisch].

Swellengrebel, N. H.: Die Trennung der Anophelesarten. *Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië* **74**, 706—711 (1934) [Holländisch].

Swellengrebel benutzt die Tatsachen über die biologische und in ihrer epidemiologischen Bedeutung so verschiedenen, äußerlich aber als erwachsene Mücken, Sammlungstiere, nicht sicher unterscheidbaren Rassen von *A. maculipennis* zu einer Rechtfertigung der entomologischen Studien gegen Angriffe solcher, welche die feinere Entomologie als unnötig für die Praxis erachten. *Martini (Hamburg).*

Walandouw, E. K.: Nematoden als Bekämpfer von Anopheleslarven. *Vorl. Mitt. Ziekenh. d. Kerintji-Ondernem. d. H. V. A., Kajoe-Aro, S. W. K.)* *Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië* **74**, 1219—1224 u. engl. Zusammenfassung 1224 (1934) [Holländisch].

Verf. berichtet über einen Befund von Mermithiden in Larven von *A. leucophyrus*. Beim Hervortreten der Nematoden sterben die Anophelinenlarven. Letztere werden dann von den Nematoden gefressen. Verf. meint, daß sich diese Nematoden, von denen eine nähere Beschreibung versprochen wird, wohl für die biologische Bekämpfung der Anophelinenlarven benutzen ließen. *Schuurmans Stekhoven (Utrecht).*

Yasuhara, Setutaro: Effects of insecticide and water plants on mosquito development. (Einfluß von Insektiziden und Wasserpflanzen auf die Mückenentwicklung.) *Hyg. Inst., Med. Coll., Okayama.)* *Okayama-Igakkaï-Zasshi* **46**, 2037—2066, engl. Zusammenfassung 2037—2038 (1934) [Japanisch].

Die Wirkung von Öl steigt mit der Dichte der Ölschicht auf dem Wasser. Bei Insektiziden und Desinfizienzien ist die Konzentration wichtig. Öl ist besonders wirksam für die Vernichtung der überwinternden Larven. In ihrer Bedeutung für die Larvenentwicklung wurden drei *Potamogeton*-arten, *Hydrilla*, *Trapa*, *Lemna*, *Spirogyra* und *Hydrocharis* geprüft. Der Einfluß auf die Entwicklung steht mit der O_2 -Produktion in Zusammenhang. *Weyer.*

Boettger, Caesar R.: Die Abwehr der Landschnecken gegen Käfer. *Natur u. Volk* **4**, 380—384 (1934).

Käfer verfügen über 2 verschiedene Methoden, um Schnecken zu überwältigen. Mit ihren starken Kiefern und dicken Köpfen versehene Laufkäfer können nicht allzu dickschalige Schnecken aufschneiden und so zu den Weichteilen gelangen (Beispiel: *Carabus lusitanicus* Dej.). Andere Käfer versuchen in das Gehäuse einzudringen und den Weichkörper zu erfassen. Diese Methode wird von Käfern mit schmalem Kopf und Halsschild angewendet (Beispiele: *Agathidium*, *Ablattaria*, *Phosphuga*). Gegen diese Käfer sind einerseits mit Deckel versehene Schnecken (*Pomatias*), andererseits solche mit Mündungsverengungen (*Helicodonta*) geschützt. Schnecken mit weiter Mündung versuchen den Käfer zuerst durch heftige Bewegungen abzuschütteln; später versuchen sie ihn durch Abscheidung großer Schleimmengen am Vordringen zu hindern. Beide Mittel sind gegenüber ausgesprochenen Schneckenfressern wirkungslos. Verf. nimmt an, daß die ursprüngliche Bedeutung der Mündungsverengung in einer Herab-

setzung der Verdunstung besteht und daß diese Einrichtung als wirksame Abwehr gegen Angriffe von Käfern funktioniert. Besonders bemerkenswert ist die Parallelvariation des nordafrikanischen Wüstenschnecke *Otala* (Dupertia) Kob. und der Rassen von *Carabus morbillosus*. In Gebieten, wo die Schnecke eine weite Mündung hat (*Otala tigri odopachia* Bourg.), lebt der relativ breitzköpfige *Carabus morbillosus morbillosus*, während dort, wo die Schnecke kräftige Mündungsschwielen aufweist (*Otala tigri surrodonta* Bourg.) die extrem schmalköpfige Form: *Carabus morbillosus riffensis* Fairm. lebt. (Durch ein Versehen ist in Fig. 5 nicht *Carabus morbillosus riffensis* Fairm., sondern *Hadrocarabus riffensis* abgebildet, der als Beispiel für dickköpfige Schneckenfresser dienen kann.) Wilhelm Kühnelt (Wien).

Kurz, V.: Die Zucht des Bauernschafes in Böhmen im Lichte historischer Nachrichten. Věstn. českoslov. zeměd. Musea 7, 15—32 mit deutscher 43, französischer 43 u. englischer 44 Zusammenfassung (1934) [Tschechisch].

Die Blütezeit der Zucht einheimischer Schafe fällt in das 16. und 17. Jahrhundert; gegen Ende des 18. und besonders in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Landschaf durch die Merinorasse verdrängt, so daß es heute nur vereinzelt in Süd- und Südwestböhmen angetroffen wird. In der Bronzezeit wurde das mufflonartige *Ovis Studeri* gezüchtet; es war ungefähr 53 cm hoch, hatte ein lineares Kopfprofil, sichelartig angesetzte Hörner und war kurzschwänzig. Das böhmische Landschaf aber ist langschwänzig, mit kurzen Ohren und hat eine konkave Nase und in der Regel keine schwarzen Abzeichen auf Kopf und Beinen, die kurz behaart sind, und schneckenartige Windung der Hörner, die bei weiblichen Tieren größtenteils fehlen. Es kann also nicht angenommen werden, daß das böhmische Landschaf direkt vom erwähnten Bronzezeitschaf abstammt, vielmehr muß eine starke Beimischung von östlichen Schafrassen, denen das Landschaf ähnelt, angenommen werden. J. A. Valš.

Der Organismus und die anorganische Umwelt. Anpassung.

Scharrer, K., und W. Schropp: Über die Wirkung des Kalium-Ions bei mangelnder Lichtversorgung. (Agrikulturchem. Inst., Techn. Hochsch., München, Weihenstephan.) Z. Pflanzenernähr. Tl A 35, 185—193 (1934).

Wasserkulturen von Erbse werden durch Überspannen mit 1, 2, 3 und 4 Lagen Gaze in zunehmendem Maße beschattet (eine Messung der Lichtintensitäten unterblieb leider aus technischen Gründen). Steigende Mengen Kalium (100, 200, 300, 400 mg je Liter) haben den Erfolg, daß der Rückgang des Ernteertrags mit zunehmender Beschattung bis zu einem gewissen Grad durch größere Mengen K wieder ausgeglichen werden kann, wenn der Lichtentzug nicht zu groß ist. So wird z. B. bei einmaliger Beschattung und 200—300 mg K derselbe Ernteertrag erreicht wie mit 100 mg K in vollem Licht. Der Chlorophyllgehalt der Pflanzen nahm mit steigenden K-Mengen etwas zu, bei mäßiger Beschattung war er wesentlich höher als unter normalen Verhältnissen. Im übrigen wurde durch Beschattung der Blütenansatz eher vermehrt, die Verlängerung der Stengelglieder war verhältnismäßig gering. Karl Pirschle (Berlin-Dahlem).

Schwarz, Richard: Die Wirkung des Kaliums unter verschiedenen Belichtungsverhältnissen auf den Samenertrag von Westerwoldischem Weidelgras (*Lolium italicum* var. *westerwoldicum*). (Inst. f. Grünlandwirtschaft, Preuß. Landwirtschaftl. Versuchsanst. u. Forschungsanst., Landsberg a. d. Warthe.) Ernähr. Pflanze 30, 293—299 (1934).

Mehrfährige Sandkulturversuche unter normalen Belichtungsverhältnissen und jeweils parallel dazu unter Schattentüchern (wodurch die Lichtintensität auf 10% eingeschränkt wurde) ergeben — was dem Ref. allerdings aus den beigegebenen Kurven nicht völlig überzeugend hervorzugehen scheint —, daß unter ungünstigen Lichtverhältnissen steigende K-Gaben besonders günstigen Einfluß auf das Tausendkorngewicht und ferner auf Reinheit und Keimfähigkeit des Saatguts haben. „Reichlich bemessene Kaliversorgung der Böden ist demnach in der Lage, die Schwankungen des Ernteertrags in Jahren ungünstiger Witterung mit verringern zu helfen.“ Karl Pirschle (Berlin-Dahlem).

Timofejewa, M. T.: Zur physiologischen Charakteristik der Widerstandsfähigkeit gegen Frost beim Wintergetreide. Trudy prikl. Bot. i pr. I Plant Industry in USSR Nr 9, 17—24 (1934) [Russisch].

Bei der Feststellung der Widerstandsfähigkeit gegen Frost ist von der direkten Methode des Gefrierenlassens der Pflanzen unter Verwendung der Fähigkeit zu erneutem Wachstum als Merkmal für den Grad der Resistenz auszugehen. Die indirekten Laboratoriumsmethoden vermögen nur den Zustand der Pflanze zum gegebenen Zeitpunkte zu beleuchten. Die meisten Wintergetreidesorten zeigen im Verlaufe des Winters stark wechselndes Verhalten gegenüber

an Kältewirkungen. Der Zustand der Pflanzen während des Winters muß nach allen Gesichtspunkten unter Bezugnahme auf das örtliche Klima untersucht werden, wenn die indirekten Methoden einen Überblick gewährleisten sollen. Nicht nur die Zuckerzahl und der Wassergehalt, sondern auch das Verhalten der Eiweißverbindungen, das p_H des Saftes, die anatomischen und morphologischen Besonderheiten müssen unter Zugrundelegung der Gesamtheit der örtlichen Umweltsbedingungen berücksichtigt werden, wenn ein Urteil über die Frostresistenz einer Sorte gebildet werden soll. Die einzelne Methode für sich allein vermag dies nicht. Wesentlich ist die winterliche Bodentemperatur im Bezirke des Bestockungsknotens, deren Höhe und Schwankungen bekannt sein müssen, um die Kälteresistenz beurteilen zu können.

H. v. Rathlef (Halle a. d. S.).

Niklas, H., und M. Miller: Wie können bei landwirtschaftlichen Feldversuchen störende Bodenungleichheiten auf mathematischem Wege festgestellt und ausgeglichen werden? (*Agrikulturchem. Inst. u. Hauptversuchsanst. f. Landwirtschaft, Techn. Hochsch. München, Weißenstephan.*) Z. Pflanzenernährg Tl A 35, 328—334 (1934).

Verff. beschäftigten sich in der vorliegenden Arbeit mit der Frage, ob das sogenannte Randverfahren, das nur bei der Anordnung der Teilstücke in einer Linie verwendbar ist, nicht ungenügend für die schachbrettförmige Anordnung der Parzellen erweitert werden kann. Das Ergebnis der Untersuchungen ist folgendes: Auf Grund der Theorie der ausgleichenden Ebene wird ein Ausgleichsverfahren zur Ausschaltung der Ungleichheit des Bodens bei schachbrettförmiger Anordnung der Parzellen entwickelt. Dadurch kann die durchschnittliche Zu- oder Abnahme des Ertrages von Teilstück zu Teilstück zahlenmäßig festgestellt werden. Das Verfahren wird an Hand eines praktischen Beispiels durchgeführt. Hoffmann (Bremen).

Musso, J. O.: Über den Einfluß der Elektrizität auf den Aschenbestand und die organische Zusammensetzung von Pflanzen. (*Inst. f. Pflanzenkultur, Leningrad.*) Z. Pflanzenernährg Tl A 35, 31—37 (1934).

Wie bereits an anderer Stelle (vgl. diese Ber. 24, 457), wird im Rahmen der kurzen Mitteilung wiederum betont, daß Aufnahme und Wanderung der Salze und Ionen in der Pflanze zwangsläufig bestimmt wird durch das immer vorhandene Potential Boden/Pflanze bzw. Pflanze/Luft; Größe und Vorzeichen dieser Potentiale, die je nach Klima, Tageszeit usw. wechseln, bedingen eine verschiedene Anreicherung der Pflanze mit Aschenelementen. Aber auch für die CO_2 -Assimilation (und weiterhin für die Eiweißbildung usw.) sind diese Verhältnisse bedeutungsvoll und besonders positive Potentiale günstig; Potentialänderungen des Bodens bedingen auch Verschiebungen in der organischen Zusammensetzung der Pflanzen. „Vom Standpunkt der Elektrochemie aus betrachtet besteht der Prozeß der Kohlensäureassimilation aus einer Vereinigung von Kohlenstoffionen, die durch die Sonnen- oder andere Lichtstrahlen von den Kohlensäuremolekülen abgesplittert worden sind, mit organischen oder H_2O -Molekülen, die sich in den assimilierenden Pflanzenzellen dank der Anwesenheit von mineralischen Ionen in einem aktivisierten, ionisierten Zustande befinden. Die Intensität der Assimilation wird daher nicht nur von der Lichtstärke, der Temperatur und den Feuchtigkeitsbedingungen abhängig sein, sondern auch von der Größe des Spannungsunterschiedes, der am Tage zwischen den oberirdischen Pflanzenteilen und der Luft besteht.“

Karl Pirschle (Berlin-Dahlem).

Beauverie, J.: La vie d'animaux assurée pendant plusieurs années dans des vases de verre hermétiquement clos en présence de plantes vertes. (Tierleben, während mehrerer Jahre in luftdicht verschlossenen Glasgefäßen bei Gegenwart grüner Pflanzen aufrecht erhalten.) Rev. gén. Bot. 46, 45—49 (1934).

Schon früher wurde nachgewiesen, daß man grüne Pflanzen sehr lange in hermetisch verschlossenen Glasgefäßen am Licht am Leben erhalten kann. Allerdings wurde dabei Bildung von Samen und Sporen nie beobachtet. Es wird nun gezeigt, daß man ebenso Tiere in dauernd völlig luftdicht verschlossenen Glasgefäßen lange Zeit sehr gut erhalten kann. Es wurde z. B. in ein 14 cm weites und 8 cm hohes Glasgefäß Schlamm Boden und Wasser gebracht und dann mit Kork und Paraffinschicht luftdicht verschlossen. Es entwickelte sich ein Potamogeton recht gut, desgleichen Mollusken (Planorbis). Letztere nährten sich von ersterer, und zwar erschienen um so mehr Schnecken, je besser die Pflanze wuchs. Erst nach 2 Jahren und 9 Monaten kam diese hermetisch einge-

geschlossene Biocönose in dieser Form zu einem Ende, weil die Schnecken das Laichkraut völlig aufbrauchten und dann natürlich selbst abstarben. Das bis dahin ganz klare Wasser wurde jetzt trüb. Reihen von Algen, besonders Blaualgen, die nicht weiter untersucht wurden, lebten aber weiter. Ähnliche Versuche wurden mit Sphagnum-Polstern und ihren tierischen Bewohnern ausgeführt (bis jetzt 5 Monate laufend). Ebenso kann man in Meerwasser besonders Gastropoden bei Gegenwart von *Ulva lactuca* (Grünalge) mindestens 8 Monate lang in luftdicht verschlossenen Glasgefäßen lebend erhalten. (Vgl. diese Ber. 24, 805.) *Schmucker* (Göttingen).

Căraus, Sergiu: Note préliminaire sur le mode dont se comportent certains animaux marins à la lumière artificielle. (Vorläufige Bemerkungen über das Verhalten einiger Seetiere gegenüber künstlichem Licht.) (*Laborat. de Zool., Univ., Jassy.*) *Ann. Sci. Univ. Jassy* 19, 314—316 (1934).

Schildert die Bedeutung von „Lichtfallen“ für den Fang einiger seltener Tierarten. Auf nächtlichen Planktonfahrten wurden mittels einer 250kerzigen Lampe außer einer großen Anzahl von pelagischen Tieren (hauptsächlich Larven- und Jugendformen verschiedener Krebsarten) auch ausgewachsene Exemplare einiger benthonisch lebender Tierformen (darunter Chiton) angelockt; ähnliche Methoden sind dort für den Fischfang gebräuchlich. Verwertung photokinetischer Reaktionen: einige nachts ans Land kommende Krabbenarten konnten durch plötzliche Belichtung gelähmt und so in großen Mengen gefangen werden. *D. Ilse* (München).

Benazzi, Mario: Contributo alla conoscenza delle soluzioni saline fisiologicamente equilibrate. (Ricerche su *Procerodes lobata*.) (Beitrag zur Kenntnis der physiologisch äquilibrierten Salzlösungen. [Untersuchungen an *Procerodes lobata*.]) (*Istit. di Anat. e Fisiol. Comp., Univ., Torino.*) *Pubbl. Staz. zool. Napoli* 13, 311—325 (1934).

Verf. bestätigt die Versuchsergebnisse Rubinsteins (vgl. diese Ber. 6, 301) an dieser euryhalinen und eurythermen Turbellarie des Meeres (*Tricladida maricola*) über die unabhängige antagonistische Wirkung der K- und Ca-Ionen gegenüber den Na-Ionen und dehnt sie mit folgenden Feststellungen aus: Reine Lösungen von NaCl schädigen fast sofort und führen in kurzer Zeit zum Tode. Lösungen von NaCl + KCl oder NaCl + CaCl₂ haben eine weniger rasch eintretende tödliche Wirkung. Lösungen von NaCl + KCl + CaCl₂ wirken bedeutend weniger schädigend als die vorgenannten; die Tiere bleiben einige Tage am Leben, doch zeigen auch sie binnen kurzem tiefgreifende Schädigungen. Lösungen aller drei Salze unter Zugabe von MgCl₂ als viertem Salz (auch in geringerer Menge als der im Meerwasser vorhandenen) genügen hingegen vollkommen zur Lebenserhaltung von *P. lobata* für eine praktisch unbegrenzte Zeit; die Tiere verhalten sich in ihnen vollkommen normal. Die Versuche zeigen die Unentbehrlichkeit von Mg für das Leben von *P. l.* Jedoch kann K durch Rb, aber nicht durch Cs ersetzt werden; Ca kann dagegen weder durch Sr noch Ba vertreten werden.

J. Meixner (Graz).

Bodenheimer, F. S., and K. Reich: Studies on soil protozoa. (Studien an Bodenprotozoen.) *Soil Sci.* 38, 259—265 (1934).

Der zur Untersuchung kommende Boden stammte von einem Weizenfeld in der Nähe von Jerusalem. Er war sehr flachgründig, primitiv bearbeitet und ungedüngt; gelblichbraun, lehmig-kalkig und von zahlreichen Kalksteinbrocken durchsetzt, ferner alkalisch ($p_H = 7,5$) und humusarm. Die Untersuchung ergab eine große Armut an Bodenprotozoen: 1 Ciliate, 4 Flagellaten, 6 Rhizopoden. Der Winterregen bewirkte eine Steigerung der Aktivität, die mit dem Ansteigen der Temperatur im Februar ihr Maximum erreichte. Verf. weist dann nach, daß die Cystenzählung nach der Methode von Cutler fehlerhaft ist, da die Cysten durch 2proz. HCl fast durchweg geschädigt werden. Allerdings gibt er zu, daß z. Z. keine bessere brauchbare Methode existiere, auch gibt er selber keine einwandfreie Methode an. Eine Ausnahme bildete *Mayorella palestinensis*, über deren Ursache — ob Stimulation oder indirekte Wirkung (Vernichtung der Bakterien) — jedoch keine Klarheit besteht. Ferner ergab sich eine große Temperaturabhängigkeit bezüglich der Widerstandsfähigkeit der Cysten bei der Behandlung mit HCl. Bei Erhöhung von 10° auf 20° ging die Lebensfähigkeit beträchtlich zurück. Die Cysten der humiden Böden sind bedeutend weniger beständig als die der ariden, die Temperaturen bis zu 85° vertragen können. *Skallavi* (Berlin).

oocenosen. Der Organismus und die organische Umwelt.

Carter, Nellie: A comparative study of the alga flora of two salt marshes. Pt. I. Vergleichende Studie über die Algenflora von zwei Salzsümpfen. Teil I.) (*Botan. Pap., East London Coll., London.*) J. Ecology **20**, 341—370 (1932); **21**, 128—208 u. 345—403 (1933).

Die beiden Salzsümpfe, untersucht von der Verf., befinden sich an der Flußmündung von Dovey und an Canvey-Insel in Essex. Die ersten hat bereits eingehend Yapp untersucht, hauptsächlich in bezug auf die höhere Vegetation. Die Verf. untersucht hier nur den Sumpf, genannt Ynyslas, in Verband mit dessen Algenflora. An den Sümpfen von Canvey-Insel wurden auch die phanerogamen Gesellschaften und deren Verteilung genau beschrieben. In Ynyslas sind folgende Assoziationen (eigentlich nur Zonen) zu verzeichnen: *Salicornietum* mit *Enteromorpha prolifera*, *Microcoleus chthonoplastes*, *Oscillatoria sancta* und *corallina*, *Glycerietum* mit *Enteromorpha percursa* und *Rhizoclonium*, *Arterietum* mit *Vaucheria*, *Rhizoclonium* und *Enteromorpha percursa*, unteres *Festucetum* mit *Vaucheria* und *Rhizoclonium*, oberes *Festucetum* mit *Rivularia* und *Nostoc*, *Juncetum* mit *Vaucheria* und *Rhizoclonium*. Es sind hier hauptsächlich kryptophytische Gesellschaften, die hier abwechseln und die wahrscheinlich durch verschiedene Salzkonzentrationen, die leider nicht angegeben sind, bedingt sind. — Bei Canvey wurden zwei Sümpfe untersucht mit folgenden Zonen: Nackter Schlamm, *Salicornia* und *Aster*, *Glyceria maritima*, *Obione* und wieder allgemeine *Glyceriazone*. Angaben über das Vorkommen der Algen zu verschiedenen Jahreszeiten in verschiedenen Zonen sind beigegeben. Die kleineren Wasserbecken, Kanäle und Uferböschungen in bezug auf die Algenflora sind separat beschrieben. Zum Schluß sind einige Beobachtungen über die Gezeitenwirkung auf die Algenvegetation mitgeteilt. — Der 2. Teil der Abhandlung bringt die systematische Liste der beobachteten Algen mit genaueren Angaben über deren Vorkommen wie auch mit manchen wertvollen systematischen Bemerkungen und Zeichnungen. Im 3. Teile der Abhandlung bringt die Verf. die Beschreibung der ökologischen Gesellschaften der Algen („ecological communities“), aber ohne ökologische Begründung. Es fehlen die wichtigsten Angaben über die ökologischen Faktoren wie Salinität, Temperatur, Sauerstoff usw. Die beschriebenen Gesellschaften (nicht im Sinne moderner Soziologie) sind folgende: *Chlorophyceen-Gesellschaft*, *Randgesellschaften der Diatomeen*, *Randgesellschaften der Cyanophyceen*, *Ulothrixacca-Ges.*, *Enteromorpha minima*. — *Rhizoclonium-Ges.*, *Anabaena torulosa-Ges.*, *filamentöse Diatomeen-Ges.*, *Herbst-Cyanophyceen-Ges.*, *Phormidium autumnale-Ges.*, *Rivularia-Phaeococcus-Ges.*, *Pelvetia canaliculata-Ges.*, *Catenella opuntia*-, *Bostrychia scorpioides-Ges.* ... — Die Abhandlung beweist, wie es notwendig wäre, die Algenassoziation auf Grund physiologischer Analyse genauer zu studieren.

V. Vouk (Zagreb).

Giltay, Louis: Note sur l'association de *Balanus concavus pacificus* Pilsbry (Cirripède) et *Dendrastr excentricus* (Eschscholtz) (Echinoderme). (Notiz über die Verasellschaftung des Cirripediers *Balanus concavus pacificus* Pilsbry mit dem Seeigel *Dendrastr excentricus* Eschscholtz.) Bull. Mus. Hist. natur. Belge **10**, Nr 5, 1—7 (1934).

Am Sandstrand von La Jolla (Californien) wurden Stücke von *Dendrastr* gefunden, an deren Oberseite deutliche Spuren der Anheftung von *Balanus concavus* erkennbar waren. Daß die Besiedlung der Seeigel durch diese sehr variable Cirripedierart zu Lebzeiten des *Dendrastr* erfolgte, zeigen später aufgefundene Exemplare. *Dendrastr excentricus* pflegt sich in Sand in schiefer Lage soweit einzugraben, daß nur ein kleiner Teil der Oberseite herausragt; an diesen Stellen sitzt auch die Balane. Dabei scheint die Strömung des Wassers einen schützenden Einfluß auf die Seeigel auszuüben, weil alle Exemplare eines Strandbezirkes parallel liegen. Ein Exemplar von *Balanus*, das sich am Rand der Ventralfäche des Seeigels festgesetzt hatte, zeigt monströse Verkrümmung nach oben. Die Besiedlung mit Balanen kann für den Seeigel nicht gleichgültig sein, da dessen Oberfläche an den betreffenden Stellen deformiert wird und die Balane mitunter die Madreporenplatte, die ambulakrale Kieme oder die Genitalporen verlegt. Für die Balane bietet der Seeigel eine Befestigungsmöglichkeit, die sonst am Sandstrand fehlt. Bemerkenswert ist, daß die Balanen häufig von Hydroiden und Algen besiedelt werden, während der Panzer des Seeigels, wohl infolge der Tätigkeit der Pedicellarien, von Bewuchs freibleibt; nur gegen die jungen, sich festsetzenden Balanen scheint ihm kein Mittel zur Verfügung zu stehen.

Wilhelm Kühnelt (Wien).

Castle, Gordon B.: The experimental determination of caste differentiation in termites. (Die experimentelle Bestimmung der Kastendifferenzierung bei Termiten.) Science (N. Y.) **1934** II, 314.

Versuche mit *Zootermopsis angusticollis*. Aus Nymphen des 4. bis 7. Stadiums (am häufigsten des 5. und 6. Stadiums) entwickeln sich in 35—50 Tagen Ersatz-

geschlechtstiere, sobald sie isoliert werden. Bei Anwesenheit einer Königin entwickeln sich keine Ersatzköniginnen, und bei Anwesenheit eines Königs keine männlichen Ersatzgeschlechtstiere. Durch Verfütterung von Alkohol- und Ätherextrakten auf Königinnen an Nymphen wurde die Entwicklung der Ersatzköniginnen verzögert. Verf. schließt daraus, daß nicht irgendeine besondere Kost die Kastendifferenzierung im vorliegenden Fall bedingt, sondern daß durch die Isolierung ein Hemmungsfaktor beseitigt wird, der in einem Ausscheidungsprodukt der reifen Geschlechtstiere zu suchen ist. Durch Fortnahme des ersten und der folgenden Soldaten in einer jungen Kolonie kann die Ausbildung von 6 Soldaten im Jahr erzielt werden, während normalerweise im ersten Jahr nur ein Soldat erscheint. Umgekehrt läßt sich die Soldatenentwicklung durch Zugabe fertiger Soldaten verzögern oder unterbinden. *Fr. Weyer (Hamburg)*

Symbiose.

Chevalier, Aug.: Les rubiacées à bactéries fixatrices d'azote. (Die Rubiaceen mit stickstoffbindenden Bakterien.) *Rev. Bot. appl.* **14**, 633—643 (1934).

Nach den Beobachtungen des Verf. beherbergen wohl alle Vertreter der Rubiaceen in ihren Blättern Bakterien. So wird eine ganze Anzahl von Arten der Gattung *Pavetta* aus Indien, Indochina, Afrika usw. beschrieben, bei denen Bakteriengallen festgestellt wurden. Auffallend war, daß bei den stark behaarten Arten wie *P. breviflora*, *P. tomentosa* u. a. die Bakterienpusteln fehlen. Erwähnt werden ferner einige *Ixora*-Arten und Vertreter der Gattung *Lasianthus* mit kleinen Gallen auf den Blättern, die ebenfalls durch *Mycobacterium rubiacearum* hervorgerufen sein sollen. Ebenso die Gallen, Löcher und Täschchen auf den Blättern verschiedener *Coffea*-Arten sollen zumindest ihre Entstehung der Infektion durch Bakterien verdanken. Der intensive Aasgeruch, der sich bei Verletzung gewisser *Lasianthus*-Arten bemerkbar macht, so besonders stark bei *L. foetidissimus*, stammt nach Ansicht des Verf. vielleicht von Ausscheidungen der blattbewohnenden Bakterien. Den Bakterien der bisher genannten Arten und auch der Gattung *Psychotria* sowie der epiphytisch lebenden Rubiaceen wie z. B. *Myrmephytum*, *Myrmecodia* u. a. wird die Fähigkeit der N-Bindung zugesprochen. In diesem Zusammenhang wird auch die zu den Myrsinaceen gehörende Gattung *Ardisia* erwähnt. *Engel (Berlin).*

Ross, Hermann: Reinkulturen pilzlicher Symbionten von Insektenlarven. (Vortr. Mitt.) (*Botan. Inst., Univ. München.*) *Ber. dtsch. bot. Ges.* **52**, 391—406 (1934).

Verf. ließ Larven von 10 Dipterenarten und einer Hymenoptere (*Dasyneura crataegi*, *D. laricis*, *D. urticae*, *D. sisymbrii*, *Mikiola fagi*, *Lasioptera rubi*, *Hylemyia cardui*, *Microdon spec.*, eine unbestimmte Pilzmückenlarve aus *Lactarius deliciosus*) eine Dipterenlarve aus Polyporaceengallen, *Rhodites rosae*), sowie von Blattflöhen, Schmetterlingen und Blattläusen, nachdem sie ihrer Umwelt steril entnommen und je etwa 15 Min. in dest. Wasser und 10proz. Alkohol gewaschen worden waren, auf Agar-Nährböden kriechen. Regelmäßig entwickelten sich in der Kriechspur bzw. in der Nähe des sitzenden Insekts Pilzkulturen. Nach der Art der früher oder später in Reinkulturen auftretenden Mycelbildung vermutet Verf., daß es sich um „*Dematium* artige Pilze“ bzw. in einigen Fällen auch um ein *Fusarium* handelt. Die Mikroorganismen werden ohne jeden Beweis als „pilzliche Symbionten in Insektenlarven“ aufgefaßt, obgleich zugegeben wird, daß es sich nicht um eine den betreffenden Tieren durch Symbiose direkt angepaßte Pilzart handelt, sondern um verschiedene allgemein verbreitete Pilze, „die überall leicht in den Tierkörper gelangen könnten“. Da *Dematium* Kohlehydrate in Fett zu verwandeln vermag, wird die Bedeutung der „Symbiose“ in einer Fettbildung seitens der Mikroorganismen und anschließender Phagocytose durch den Wirt gesehen. *E. Ries (Leipzig).*

Nábělek, Vojt: Symbiose, Kommensalismus und Parasitismus an einem Tier (Pelmatohydra oligactis Pall.). Pseudozellen. *Bratislav. lek. Listy* **14**, 334—340 u. dtsch. Zusammenfassung 59—60 (1934) [Tschechisch].

Als Symbionten von *Pelmatohydra oligactis* bezeichnet der Verf. 0,5—2 μ lange x-Bodies, welche in den entodermalen Zellen in einer Anzahl von 2, 4, 8 und mehr eingelagert sind, und welche sich wie Chromosomen mit Hämatoxylin färben lassen. An nativen Präparaten überzeugte sich der Verf., daß diese Körperchen symbiotische grüne Zoochlorellen sind. Als Kommensalen kann man den Ciliaten *Kerona pediculus* bezeichnen, der an der Oberfläche der

Hydra lebend, sich mit den Nahrungsabfällen des Wirtes nährt. Einen echten Parasiten der Hydra stellt aber die *Amoeba hydroxena* vor. Sie lebt in der Darmhöhle und frißt hier nicht nur die Nahrung des Wirtes, sondern auch die Körperzellen des Tieres, sogar die Nesselkapseln. Sie richtet so endlich ihren Wirt zugrunde. In Laboratoriumskulturen gedeihen die Hydrparasiten durch Körperzerfall ein. Die Amöbe encystiert sich; die runden (20–30 μ großen) Cysten sind mit einer dicken und an der Oberfläche mit Hörnchen versehenen Membran geschützt und enthalten 1–4 Kerne. — Die sog. Pseudozellen (Vitelloplasten oder Dotterskörperchen), welche das Cytoplasma der Eizelle und auch die Ovarienzellen ausfüllen, entstehen nach dem Verf. aus dem Kernchromatin dieser Zellen. Durch besondere Kernfärbungen (mittels Kernechtrot Mallory, Eisenhämatoxylin-Thiazinrot, Feulgensche Reaktion) überzeugte sich der Verf., daß in den Kernen neben dem Chromatin der Chromosomen noch eine freie Chromatinsubstanz vorhanden ist, die aus dem Kern ins Cytoplasma übergeht. Dieser Übergang des freien Chromatins geschieht: 1. durch direkten Übertritt der kleinen Chromiolen durch die Kernmembran, 2. nach Auflösung der Kernmembran bei der physiologischen Degeneration der Zellen und 3. nach Auflösung der Kernmembran während der mitotischen Kernteilung. Die auf irgendeinem von diesen Wegen ins Cytoplasma gelangenden Chromiolen bilden lateralwärts eine Vakuole, die andauernd wächst, so daß endlich die Chromatinsubstanz eine verschieden dicke Oberflächenschicht bildet. — Ein Teil dieser Substanz wandelt sich direkt in die oft krystallisierte Eiweißsubstanz der Vitelloplasten um. Außerdem sezerniert das Chromatin noch eine Dottersubstanz, so daß die Pseudozellen oder Vitelloplasten eine mit Chromatin umgebene Eiweiß- und Dottersubstanz darstellen.

O. V. Hykes.

Yonge, C. M.: Origin and nature of the association between invertebrates and unicellular algae. (Ableitung und Wesen der Vergesellschaftung von Wirbellosen und einzelligen Algen.) *Nature* (Lond.) 1934 II, 12–15.

Die Abhandlung bringt im wesentlichen eine Literaturübersicht über die Vergesellschaftung von Wassertieren mit Zoochlorellen und Zooxanthellen und kommt zu dem Schluß, daß das Wesen dieser Vergesellschaftung in den verschiedenen Fällen ungleichartig ist. Nach den bisherigen Untersuchungen soll es sich nur bei *Paramaecium bursaria*, *Chlorohydra* und den riffbildenden Korallen (und vielleicht allen Anthozoen) um wirkliche mutualistische Symbiose handeln.

E. Ries (Leipzig).

Getzel, Demetrio: I microbi della glandola nidamentale accessoria in Sepia officinalis. I. (Die Bakterien der Nidamentaldrüse von *Sepia officinalis*. I.) (*Istit. di Zool., Univ., Napoli.*) *Arch. zool. ital.* 20, 33–43 (1934).

Verf. hat die von U. Pierantoni in der akzessorischen Nidamentaldrüse von *Sepia officinalis* untersuchten Mikrobenarten studiert und deren morphologische und kulturelle Merkmale beschrieben, besonders die chromogenen, welche der Drüse die lebhaften Farben verleihen, die bei den lebenden Tieren wahrnehmbar werden. Die beschriebenen Arten sind fünf: *Micrococcus nidamentalis albus*, *Coccobacterium nidamentale rubrum*, *Diplobacterium nidamentale pallidum*, *Staphylococcus nidamentalis croceus*, *St. nid. malus*.

Autoreferat.

Parasitismus. Bakterieneinflüsse auf Pflanzen und Tiere.

Kairies, A.: Die Empfänglichkeit von Iltissen und Frettchen für Influenzabacillen. (*Hyg. Inst., Univ. Halle.*) *Z. Hyg.* 116, 264–272 (1934).

Wagner, R.: Über die Verweildauer von Syphilisspirochäten im Blutegel. (*Dtsch. Forsch.-Anst. f. Psychiatrie [Kaiser Wilhelm-Inst.], München.*) *Dermat. Z.* 70, 11–13 (1934).

Nattan-Larrier, L., et L. Grimard-Richard: Culture des Leishmania sur le milieu N. N. N. „moillé“. (Kultur der Leishmanien auf feuchtem N. N. N.-Nährboden.) *Bull. Soc. Path. exot. Paris* 27, 656–658 (1934).

Verff. setzen nach der Sterilisierung zu den Röhrchen, die 12 ccm des üblichen Nährbodens enthalten, 2 ccm 0,9 proz. physiologischer Lösung hinzu und lassen die Röhrchen 24 Stunden im Brutschrank stehen, während welcher Zeit sich das Wasser mit Hämoglobin belädt. Hierauf Beimpfung. Auf diesen feuchten Nährböden entwickeln sich die Parasiten ebenso rasch und in größerer Menge als auf dem üblichen N.N.N.-Medium. Wenn die Kultur erschöpft ist, kann man das Wasser abnehmen, neues hinzusetzen, auf 24 Stunden die Röhrchen bei 38° C und dann wieder bei 22° C halten, und es entwickeln sich die zurückgebliebenen Parasiten aufs neue. Dieses Verfahren hat sich bisher zweimal wiederholen lassen und bedeutet eine wesentliche Ersparnis an Nährbodenmaterial.

v. Brand (Kopenhagen).^{oo}

Shiba, Noboru: The morphology and development of *Henneguya macropodi* n. sp. from a paradise-fish, *Macropodus chinensis* (Bloch). (Morphologie und Entwicklung von *Henneguya macropodi* n. sp. von *Macropodus chinensis* Bloch.) (*Dep. of Parasitol., Univ., Keijô.*) Keijo J. Med. 5, 178—183 (1934).

H. macropodi entwickelt sich in Schuppen, Flossen und Bindegewebe von *Macropodus chinensis*. Pansporoblastbildung und Sporulation wie bei den bisher bekannten Arten dieser Gattung. *Schuurmans Stekhoven (Utrecht).*

Ciurea, I.: Recherches expérimentales sur la réceptivité des oiseaux domestiques à l'infestation par les trématodes de la famille „Heterophyidae“ Odhner. (Experimente über die Empfänglichkeit von Hausgeflügel für Infektion mit den Trematoden der Familie Heterophyidae Odhner.) Hommage Mém. Cantacuzène 169—184 (1934).

Gallus domesticus, Numida meleagris, Meleagris gallopavo, Anas domesticus, Anser anser und Columba livia wurden auf ihre Infektionsfähigkeit mit *Metagonimus romanicus*, *Apophallus Mühlingi*, *Rossicotrema donicum*, *Cryptocotyle concavum*, *Pygidioopsis genata* und *Parascocotyle sinocum* geprüft. Nur die Taube erwies sich als empfänglich für alle Trematodenarten. Gallus und Meleagris beherbergen *Cryptocotyle concavum* nur während weniger Tage. *Numidia*: *Cryptocotyle*, *Pygidioopsis* und *Parascocotyle*, Anas und Anser *Cryptocotyle* und *Pygidioopsis*. Alles Hausgeflügel mit Ausnahme der Taube ist refraktär für Heterophyidae des Süßwassers. — Die Nichtempfänglichkeit schreibt Verf. nicht einer Immunität, sondern dem Chemismus des Darmes des Wirtes zu. Bei künstlich infizierten Vögeln findet man die Parasiten im hinteren Drittel des Darmes. *Schuurmans Stekhoven (Utrecht).*

Caballero, Eduardo, und Demetrio Sokoloff: Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Parasitologie von Rana Montezumae mit einer Zusammenfassung. Beschreibung einer neuen Spezies und Klassifikation des Genus *Haematoloechus*. An. Inst. Biol. 5, 5—40 (1934) [Spanisch].

Ausführliche, rein morphologische Beschreibung der 22 bekannten *Haematoloechus*-arten. Neu beschrieben wird *H. elongatus*, der in der Lunge von *R. m.* angetroffen wurde und sehr *H. complexus* ähnelt, aber größer ist, während die Eier kleiner als bei letzterer Art sind. Die Arbeit wird von einem Bestimmungsschlüssel abgeschlossen. *v. Brand.°°*

Kendrick, J. F.: The length of life and the rate of loss of the hookworms, *Ancylostoma duodenale* and *Necator americanus*. (Die Lebensdauer und die Sterblichkeit der Hakenwürmer *Ancylostoma duodenale* und *Necator americanus*.) Amer. J. trop. Med. 14, 363—379 (1934).

Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen ist gewesen, die Dauer der Infektion mit Hakenwürmern im Menschen festzustellen. Die Versuche wurden an 25 Gefangenen im Gefängnis von Madras vorgenommen, welche sich freiwillig für eine künstliche Infektion mit *Ancylostoma duodenale* und *Necator americanus* zur Verfügung stellten. Die Experimente begannen im Jahre 1926. Daneben wurden Kontrolluntersuchungen an 238 parasitenfreien Gefangenen durchgeführt. 5 Infektionen mit *Necator americanus*, welche oral geschahen, lieferten nie mature Parasitenstadien. Das Maximum der Infektionsdauer, i. e. bis keine Eier mehr gefunden werden konnten, war 64 Monate. Die Infektion mit *Ancylostoma duodenale* (20 Fälle) wurde percutan vorgenommen, und zwar mit je 200 Larven, welche in 19 Fällen je 2mal im Abstand von 2 Monaten auf den Wirt übertragen wurden, während in 1 Falle noch eine 3. Infektion nach 3 Monaten gemacht wurde. Nach 8—15 Tagen traten die bekannten katarrhösen Erscheinungen auf, während die Eier nach 45—66 Tagen (53) festgestellt werden konnten. Die Kontrolle der parasitenfreien Gefangenen zeigte, daß eine direkte Übertragung des Hakenwurmes von einem Wirt auf den andern nicht möglich ist. Die Zahl der Larven, welche durch die Haut ins Körperinnere wandern, oder welche während der Infektionsperiode zugrunde gehen, ist individuell und nicht vom Alter oder von früheren Infektionen des Wirtes abhängig. Das Maximum der Eiablage bei *Ancylostoma*-infektion ist 12—18 Monate; dann sinkt die Zahl der Eier während 3—6 Monaten auf 50—70% der Maximalzahl. Die Dauer der Eiablage für *Ancylostoma* ist im Durchschnitt 76 Monate. In 3 genau untersuchten Fällen war die Infektion nach 6½ Jahren erloschen. *Kreis (Basel).*

Furuyama, Toshio: On the morphology and life-history of *Philometra fujimotoi* Furuyama, 1932. (Über Morphologie und Lebensgeschichte von *Philometra fujimotoi* Furuyama 1932.) (*Dep. of Parasitol., Univ., Keijô.*) Keijo J. Med. 5, 165—177 (1934).

Eingehende Behandlung der Morphologie dieses an den Flossen von *Ophiocephalus argus* Cantor parasitierenden Nematoden, mit Synopsis der bisher beschriebenen Arten desselben Genus. Das ♀ ist vivipar. Die Larven werden von Cyclops-Arten aufgenommen und entwickeln sich darin. Juvenile ♀ und ♂ findet man in der Leibeshöhle des definitiven Wirtes. Von dort migriert das ♀ im September oder Oktober nach die Flosse. Im Frühsommer wird

s ♀ erwachsen und verläßt die Flosse. Die Larven werden durch Ruptur der Haut des Mutteres freigesetzt.
Schuurmans Stekhoven (Utrecht).

Pérez, Charles: Notes sur les épicarides et les rhizocephales des côtes de France. III. Infection simultanée des pagures par un athelges et un rhizocephale. (Notizen über die Epicariden und Rhizocephalen der französischen Küsten. VIII. Gleichzeitige Infektion durch Athelges und Rhizocephalen.) Archives de Zool. 75, 541 bis 565 (1934).

F. Müller beobachtete als erster bei Desterro (Brasilien), daß von Sacculina befallene Isopoden häufig auch Bopyriden beherbergen und daß diese sich auf der Sacculina festsetzen, bis zum Absterben bringen und sich aus ihrem erhaltenbleibenden Wurzelsystem Nahrung verschaffen. Verf. untersuchte diese Verhältnisse an der französischen Küste und konnte feststellen, daß der Isopode Athelges paguri und der Rhizocephale Peltogaster paguri, die mit Eupagurus bernardus schmarotzen, nur ausnahmsweise miteinander vorkommen und daß der Krebs meist früher von Athelges befallen wird als von Peltogaster. Dagegen finden sich Athelges lorifera und Chlorogaster sulcatus an Eupagurus cuanensis mehr als 10mal häufiger zusammen, als der bloßen Wahrscheinlichkeit entsprechen würde. Hier wird der Krebs auch meist früher von Chlorogaster befallen. Solche Individuen scheinen eine große Anziehungskraft für die Larven von Athelges zu besitzen. Diese setzen sich auch häufig auf dem Chlorogaster fest und verursachen degenerative Veränderungen. Die früheren Angaben, daß nur Weibchen von Rhizocephalen befallen werden, beruhen darauf, daß sich die Pleopoden bei kleineren Männchen in weiblicher Richtung verändern.
Wilhelm Kühnelt (Wien).

Pérez, Charles: Atrophie de l'ovaire chez le crabe „*Macropodia rostrata*“, sous l'influence de la sacculine. (Atrophie des Ovars der Krabbe *Macropodia rostrata* unter dem Einfluß von Sacculina.) (Stat. Biol., Roscoff.) Hommage Mém. Cantacuzène 601 bis 609 (1934).

Der erste Einfluß des Parasiten *Drepanorchis fraissiei* besteht darin, daß bei der Eiablage einige Eier nicht mehr abgelegt werden. Diese wie auch später fortwährend die jüngeren werden durch Einwandern der Follikelzellen zerstört und die Zelle phagocytiert. Schließlich besteht das Ovar nur noch aus einer großen Phagocytosemasse, durch deren Achse sich ein dünner Strang unveränderter Keimzellen, die Rhachis, hinzieht. Die äußere Pigmentzellohülle wird zuletzt durch Einwachsen der Wurzeln des Parasiten ebenfalls zerstört.
H. Bauer (Berlin-Dahlem).

Biogeographie.

Umwelteinflüsse nach geographischen Gegenden; Erdgeschichtliche Beziehungen der Flora und Fauna; Vorkommen und Verbreitung der Pflanzen und Tiere nach bestimmten Gegenden; Tierwanderung.)

Godwin, H.: Pollen analysis. An outline of the problems and potentialities of the method. Pt. I. Technique and interpretation. (Pollenanalyse. Ein Umriß der Probleme und Möglichkeiten der Methode. I. Teil: Technik und Ausdeutung.) (Botany School, Cambridge.) New Phytologist 33, 278—305 (1934).

Beschreibung der Methode mit ausführlicher Erörterung dessen, „was sie kann und nicht kann“, auf Grund der in der Literatur niedergelegten und hier dankenswert zusammengetragenen Erfahrungen. Besonders eingehend werden die Gesichtspunkte und Fehlerquellen, die bei der Ausdeutung der Ergebnisse zu beachten sind, behandelt, wie die ungleiche Erhaltungsfähigkeit, Pollenproduktion, Ferntransportauslese usw. Zu beachten bleibt immer, daß uns die Pollenanalyse in der Regel nur das relative Mengenverhältnis anzeigt und bei diesem auch mehr die Richtung einer Veränderung von Ort zu Ort und Zeit zu Zeit als die tatsächliche Schwankungsgröße und daß sie verlässlicher ein Durchschnittsbild der Bestockung in der ganzen weiteren Nachbarschaft als der an Ort und Stelle ergibt.
Karl Rudolph (Prag).

Voss, John: Postglacial migration of forests in Illinois, Wisconsin, and Minnesota. Nacheiszeitliche Wanderung der Wälder in Illinois, Wisconsin und Minnesota.) Hull Bot. Laborat., Chicago.) Bot. Gaz. 96, 3—43 (1934).

Die pollenanalytischen Ergebnisse der Untersuchung von 14 Mooren westlich des Michigan- und Oberen Sees zeigen die nacheiszeitliche Waldgeschichte in einem Süd-

Nord-Profil von Illinois im Süden bis zum nördlichen Minnesota. In den untersten Schichten, höchstens $\frac{1}{3}$ der Moorprofile umfassend, sind durchwegs Abies und Picea als Pioniere der nachheutezeitlichen Waldentwicklung dominant. In den südlichen Mooren folgt dann durchgängige Dominanz der Eiche. Subdominant Pinus (zum Schluß wieder ansteigend), reichlich auch Carya und Ulmus, spärlich Ostrya, Celtis, Juglans, Tilia, Carpinus, Acer, Fraxinus, Populus, Salix. Nach Norden hin treten die Laubhölzer immer mehr zurück. Die Dominanzfolge ist hier schließlich: Abies, Picea—Pinus—Picea. Die interessanten Ergebnisse werden nur sehr kurz erörtert. Verf. nimmt gleichbleibende klimatische Verhältnisse nach der Abies-Piceaphase an, ohne Anzeichen für den Blytt-Sernanderschen Klimawechsel. Die Diagramme zeigen aber deutlich eine Art Revertenz im Sinne von Post (Anstieg, Höhepunkt, Ausklang einer Wärmezeit), gekennzeichnet durch den Wiederanstieg von Picea im Norden, Pinus im Süden gegen die Gegenwart. Die Wärmezeit selbst wäre im Süden durch Quercus-, im Norden durch Pinusdominanz markiert. Die mittleren Moore vermitteln den Übergang. *Rudolph*.

Mager, Fr.: Entgegnung auf E. Kolumbes Aufsatz: „Wald und Heide in Schleswig-Holstein“. Bot. Archiv 36, 497—502 (1934).

Verf. weist an einigen Beispielen nach, daß die Kritik Kolumbes seinen Untersuchungen nicht gerecht wird und der Sorgfalt entbehrt. Er hält auch seine historisch-geographische Arbeitsmethode für allein ausreichend. „Wenn in Urkunden aus dem 13. und sogar 12. Jahrhundert Waldungen genannt werden, so ist die vormalige Existenz dieser Waldungen eine unumstößliche Tatsache.“ *Kemmer (Bremen).*

Berg, Leo S.: Über die vermeintlichen Meereselemente in der Fauna und Flora des Baikalsees. Bull. Acad. Sci. URSS, VII. s. Nr 2/3, 303—326 (1934) [Russisch].

Der Verf. widerlegt die von G. J. Vereščagin (1928) geäußerte Ansicht, nach welcher im Baikalsee marine Elemente jurassischer Herkunft vorkommen sollen. Die Fauna des Baikalsees enthält keine marinen Elemente. Die endemischen Formen des Baikalsees sind (wenige Immigranten aus dem Eismeer ausgenommen) entweder alte Süßwassertypen oder Relikte der obertertiären Binnenseefauna Asiens. *Autoreferat.*

Fischer-Piette, E.: Sur la répartition du cirripède Balanus balanoides le long des côtes françaises et anglaises de la Manche. (Über die Verteilung des Cirripeden Balanus balanoides entlang der französischen und englischen Küsten des Ärmelkanals.) (Laborat. Marit., Saint-Servan.) (57. sess., Chambéry, 24. VII.—4. VIII. 1933.) Assoc. Franç. Avancement Sci. 476—480 (1933).

Die Individuendichte und Größe von Balanus balanoides nimmt an der französischen und an der englischen Küste in gleicher Weise von Ost nach West ab. Auf das östliche Verbreitungsgebiet, in dem B. balanoides sehr häufig ist, folgt eine westlich von Plymouth und Perros (Frankreich) beginnende Region, in der B. balanoides stark abnimmt, bis er westlich von Cornwall und Pte des Pontusval völlig fehlt. Betrachtet man das Alter der Individuen, so zeigt sich, daß das mittlere Alter von Ost nach West abnimmt; im Westen wird nicht mehr die Altersgrenze eines Jahres erreicht; hier finden sich auch keine larventragenden Individuen mehr. Aus diesen Tatsachen wird geschlossen, daß sich die geographische Grenze dieser Art von Ost nach West verschoben hat. Die Untersuchung dieser Verschiebung, die vielleicht mit Änderungen des Milieus zusammenhängt, wird vorteilhafterweise innerhalb der Übergangsregion fortzusetzen sein. *W. Hellmich (München).*

Sakai, Tune: Brachyura from the coast of Kyusyu, Japan. (Krabben von der Küste Kyusyu, Japan.) (Shimoda Marine Biol. Stat., Tokyo.) Sc. Rep. Tokyo Bunrika Daigaku B 1, 281—330 (1934).

Systematische Bearbeitung von 3 größeren Sammlungen, teilweise auch von dem Ostchinesischen Meere. Liste aller von der Südisel Japans bekannten Arten und Beschreibung von einigen neuen sp. 2 Farbentafeln. *Balss (München).*

Monographien einzelner Arten und Gruppen.

Madle, Heinz: Zur Kenntnis der Morphologie, Ökologie und Physiologie von Aphodius rufipes Lin. und einigen verwandten Arten. (Zool. Inst., Univ. Graz u. Biol. Stat., Lunz.) Zool. Jb. Abt. Anat. u. Ontog. 58, 303—396 (1934).

Folgende Arten wurden untersucht: Aphodius rufipes L., A. fossor L., A. depressus Kuge., A. atramentarius Er. und A. fimetarius L. Es werden beschrieben

von *A. rufipes* L.: das Ei, das 1. und 2. Larvenstadium sowie ausführlich das Stadium (Mundwerkzeuge, Mandibeln, Maxillen, der Darmtraktus, die Beine, der Schieber am 10. Abdominalsegment und die Stigmen). Die Puppe ist unbeborstet. Ausführlichere morphologische Einzelheiten über die Imago (Mundextremitäten, Darmtraktus, Beine, Stigmen und Flügel). Untersuchungen über den Wassergehalt, chemische Zusammensetzung und die Temperatur des Nährstoffes (Dung). Die Larven werden dicht unter der oberen Kruste des Dungfladens untergebracht. Ältere Larven graben sich unter dem Fladen einen Gang in die Erde und überwintern in dessen Innern. Dieser Gang dringt 5—10 cm in den Humus ein. Verpuppung im Frühjahr. *A. rufipes* und *A. depressus* haben 2 Generationen jährlich. Die Extremitäten der Larven werden paarweise, nacheinander bewegt (wie bei den Chrysomeliden-Larven! Ref.). Angaben über Kriechgeschwindigkeit und Reizbarkeit der Larven, über die Entwicklung der Imago, das Ausreifen, die Lebensdauer, die Lebensweise der Käfer im Fladen, Reizbarkeit und Phototaxis der Imagines. Im physiologischen Abschnitt wird ausgeführt, daß bei der Larve Mitteldarmsekret extraintestinal verwandt wird. Bakterien spielen bei der Verdauung der Larve keine Rolle. Der Enddarm reißt nicht. Sehr beachtliche Einzeltatsachen im Hinblick auf die Verarbeitung der Nahrung im Darm. Es ist ein sehr starkes tryptisches Ferment vorhanden, das pflanzliches und tierisches Eiweiß verdaut. Stärke und Cellulose werden nicht auswertet. Für die Verdauung ist nicht die Temperatur, sondern das p_H maßgebend. Die Imago besitzt Speicheldrüsen. Diese Drüsen liegen im Kopf. Sie münden ventral in den Mandibeln. Das Sekret wird mittels Speichelkanälchen auf den Mandibeln weitergeleitet. Die Molaren der Mandibel tragen „Filterrinnen“, die beim Schließen der Mandibeln den Preßsaft weiterleiten. Der Käfer besitzt im Speichelsekret ein tryptisches Ferment, dessen Wirkung durch ein gleichfalls tryptisches Ferment des Mitteldarmes verstärkt wird. Ökologische Angaben. *H. v. Lengerken* (Berlin).

● **Das Tierreich. Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der rezenten Tierformen.** Hrsg. v. F. E. Schulze † u. W. Kükenhal †. Fortges. v. K. Heider u. R. Hesse. Liefg. 64. Lepidoptera. Baroniidae, Teinopalpidae, Parnassiidae pars I. Bearb. v. Felix Bryk. Berlin u. Leipzig: Walter de Gruyter & Co 1934. XXIII, 131 S. 87 Abb. RM. 25.—.

Familien aus dem Formenkomplex der Rhopaloceren. Die Baroniidae und die Teinopalpidae, seit 1913 (Bryk) bzw. 1899 (A. R. Grote) als besondere Familien unterschieden, sind nur mit je einer Gattung und je einer Art verzeichnet: *Baronia* aus Mexiko, *Teinopalpus* aus Indien und China. Ihnen gehören die ersten 16 Seiten der Lieferung. Von den formenreichen Parnassiidae ist in dieser Lieferung vorerst nur die Subfam. der Zerynthiinae abgehandelt, die andere Subfam. der Parnassiinae offenbar einer kommenden Lieferung vorbehalten. Die Zerynthiinae erscheinen mit 6 Genera und 10 Arten nebst zahlreichen Formae. — Inhalt und Anordnung des Textes folgt dem bekannten Schema aller „Tierreich“-Lieferungen. Über präimaginale Stadien und Lebensweise ist in Kürze gesagt, was davon bisher bekannt ist. Besonderen Hinweis verdient die Mitberücksichtigung einer ausschließlich fossilen Art, der *Lühdorfia bośniackii* (Rebel) aus dem Miozän Toskanas. *Kuhlqatz* (Berlin).

● **Seitz, Adalbert: Die Großschmetterlinge der Erde. 1. Haupttl. Fauna palaeartica.** Suppl. Liefg. 51 u. 52. Bd. 3. Stuttgart: Alfred Kernen 1934. S. 129—168 u. 1 Taf. 2 Fortsetzungen des systematischen Eulenergänzungsbandes. In Lieferung 52 beginnt die Unterfamilie der Amphipyrenen. Die Formen stammen aus allen Gebieten der palaearktischen Fauna. *Max Reichelt* (Leipzig).

● **Seitz, Adalbert: Die Großschmetterlinge der Erde. 1. Haupttl. Fauna palaeartica.** Suppl. Liefg. 53. Bd. 3. Stuttgart: Alfred Kernen 1934. S. 169—184 u. 1 Taf. Bringt Klarheit in verschiedene Gattungen der Amphipyrenen (Eulen). Besonders gilt dies für die sehr umfangreiche *Athetis* Hbn. Fehler des Hauptbandes werden korrigiert. Tafel 13 zeigt die bekannten Agrotisarten. *Max Reichelt*.

● **Seitz, Adalbert:** Die Großschmetterlinge der Erde. Exoten-Liefg. 568 u. 569. Fauna africana. Liefg. 112 u. 113. Bd. 15. Stuttgart: Alfred Kern 1934. S. 15—62.

Auf die afrikanischen Agaristiden folgen die Noctuiden. Die Eulenfamilie ist im äthiopischen Gebiet nicht sehr verbreitet. Noctuinen und Catocalen gibt es sehr wenig, zahlreich sind höchstens Schilfeulen. Behandelt werden: Acronyctinen, Euxoinen (Euxoa, Agrotis), Hadeninen und Cuculliinen. Die Arten ähneln den palaearkt. Formen.

Max Reichelt (Leipzig).

● **Seitz, Adalbert:** Die Großschmetterlinge der Erde. Fauna indo-australis. Liefg. 201 u. 202, Exoten-Liefg. 564 u. 565, Bd. 10. Stuttgart: Alfred Kern 1934. S. VII, 873—909.

Es handelt sich nur um 2 weitere Lieferungen des Index zum abgeschlossenen Bd. 10: Indo-austral. Spinner und Schwärmer.

Max Reichelt (Leipzig).

● **Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches. Gegr. v. Willy Küenthal. Hrsg. v. Thilo Krumbach. 7. Bd. Sauropsida: Allgemeines Reptilia. Aves. Bearb. v. Thilo Krumbach, Erwin Stresemann und Otto von Wettstein. 2. Hälfte, Liefg. 8. Berlin u. Leipzig: Walter de Gruyter & Co. 1934. S. XI, 769—899 u. 60 Abb. RM. 18.—**

Der Raum der 8. Lieferung, mit welcher der 7. Band seinen Abschluß findet, ist in Fortsetzung des vorhergehenden Heftes zum größten Teil mit der Klassifikation der Vögel in Anspruch genommen. An diesen Abschnitt schließt sich das Literaturverzeichnis an, in das aus der umfangreichen Aves-Literatur nur die wichtigsten Arbeiten aufgenommen finden konnten; trotz dieser notwendigen Einschränkung umfaßt dieser Teil 27 Seiten. Für die Auffindung dessen, was über diesen Rahmen hinausgeht, hilft der Verf. mit Anweisungen zur Beschaffung der Literaturquellen. Den Abschluß der Lieferung bildet das Register, das Titelblatt des Bandes und das Inhaltsverzeichnis. Die Fertigstellung eines Bandes und damit die Bearbeitung eines Stoffes ist gewiß für den Autor, wie für den Herausgeber im Sinne der Erledigung einer großen Aufgabe ein wichtiges und freudiges Ereignis. Aber auch von dem Interessentenkreis wird das Erreichen dieses Zieles auf das lebhafteste begrüßt.

Cori (Prag).

● **Kleinschmidt, Otto:** Die Raubvögel der Heimat in einer nach praktischen Gesichtspunkten geordneten Übersicht ihrer häufigen und ihrer seltenen Vertreter mit kurzen Erläuterungen ihres Schönheitswertes und der Grundzüge ihres Wesens und Lebens dargestellt. Leipzig: Quelle & Meyer 1934. XV, 87 S. u. 80 Taf. geb. RM. 7.—

Das Buch behandelt 46 Raubvogelarten einschließlich Eulen. Verf. hat hier ein würdiges Gegenstück zu seinem bereits in 5. Auflage erschienenen Buche „Die Singvögel der Heimat“ geschaffen. Den Textseiten, die in sorgfältiger Auswahl das Wichtigste enthalten, stehen wiederum die meisterhaft gelungenen Bildtafeln gegenüber. Die Anordnung ist so, daß nahe verwandte oder sonst ähnliche Arten leicht miteinander verglichen werden können; die sie unterscheidenden Merkmale sind dazu textlich noch besonders hervorgehoben. Der 1. Teil umfaßt die regelmäßigen, der 2. die selteneren Erscheinungen. Unter dem Gesichtspunkt, daß hier „selten“ auch in geographischer Beziehung ein relativer Begriff ist, wird diese Einteilung jedoch nicht überall den örtlichen Verhältnissen gerecht werden können. Der 3. Teil behandelt unter dem Titel „Allgemeines“ Eier, Dunenkleider, Jugend- und Alterskleid, Individuelles Variieren, Geographisches Variieren, Brustbeine, Laufbefiederung, Flugbilder, Horstbilder, Schwung- und Schwanzfedern, Wiederholungen der Natur. Gerade dieser Teil trägt viel zu einer gehaltvollen Vertiefung der Kenntnis über das Wesen unserer Raubvögel bei; besonders anschaulich und belehrend wirken die guten Flugbilder, die nicht nur die sonst üblichen Silhouetten zeigen. Den Schluß bildet der Abschnitt „Raubvogelleben im Wechsel der Jahreszeiten“. Das Buch verdient als eine der hervorragendsten Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt besondere Beachtung und gehört eigentlich in die Hand eines jeden naturverbundenen und zur Natur strebenden Menschen.

W. Banzhaf (Stettin).